

東北大学 土木系 院試 基礎科目

鈴木 *

Last update: 2026 年 5 月 3 日

目次

1	L'Hôpital の定理	2
2	微分方程式の解法	3
3	Bernoulli の微分方程式	3
4	Lagrange の微分方程式	4
5	Euler の微分方程式	5
6	完全微分方程式	5
7	積分因子法	6
8	未定係数法	9
9	定数変化法	10
10	変数分離法	12
11	同次形	12
12	常微分方程式 例題	12
13	収束半径	13
14	極値と Hesse 行列と Hessian	14
15	Weierstrass 置換	15
16	対角化	16

* <https://github.com/suzuyuyuyu>

■ L'Hôpital の定理

微分可能な関数 f, g と $a \in (-\infty, +\infty)$ について $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ という極限を考えると、

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty \text{ or } 0 \quad (1.1)$$

であり、 x が a の除外近傍 ($x = a$ を除く a 近傍) で $g'(x) \neq 0$ であれば

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \quad (1.2)$$

が成り立つ。これを L'Hôpital の定理という。

微分方程式の解法

常微分方程式は分類ができ、それぞれ次のような解法がとられる。

A. 非線形

1. 一階

- 変数分離法
- 同次形 $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$
- Bernoulli の微分方程式 $p(x)y' + q(x)y = r(x)y^n$
- 完全微分方程式 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$
- 積分因子法 $\lambda(x, y)$
- Lagrange/d'Alembert の微分方程式 $y = xf(y') + g(y')$

2. 二階以上

- 階数低下法（階数低減法）

B. 線形 $y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_0(x)y = q(x)$

1. 一階 $y' + p(x)y = q(x)$

i. 斉次 $y' + p(x)y = 0$

- 変数分離法

ii. 非斉次

- 積分因子法 $\lambda(x), \lambda(y)$
- 定数変化法

2. 二階以上（非定数係数）

- Euler の微分方程式 $x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_n y = f(x)$

3. 二階以上（定数係数）

i. 斉次

- 特性方程式（補助方程式）
- 微分演算法

ii. 非斉次

- 特性方程式、未定係数法
- 特性方程式、定数変化法

太字部分について以下まとめる。

Bernoulli の微分方程式

特に非線形常微分方程式は多くの場合、解くことができない。

一階線形常微分方程式の左辺に対して右辺が $Q(x)y^n$ ($n \neq 0, 1$) になっているものを Bernoulli の微分方程式という。

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n \quad (3.1)$$

Bernoulli の微分方程式は両辺を y^n で割って、

$$\frac{1}{y^n} \frac{dy}{dx} + \frac{P(x)}{y^{n-1}} = Q(x) \quad (3.2)$$

と変形できる。

ここに $u = \frac{1}{y^{n-1}} = y^{1-n}$ とおくことで $u' = (1-n) \frac{1}{y^n} \frac{dy}{dx}$ であり、Eq. (3.2) の両辺を $1-n$ 倍してから u についての微分方程式に書き換えて

$$u' + (1-n)P(x)u = (1-n)Q(x) \quad (3.3)$$

として一階線形常微分方程式を得る。

■ Lagrange の微分方程式

次の形

$$y = xf\left(\frac{dy}{dx}\right) + g\left(\frac{dy}{dx}\right) \quad (4.1)$$

で表される一階非線形常微分方程式を Lagrange の微分方程式、あるいはダランベールの微分方程式という。

特に $f(x) = x$ のとき、この微分方程式は

$$y = x \frac{dy}{dx} + g\left(\frac{dy}{dx}\right) \quad (4.2)$$

と表されて、この微分方程式を特にクレロー (Clairaut) の微分方程式という。

クレローの微分方程式は両辺をさらに x で微分して

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dx} + x \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dg(y')}{dx} \quad (4.3)$$

$$0 = xy'' + \frac{dg(y')}{dy'} y'' \quad (4.4)$$

$$y'' \left(x + \frac{dg(y')}{dy'} \right) = 0 \quad (4.5)$$

ゆえに、

$$y'' = 0 \quad \text{または} \quad x + \frac{dg(y')}{dy'} = 0 \quad (4.6)$$

として解く。前者は単に任意定数 C を用いて

$$\frac{dy}{dx} = C \quad (4.7)$$

とできるので与えられた微分方程式より、

$$y = Cx + g(C) \quad (4.8)$$

として解を得る。これは 1 つの任意定数を持つので一般解である。

一方で後者は

$$\begin{cases} x + \frac{dg(y')}{dy'} = 0 \\ y = xy' + g(y') \end{cases} \quad (4.9)$$

から連立させて y' を消去すれば任意定数を含まない解 y を得る。この解を特異解という。

Lagrange の微分方程式も同様にまず両辺を x で微分して

$$y' = f(y') + xy'' \frac{df(y')}{dy'} + \frac{dg(y')}{dy'} y'' \quad (4.10)$$

ここで、 $y' = p$ とおけばこの微分方程式は

$$p = f(p) + xp'f'(p) + p'g'(p) \quad (4.11)$$

$$p = f(p) + \frac{dp}{dx}(xf'(p) + g'(p)) \quad (4.12)$$

$$p - f(p) = \frac{dp}{dx}(xf'(p) + g'(p)) \quad (4.13)$$

$$\frac{dx}{dp} = \frac{xf'(p)}{p - f(p)} + \frac{g'(p)}{p - f(p)} \quad (4.14)$$

$$\frac{dx}{dp} + \frac{f'(p)}{f(p) - p}x + \frac{g'(p)}{f(p) - p} = 0 \quad (4.15)$$

と変形できるので、これは一階線形微分方程式に帰着する。このとき、 $f(p) - p \neq 0$ を使っているので、関数 f が $f(x) = x$ となるような条件では異なるもの（クレローの微分方程式）として異なる解法をとることも自然である。

Euler の微分方程式

Euler 型 $x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_n y = f(x)$ の微分方程式は $x = e^t$ とおく。このようにおけば、

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \quad (5.1)$$

$$\therefore x \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \quad (5.2)$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \quad (5.3)$$

$$\therefore x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \quad (5.4)$$

⋮

のようにして $x^n y^{(n)}$ を消去できて、 n 階線形微分方程式になる。

完全微分方程式

ある微分方程式

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

が

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \quad (\text{可積分条件}) \quad (6.1)$$

を満たす場合、この微分方程式を完全微分方程式という。

ある関数 $U(= U(x, y))$ に対する全微分は

$$dU = \frac{\partial U}{\partial x} dx + \frac{\partial U}{\partial y} dy \quad (6.2)$$

と与えられるので、微分方程式の P, Q について

$$P(x, y) = \frac{\partial U}{\partial x}, \quad Q(x, y) = \frac{\partial U}{\partial y} \quad (6.3)$$

なる関数 U が見つければ、与えられた微分方程式は $dU = 0$ すなわち

$$U(x, y) = C \quad (C \text{ は任意定数}) \quad (6.4)$$

と解を得る。

■ 積分因子法

微分方程式

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \quad (7.1)$$

に対して

$$\frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x} \quad (7.2)$$

であっても、ある適当な関数 $\lambda(x, y)$ が存在して、

$$\frac{\partial(\lambda P)}{\partial y} = \frac{\partial(\lambda Q)}{\partial x} \quad (7.3)$$

が成り立つとき、あらたに関数 $\hat{P} := \lambda P, \hat{Q} := \lambda Q$ を用いて

$$\hat{P}(x, y)dx + \hat{Q}(x, y)dy = 0 \quad (7.4)$$

$$\frac{\partial \hat{P}}{\partial y} = \frac{\partial \hat{Q}}{\partial x} \quad (7.5)$$

とできてこれは完全微分方程式である。このときの関数 $\lambda(x, y)$ を積分因子 (Integrating Factor) といい、積分因子を導入して解を得る方法を積分因子法という。積分因子法は Eq. (7.3) について変形した $\lambda(x, y)$ に関する次の条件を満たせばよいので、一階非線形常微分方程式においても用いられることがある。

$$\frac{\partial \lambda}{\partial y} P + \frac{\partial P}{\partial y} \lambda = \frac{\partial \lambda}{\partial x} Q + \frac{\partial Q}{\partial x} \lambda \quad (7.6)$$

ここで、 $\lambda = \lambda(x)$ である、すなわち $\frac{\partial \lambda}{\partial y} = 0$ であるような特殊な場合を仮定すればこの $\lambda(x, y)$ についての偏微分方程式は $\lambda(x)$ についての常微分方程式

$$\lambda \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) = \frac{d\lambda}{dx} Q \quad (7.7)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\lambda} \frac{d\lambda}{dx} = \frac{1}{Q(x, y)} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) \quad (7.8)$$

となる（変数分離型）。左辺は y に依存しない（ x のみの式である）ので右辺 $\frac{1}{Q}(P_y - Q_x)$ も y に依存しない式となれば積分因子 $\lambda(x, y)$ は x の関数 $\lambda(x)$ としてよいということになる。

同様にして

$$\begin{aligned} \lambda \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) &= -P \frac{d\lambda}{dy} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{\lambda} \frac{d\lambda}{dy} &= -\frac{1}{P(x, y)} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) \end{aligned}$$

より、右辺 $-\frac{1}{P}(P_y - Q_x)$ が x に依存しない式となればこれも変数分離型の常微分方程式であって、積分因子 $\lambda(x, y)$ は y の関数 $\lambda(y)$ としてよいということになる。

一般に次のような公式が知られている。

1. $\frac{1}{Q(x, y)} \left(\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} - \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} \right)$ が x の関数
 $\Rightarrow \lambda(x) := \exp \left[\int \frac{1}{Q} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) dx \right]$
2. $-\frac{1}{P(x, y)} \left(\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} - \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} \right)$ が y の関数
 $\Rightarrow \lambda(y) := \exp \left[- \int \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) dy \right]$
3. $\frac{P(x, y)}{y}$ と $\frac{Q(x, y)}{x}$ が xy の関数
 $\Rightarrow \lambda(x, y) := \frac{1}{xP(x, y) - yQ(x, y)}$

一般に積分因子は x, y の関数で簡単には求められないが、一階線形常微分方程式では次のようにして積分因子を求められる。

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \quad (7.9)$$

斉次形（ $Q(x) = 0$ ）のとき、これは変数分離形として解を得る。非斉次形でかつ Q が x の関数のときは積分因子は一変数関数 $\lambda(x)$ として次のように求める。両辺に $\lambda(x)$ をかけて

$$\lambda(x) \left\{ \frac{dy}{dx} + P(x)y \right\} = \lambda(x)Q(x) \quad (7.10)$$

としてこれが完全微分方程式となるための可積分条件

$$\frac{1}{\lambda} \frac{d\lambda}{dx} = P(x) \quad (7.11)$$

を解けば積分因子を得る。また、Eq. (7.10) について次式

$$\lambda(x) \left\{ \frac{dy}{dx} + P(x)y \right\} = \frac{d}{dx}(\lambda(x)y) \quad (7.12)$$

を満たすので、積分因子を Eq. (7.11) によって計算した上で、

$$\frac{d}{dx}(\lambda(x)y) = \lambda(x)Q(x) \quad (7.13)$$

を解けば良い。一応簡単に証明しておく。

Proof. Eq. (7.10) から Eq. (7.12) を得ることを示す。Eq. (7.10) は

$$\lambda(x)(Q(x) - P(x)y)dx - \lambda(x)dy = 0 \quad (7.14)$$

と変形できて、これが完全微分形であるとき可積分条件は

$$\frac{\partial}{\partial y}(\lambda(x)(Q(x) - P(x)y)) = -\frac{\partial \lambda(x)}{\partial x} \quad (7.15)$$

であって、左辺は y に依存しないのでたしかに積分因子 $\lambda(x)$ が存在して

$$\frac{d\lambda}{dx} = \frac{\partial}{\partial y}(\lambda(x)P(x)y) - \frac{\partial(\lambda Q)}{\partial y} \quad (7.16)$$

$$= \lambda(x)P(x) \quad (7.17)$$

すなわち

$$\frac{1}{\lambda} \frac{d\lambda}{dx} = P(x) \quad (7.18)$$

を満たす。(この変数分離形の微分方程式を解くことによって積分因子を計算できる。)

Eq. (7.17) の λ に関する微分方程式の両辺を y 倍して $\lambda \frac{dy}{dx}$ を加えることで

$$\lambda(x) \frac{dy}{dx} + \lambda(x)P(x)y = y \frac{d\lambda}{dx} + \lambda(x) \frac{dy}{dx} \quad (7.19)$$

を得る。この式は左辺を $\lambda(x)$ でくくり右辺を積の導関数と見れば、Eq. (7.12) と同値である。□

Eq. (7.18) によって積分因子が得られれば、(7.10), Eq. (7.12) より

$$\frac{d}{dx}(\lambda(x)y) = \lambda(x)Q(x) \quad (7.20)$$

として、この微分方程式を解けば得られる。

以上の議論は x と y について対称性があるので、入れ替えた形で積分因子を $\lambda(y)$ のように仮定することもある。

■ 未定係数法

$y'' + ay' + by = r(x)$ のような微分方程式を非斉次常微分方程式という。通常、非斉次の場合は次のようにする。

右辺 $r(x) \propto$	特解 y_p
e^{ax}	ke^{ax}
x^n	$k + k_1x + \cdots + k_nx^n$
$\sin ax, \cos ax$	$k_1 \cos ax + k_2 \sin ax$

ただし一般解にこれらが含まれている場合はその限りではない。その場合は一般解が含まれなくなるまで x 倍するような工夫が必要である。たとえば、右辺が e^x であるような斉次方程式で基本解として e^x と e^{2x} が得られたときには特解を xe^x とおき、基本解として e^x と xe^x が得られたときには特解を x^2e^x とおく。

この方法を未定係数法といい、定数係数についての方程式を解けば特殊解が得られる。

未定係数法は適切に解の形を仮定しなくてはならないため、右辺によっては良い仮定が見つからないことがある。そのような場合は定数変化法を用いる。

定数変化法

定数変化法は次の手順で行う。

Remark 9.1 定数変化法による解法

1. 右辺をゼロにして得られる斉次方程式の一般解を求める。
2. 斉次方程式の一般解の積分定数 C を x の関数 $C(x)$ に書き換える。
3. それをもとの微分方程式に代入 $\rightarrow C(x)$ の微分方程式として解いて一般解を求める。
4. 得られた $C(x)$ を斉次方程式の解に代入すると、非斉次方程式の一般解が得られる。

二階以上の非斉次常微分方程式では2つの任意定数を含むので上のように解くと C_1, C_2 に関する条件が不足する。そのため Eq. (9.5) のように $C_1'y_1 + C_2'y_2 = 0$ というような条件を追加で仮定することで C_1', C_2' に関しての単純な微分方程式として計算できる。

文献 [1] を参考にまとめる。

未定係数法は、非斉次項 $r(x)$ が比較的単純で、特解の関数形を事前に予測できる場合にしか使えない。一方、定数変化法を使うことで、任意の関数 $r(x)$ に対して非斉次方程式 $y'' + ay' + by = r(x)$ の特解を求めるための公式を作ることができる。ただし、できる限り未定係数法を使った方が簡単に特解を求められる。

Remark 9.2 非斉次方程式の一般解の公式

$$y(x) = - \left(\int \frac{y_2(x)r(x)}{W(x)} dx \right) y_1(x) + \left(\int \frac{y_1(x)r(x)}{W(x)} dx \right) y_2(x) \quad (9.1)$$

ここで、

- $y_1(x), y_2(x)$: 非斉次方程式の互いに独立な基本解
- $W(x)$: 以下で定義される x の関数 (Wronskian)

$$W(x) := y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x) \quad (9.2)$$

である。

公式 (9.1) を得るためには、非斉次方程式の特解 $y(x)$ をあえて次の形に書き表すところから計算をスタートする。

$$y(x) = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x) \quad (9.3)$$

ただし、 $C_1(x), C_2(x)$ は任意関数で、 $y'' + ay' + by = r(x)$ が満たされるように決める。

この式は単に、未知関数 $r(x)$ を別の未知関数 $C_1(x), C_2(x)$ で書き換えているに過ぎない。さらに、特解 $y(x)$ を書き換えるだけなら未知関数が1つだけあれば十分である。そこで、方針として2つの未知関数 $C_1(x), C_2(x)$ を結びつける関係式 (9.5) を後ほど導入し、未知関数の個数を減らすことにする。

特解を求めるためには、上記の $y(x)$ を非斉次方程式 $y'' + ay' + by = 0$ に代入して、式が満たされるように $C_1(x), C_2(x)$ を決めればよい。そのために、まず $y'(x)$ を計算すると

$$\begin{aligned} y'(x) &= (C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x))' \\ &= C_1'(x)y_1(x) + C_2'(x)y_2(x) + C_1(x)y_1'(x) + C_2(x)y_2'(x) \end{aligned} \quad (9.4)$$

以下の計算では未知関数 $C_1(x), C_2(x)$ を求めていくことになるが、その際に C_1, C_2 の微分項がなるべく少ない方が計算が簡単になる。そこで、 $C_1(x), C_2(x)$ が次の関係式を満たすと仮定する：

$$C_1'(x)y_1(x) + C_2'(x)y_2(x) = 0 \quad (9.5)$$

こう仮定すると、 $C_1(x)$ と $C_2(x)$ のどちらかを決めればもう一方が決まるため、式 (9.3) の右辺に含まれる未知関数の個数が実質的に一つになる。

仮定 (9.5) を課すと、 $y'(x)$ の表式は

$$y'(x) = C_1(x)y_1'(x) + C_2(x)y_2'(x) \quad (9.6)$$

このとき、 $y''(x)$ は

$$\begin{aligned} y''(x) &= (C_1(x)y_1'(x) + C_2(x)y_2'(x))' \\ &= C_1'(x)y_1'(x) + C_2'(x)y_2'(x) + C_1(x)y_1''(x) + C_2(x)y_2''(x) \end{aligned} \quad (9.7)$$

式 (9.6), (9.7) より、式 (9.3) の $y(x)$ を非斉次方程式 $y'' + ay' + by = 0$ に代入したものは

$$\begin{aligned} r(x) &= y'' + ay' + by \\ &= C_1'y_1' + C_2'y_2' + C_1y_1'' + C_2y_2'' + a(C_1y_1' + C_2y_2') + C_1y_1 + C_2y_2 \\ &= C_1(y_1'' + ay_1' + by_1) + C_2(y_2'' + ay_2' + by_2) + C_1'y_1' + C_2'y_2' \\ &= C_1'y_1' + C_2'y_2' \\ \therefore C_1'y_1' + C_2'y_2' &= r(x) \quad (\text{ただし } C_1'y_1 + C_2'y_2 = 0) \end{aligned} \quad (9.8)$$

あとは、式 (9.8) を解いて $C_1(x), C_2(x)$ を決めればよい。式 (9.8) は、次のような連立方程式である。

$$\begin{bmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} C_1' \\ C_2' \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ r \end{Bmatrix}$$

ここで、 $\det \begin{bmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{bmatrix} \neq 0$ であれば、この逆行列を左からかけて

$$\begin{Bmatrix} C_1' \\ C_2' \end{Bmatrix} = \frac{1}{W} \begin{bmatrix} y_2' & -y_2 \\ -y_1' & y_1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ r \end{Bmatrix} \quad (9.9)$$

として C_1' および C_2' が得られる。ここで $W(x)$ は Wronskian であり、 $W(x) := y_1y_2' - y_1'y_2$ である。

単に次のように不定積分して非斉次方程式の一般解を得ることができる。

$$y(x) = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x) = \left(- \int \frac{y_2(x)r(x)}{W(x)} dx \right) y_1 + \left(\int \frac{y_1(x)r(x)}{W(x)} dx \right) y_2 \quad (9.10)$$

これを特解としている場合もあるが、この解は不定積分による任意定数 C_3, C_4 によって斉次方程式の一般解 $C_3y_1 + C_4y_2$ を含むので非斉次方程式の一般解として十分である。

■ 変数分離法

■ 同次形

■ 常微分方程式 例題

例題. $x^2 y'' + xy' + y = \log x$

解答. $x = e^t$ とおくと

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \quad (12.1)$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{dt}{dx} \frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \quad (12.2)$$

であるので、

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \quad (12.3)$$

$$x \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \quad (12.4)$$

を代入して与式は

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} + \frac{dy}{dt} + y = t \quad (12.5)$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + y = t \quad (12.6)$$

この斉次形の解は $y = C_1 e^{it} + C_2 e^{-it} = A \cos t + B \sin t$ である。ここに、特解 $y = at + b$ を仮定すると $a = 1, b = 0$ であるので求める解は

$$y = A \cos t + B \sin t + t \quad (12.7)$$

変数変換 $t = \log x$ より A, B を任意定数として

$$y = A \cos(\log x) + B \sin(\log x) + \log x \quad (12.8)$$

例題. $x^2 y'' - 3xy' + 4y = x^2 \log x$

解答.

例題. $y'' + 2y' + y = e^x \log x$

収束半径

Theorem 13.1 d'Alembert の収束判定法

数列 $\{a_n\}$ に対し、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = r \quad (13.1)$$

が存在するとする。このとき、 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ の収束・発散について

- ・ $0 \leq r < 1$ ならば絶対収束
- ・ $1 < r$ ならば発散

となる。

Theorem 13.2 Cauchy–Hadamard の収束判定法

数列 $\{a_n\}$ に対し、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup \sqrt[n]{|a_n|} = r \quad (13.2)$$

が存在するとする。このとき、 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ の収束・発散について

- ・ $0 \leq r < 1$ ならば絶対収束
- ・ $1 < r$ ならば発散

となる。

この議論より一般のべき級数展開に対しても、 x についての収束半径を得る。

ある関数 $f(x)$ のべき級数展開を考える。

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n + \cdots \quad (13.3)$$

この関数が収束する条件を考える。

マクローリン展開の剰余項が実際に無視できて項数が無限大の展開された関数が元の関数と一致することを示す。

■ 極値と Hesse 行列と Hessian

Hesse 行列 H の行列式 $\det H = H$ の値から

1. $H \succ 0 \Leftrightarrow H > 0 \wedge f_{xx} > 0 \Rightarrow$ 極小値
2. $H \prec 0 \Leftrightarrow H < 0 \wedge f_{xx} < 0 \Rightarrow$ 極大値
3. $H = 0 \Rightarrow$ 不明。個別に計算する
4. $H < 0 \Rightarrow$ 極値ではない

行列 $H \succ 0$ は正定値、 $H \succeq 0$ は半正定値、 $H \prec 0$ は負定値、 $H \preceq 0$ は半負定値といい、次^{*1}のように定義される。

Remark 14.1 行列の符号

n 次正方行列 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ が任意の $x \in \mathbb{R}^n$ に対して

$$x^T A x = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + \sum_{i \neq j} a_{ij} x_i x_j \geq 0 \quad (14.1)$$

を満たすとき、行列 A は半正定値 (positive semidefinite) であると呼ぶ。また、任意の $x \in \mathbb{R}^n$ に対して $x^T A x > 0$ を満たすとき、行列 A は正定値 (positive definite) であると呼ぶ。

また、

$$\text{行列 } A \text{ が (半) 正定値} \Leftrightarrow A \succeq (\succeq) 0 \quad (14.2)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}^n, x^T A x \geq (>) 0 \quad (14.3)$$

$$\Leftrightarrow \text{行列 } A \text{ の固有値が正 (非負)} \quad (14.4)$$

$$\Leftrightarrow \text{すべての主小行列式が正 (主小行列式が非負)} \quad (14.5)$$

$$\Leftrightarrow \text{すべての首座小行列式が正} \quad (14.6)$$

である。ただし、行列 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ($i, j \in N, N = \{1, 2, \dots, n\}$) に対して (k 次) 首座小行列 $\hat{A}$ とは $k \in \mathbb{Z}, 0 \leq k \leq n$ とある集合 $K = \{1, 2, \dots, k\}$ に対して

$$\hat{A} = [a_{ij}] \quad (i, j \in K) \quad (14.7)$$

を満たす行列である。また、主小行列とは $M \subseteq N$ に対して

$$\tilde{A} = [a_{ij}] \quad (i, j \in M) \quad (14.8)$$

を満たす行列である。

$-A$ が (半) 正定値であるとき、 A は (半) 負定値であるという。また、正定値、半正定値、負定値、半負定値のいずれでもないものを不定値行列という。

*1 梅谷俊治『しっかり学ぶ数理最適化』pp.90-91 など

■ Weierstrass 置換

三角関数の有理式の積分について、変数変換（置換）によって積分を求めるもの。

Remark 15.1 Weierstrass substitution

$t = \tan \frac{\theta}{2}$ のとき、

$$\cos \theta = \frac{1 - t^2}{1 + t^2} \quad (15.1)$$

$$\sin \theta = \frac{2t}{1 + t^2} \quad (15.2)$$

$$\tan \theta = \frac{2t}{1 - t^2} \quad (15.3)$$

$$d\theta = \frac{2}{1 + t^2} dt \quad (15.4)$$

として変数変換できる。

■ 対角化

$n \times n$ の行列 $\mathbf{A}$ の対角化は

1. 固有値が n 個

$\Rightarrow$ 可能

2. 固有値 1 個 (n 重解)

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{可能} & (\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A} = \mathbf{0}) \\ \text{不可能} & (\text{o/w}) \end{cases}$$

3. 固有値に m 重解を含む

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{可能} & (m \text{ 重解で固有ベクトルが } m \text{ 個対応する場合}) \\ \text{不可能} & (\text{o/w: この問題はこれに該当}) \end{cases}$$

2 次形式と一般形

■ 参考文献

- [1] 『二階非斉次常微分方程式の解法』 https://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~norihiro.tanahashi/pdf/ODE/note_7.pdf