Linjememory

Stigningstall og konstantledd i funksjonsuttrykket y = ax + b. Memory i grupper på 3–4 elever. To kort er et par når de har samme verdi. Varighet: 15–20 minutter.

Slik spiller dere

1. Skriv ut side 2–4 og klipp ut de 36 kortene. Legg dem med baksiden opp.
2. Snu to kort. Er de et par, må du forklare hvorfor før du får beholde dem og snu to nye.
3. Den med flest par vinner. Variant: Legg alle kortene med forsiden opp og finn flest par på to minutter.

Husk

Konstantleddet b er der linjen skjærer y-aksen. Stigningstallet a sier hvor mye y øker når x øker med 1.

Til læreren: alle parene

Skjærer y-aksen i (0, 4) og har stigningstall –2 = **y = –2x + 4**	Skjærer y-aksen i (0, 6) og har stigningstall 0,5 = **y = 0,5x + 6**	Skjærer y-aksen i (0, 6) og har stigningstall 2 = **y = 2x + 6**
Skjærer y-aksen i (0, 1) og har stigningstall –1 = **y = –x + 1**	Skjærer y-aksen i (0, 2) og har stigningstall 3 = **y = 3x + 2**	Skjærer y-aksen i (0, –2) og har stigningstall –3 = **y = –3x – 2**
Skjærer y-aksen i (0, 6) og har stigningstall 4 = **y = 4x + 6**	Skjærer y-aksen i (0, 0) og har stigningstall 2 = **y = 2x**	Skjærer y-aksen i (0, –5) og har stigningstall 3 = **y = 3x – 5**
Skjærer y-aksen i (0, 6) og har stigningstall –3 = **y = –3x + 6**	Skjærer y-aksen i (0, –2) og har stigningstall 4 = **y = 4x – 2**	Skjærer y-aksen i (0, 2) og har stigningstall –3 = **y = –3x + 2**
Skjærer y-aksen i (0, –1) og har stigningstall –2 = **y = –2x – 1**	Skjærer y-aksen i (0, 5) og har stigningstall 3 = **y = 3x + 5**	Skjærer y-aksen i (0, –1) og har stigningstall –1 = **y = –x – 1**
Skjærer y-aksen i (0, –1) og har stigningstall 1 = **y = x – 1**	Skjærer y-aksen i (0, –1) og har stigningstall 3 = **y = 3x – 1**	Skjærer y-aksen i (0, 3) og har stigningstall 1 = **y = x + 3**

Linjememory

✂ Klipp langs de stiplede linjene

Skjærer y-aksen i (0, 6) og har stigningstall –3	**y = –x + 1**	**y = 4x + 6**
Skjærer y-aksen i (0, –1) og har stigningstall –1	**Skjærer y-aksen i (0, –2) og har stigningstall 4**	**y = 2x + 6**
Skjærer y-aksen i (0, 2) og har stigningstall 3	**y = 2x**	**y = 4x – 2**
Skjærer y-aksen i (0, –1) og har stigningstall 3	**Skjærer y-aksen i (0, 5) og har stigningstall 3**	**y = –2x + 4**

Linjememory

✂ Klipp langs de stiplede linjene

Skjærer y-aksen i (0, –2) og har stigningstall –3	**Skjærer y-aksen i (0, –1) og har stigningstall –2**	**y = 3x – 1**
y = 3x – 5	**Skjærer y-aksen i (0, 6) og har stigningstall 2**	**Skjærer y-aksen i (0, 4) og har stigningstall –2**
Skjærer y-aksen i (0, 6) og har stigningstall 0,5	**y = –3x + 6**	**y = –3x + 2**
y = x + 3	**Skjærer y-aksen i (0, –5) og har stigningstall 3**	**Skjærer y-aksen i (0, 0) og har stigningstall 2**

Linjememory

✂ Klipp langs de stiplede linjene

Skjærer y-aksen i (0, 1) og har stigningstall –1	**y = –3x – 2**	**y = x – 1**
y = –x – 1	**y = –2x – 1**	**Skjærer y-aksen i (0, 6) og har stigningstall 4**
Skjærer y-aksen i (0, –1) og har stigningstall 1	**Skjærer y-aksen i (0, 2) og har stigningstall –3**	**Skjærer y-aksen i (0, 3) og har stigningstall 1**
y = 0,5x + 6	**y = 3x + 5**	**y = 3x + 2**