#### INDICADORES PRINCIPALES DE SEGUIMIENTO DE COVID-19

Fecha de informe: 16 - Sep - 2021

El documento de <u>actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 en España</u> establece unos criterios comunes para la interpretación de los indicadores básicos en el Sistema Nacional de Salud con el fin de realizar una evaluación del riesgo en cada territorio. Para cada indicador se establecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto. En función de estos indicadores, se proponen unos niveles de alerta que determinan actuaciones proporcionales al nivel de riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 y adaptables según la situación y el contexto de cada territorio.

Desde el Ministerio de Sanidad se realiza un seguimiento continuado de la evolución de todos los indicadores a nivel autonómico y provincial. Se establecen dos tipos de indicadores, los considerados como indicadores principales, recogidos en la Tabla 1 del mencionado documento, y los indicadores complementarios, recogidos en el Anexo 1 del mismo documento y que ayudan a valorar y caracterizar la situación de la epidemia y las capacidades de gestión y respuesta con más detalle y adaptada a diferentes territorios. Es importante recalcar que ningún indicador por sí solo es capaz de dar una valoración correcta de la situación epidemiológica. Además de estos indicadores, las comunidades autónomas utilizarán todos aquellos que en su contexto consideren relevantes, así como aspectos referentes a la equidad en salud y la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio. Los indicadores complementarios incluyen entre otros la tendencia ascendente de cada indicador, su velocidad de cambio y la capacidad de respuesta de los sistemas.

El acceso a las vacunas desde finales de diciembre de 2021 ha ido modificando de forma importante la dinámica de transmisión de la enfermedad, cambiando el escenario de riesgo para la población en España. Este cambio se ha hecho más evidente a medida que se han conseguido coberturas de vacunación muy elevadas en los grupos diana establecidos en la estrategia de vacunación. Por otro lado, desde el fin del estado de alarma, el pasado 9 de mayo de 2021, se han ido suavizando progresivamente algunas de las medidas de control de la transmisión del SARS-CoV-2 que desafortunadamente ha ido acompañado de una falta de observancia importante de las todavía vigentes por parte de grande grupos de población, lo que ha supuesto un aumento de la probabilidad de exposición al virus para la población y de infección, sobretodo, para los grupos poco o no vacunados que a mediados de julio son los menores de 40 años y sobretodo los menores de 30 años.


Esta situación ha derivado en un importante incremento de la incidencia en los grupos todavía susceptibles, los menores de 30 años, entre los que la enfermedad es, en general, más leve y genera un porcentaje menor de hospitalizaciones, ingresos en UCIs y fallecimientos, aunque a medida que aumenta la incidencia el número bruto de casos graves también aumenta. Sin embargo, el aumento de la circulación del virus también supone un riesgo de infección para las personas que a pesar de haberse vacunado no han desarrollado inmunidad contra la enfermedad. De acuerdo a los datos de eficacia y efectividad de las vacunas disponibles, este grupo sería alrededor de un 10% de los vacunados.

En todos los casos, pero especialmente en situaciones de cambio importante en la dinámica de la transmisión del SARS-CoV-2, como la actual, se deben valorar, además de los indicadores principales, los indicadores complementarios que permiten una evaluación más fina del nivel de transmisión o de la capacidad de diagnóstico precoz del sistema. Esta evaluación debe hacerse en cada territorio con todos los datos necesarios y teniendo en cuenta que en situaciones en las que se detecte un empeoramiento brusco de la situación epidemiológica, los niveles de alerta podrán establecerse valorando únicamente uno de los dos bloques principales de indicadores, como también se indica en el documento de Actuaciones.

Dada el nuevo escenario de transmisión y riesgo generado tanto por las coberturas de vacunación como por la reducción de las medidas de control de la transmisión y la necesidad de adaptar la estimación de los niveles de alerta a la situación específica de cada territorio en base a los indicadores complementarios, este informe no incluye, a partir del 15 de julio de 2021, los mapas que indican el nivel de aleta de las CCAA y provincias manteniendo los que indican el nivel de riesgo asociado a cada uno de los indicadores principales.



#### **BLOQUE I: Evaluación del nivel de transmisión**





## **BLOQUE II: Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID**





TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por CCAA											
Comunidad Autónoma	Incidencia	Incidencia	Incidencia	Incidencia	%	% de casos	%	%			
	x 100.000	x 100.000	x 100.000	x 100.000	positividad	con	ocupación	ocupación			
	(14 días)	(7 días)	en >65	en >65	en PDIA*	trazabilidad	camas de	camas de			
			años (14	años (7			agudos	UCI por			
			días)	días)			por COVID	COVID			
ANDALUCÍA	83.3	32.4	76.7	30.1	6.0	42.1	2.8	7.1			
ARAGÓN	128.0	52.6	81.3	26.3	7.8	51.5	3.3	14.7			
ASTURIAS	31.5	10.3	23.7	8.7	2.0	33.6	1.2	4.4			
C.F.NAVARRA	114.8	46.0	105.3	40.9	5.9	73.0	2.5	12.3			
CANARIAS	73.7	33.5	57.2	24.2	3.6	70.4	3.3	12.3			
CANTABRIA	138.8	58.2	88.5	44.6	6.3	56.0	2.2	5.9			
CASTILLA LA MANCHA	121.6	43.3	111.5	42.5	7.9	69.3	3.3	13.1			
CASTILLA Y LEÓN	78.0	30.6	95.6	37.8	5.4	64.2	2.1	12.5			
CATALUÑA	108.9	48.8	89.2	37.9	3.4	81.5	4.6	19.8			
CEUTA	209.0	93.8	86.1	38.2	10.7	77.2	5.5	5.9			
C. VALENCIANA	65.4	26.2	42.0	17.3	6.3	53.4	2.1	7.5			
EUSKADI	137.6	58.5	117.7	54.4	5.2	44.1	5.7	15.5			
EXTREMADURA	115.9	39.1	134.9	45.4	4.3	73.3	2.7	5.9			
GALICIA	82.4	29.7	66.1	27.6	3.6	76.6	1.2	4.1			
ISLAS BALEARES	128.4	54.2	105.8	52.4	4.2	44.7	3.8	16.3			
LA RIOJA	88.8	34.1	74.9	30.8	3.0	72.5	1.8	9.4			
MADRID	106.0	42.2	88.9	35.8	4.6	59.8	4.8	23.9			
MELILLA	257.2	101.1	196.8	134.6	6.3	60.2	5.5	11.8			
MURCIA	94.0	38.1	58.3	19.6	5.8	55.0	1.8	4.8			

<sup>\*</sup> PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).



## Desagregación de los indicadores del Bloque I por provincia o isla





# Desagregación de los indicadores del Bloque II por provincia o isla




TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por provincia o isla\*

Provincia o Isla	IA x	IA x	IA >65	IA >65	%	% de casos	%	%
	100.000	100.000	años x	años x	positividad	con	ocupación	ocupación
	(14 días)	(7 días)	100.000	100.000	en PDIA**	trazabilidad	camas de	camas de
			(14 días)	(7 días)			agudos por	UCI por
							COVID	COVID
ACoruña	82.6	28.7	56.3	23.3	4.2	79.2	1.4	3.8
Alacant/Alicante	74.0	28.6	44.3	20.3	7.6	50.2	1.8	12.1
Albacete	107.4	42.0	57.3	25.3	6.8	74.8	2.0	17.3
Almería	109.8	48.6	73.0	30.3	6.6	41.9	2.4	7.8
Araba/Álava	114.1	46.4	75.3	25.1	4.0	45.2	4.7	4.5
Asturias	31.1	10.4	23.7	8.7	2.0	33.6	1.2	4.4
Ávila	90.1	36.8	145.2	68.9	7.0	84.5	2.9	16.7
Badajoz	108.9	39.1	89.3	32.6	3.9	71.5	1.7	3.9
Barcelona	105.3	47.4	91.1	39.1	3.3	82.5	5.5	19.1
Bizkaia	138.2	59.4	121.2	57.4	5.2	39.0	6.8	16.4
Burgos	89.2	30.8	97.7	27.9	5.9	63.6	2.8	13.6
Cáceres	128.4	39.6	200.5	64.2	4.8	75.5	4.6	10.2
Cádiz	56.8	20.0	51.3	16.3	4.6	51.9	1.6	2.4
Cantabria	139.1	58.2	88.5	44.6	6.3	56.0	2.2	5.9
Castelló/Castellón	77.0	31.6	44.3	20.9	7.1	61.1	2.1	4.5
Ceuta	209.0	93.8	86.1	38.2	10.7	77.2	5.5	5.9
CiudadReal	111.1	40.2	89.5	34.8	6.3	62.8	3.0	16.7
Córdoba	58.9	22.3	62.7	24.4	5.5	45.3	1.7	11.5
Cuenca	133.6	50.0	152.5	51.6	7.2	68.4	3.3	0.0
ElHierro	53.8	0.0	101.5	0.0	2.9	NA	3.8	14.8
Formentera	92.4	50.4	105.2	0.0	4.2	83.3	3.8	16.3
Fuerteventura	137.0	73.5	27.0	10.8	3.7	76.1	2.7	10.3
Gipuzkoa	147.8	62.9	130.4	62.2	5.8	51.2	4.4	20.2
Girona	143.8	66.8	89.4	38.8	4.2	80.1	2.2	29.6
Gomera	32.3	13.8	52.2	26.1	2.9	66.7	3.8	14.8
Granada	75.9	28.9	82.2	33.6	5.7	37.9	1.9	6.0
GranCanaria	70.0	29.7	56.6	16.6	3.7	80.3	2.7	10.3
Guadalajara	90.5	29.8	92.3	26.0	6.9	61.5	4.5	18.8



Provincia o Isla	IA x	IA x	IA >65	IA >65	%	% de casos	%	%
	100.000	100.000	años x	años x	positividad	con	ocupación	ocupación
	(14 días)	(7 días)	100.000	100.000	en PDIA**	trazabilidad	camas de	camas de
			(14 días)	(7 días)			agudos por	UCI por
							COVID	COVID
Huelva	105.7	42.3	103.3	42.0	7.9	84.1	2.0	8.2
Huesca	159.4	56.6	134.6	29.7	8.4	42.1	3.9	27.8
Ibiza	85.6	25.7	70.1	20.6	4.2	38.5	3.8	16.3
Jaén	58.3	17.9	62.0	17.9	4.6	71.8	2.5	2.4
Lanzarote	62.9	38.5	29.0	12.4	3.7	81.7	2.7	10.3
LaPalma	13.2	3.6	6.8	0.0	2.9	66.7	3.8	14.8
LaRioja	89.1	34.4	74.9	30.8	3.0	71.8	1.8	9.4
León	50.8	23.9	61.1	33.8	4.7	48.6	0.6	12.0
Lleida	137.5	62.9	110.5	46.5	3.5	78.5	2.3	33.3
Lugo	138.4	48.5	152.4	63.7	4.8	83.6	1.1	2.1
Madrid	105.2	41.9	88.5	35.8	4.6	59.9	4.8	23.9
Málaga	88.4	36.2	76.3	32.1	7.7	39.6	5.8	9.0
Mallorca	107.1	46.6	96.8	51.5	4.2	47.3	3.8	16.3
Melilla	257.2	101.1	196.8	134.6	6.3	60.2	5.5	11.8
Menorca	53.3	37.6	26.2	13.1	4.2	41.7	3.8	16.3
Murcia	93.8	38.0	57.8	19.1	5.8	55.1	1.8	4.8
Navarra	115.1	46.3	105.3	40.9	5.9	72.5	2.5	12.3
Ourense	79.6	28.4	47.6	18.6	2.3	74.7	1.2	9.5
Palencia	83.6	38.0	68.0	34.0	7.4	45.9	1.9	10.0
Pontevedra	64.3	24.9	48.6	21.3	3.0	68.9	0.9	3.7
Salamanca	92.6	35.8	108.1	51.2	6.0	68.6	2.8	10.6
Segovia	46.3	13.7	34.6	2.9	2.5	52.4	1.5	6.5
Sevilla	98.2	37.5	95.9	39.3	8.9	32.8	2.7	8.6
Soria	72.0	36.0	44.3	13.3	3.6	81.2	0.0	14.3
Tarragona	86.1	34.0	65.4	24.1	3.4	78.3	1.1	15.5
Tenerife	67.7	29.0	64.0	32.9	2.9	57.6	3.8	14.8
Teruel	122.2	53.7	58.7	27.8	7.5	59.7	5.8	75.0
Toledo	146.5	50.2	150.6	59.6	10.4	72.5	4.0	10.2
València/Valencia	56.4	23.2	39.2	14.0	5.6	54.1	2.4	4.9
Valladolid	79.9	31.3	136.0	52.8	5.1	69.3	3.5	14.0
Zamora	62.7	17.0	62.8	5.7	3.8	75.9	2.2	15.8
Zaragoza	120.0	50.9	71.8	25.7	7.7	53.3	2.8	11.1

<sup>\*</sup> La información se refiere a provincia de residencia (la única disponible). Por tanto, para el dato por provincias, se han excluído aquellos en los que la provincia de residencia no corresponda a esta comunidad. Para el TOTAL de la comunidad autónoma sí se han incluido todos los casos notificados por ésta, independientemente de su residencia. \*\* PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).