

INDICADORES PRINCIPALES DE SEGUIMIENTO DE COVID-19

Fecha de informe: 19 - Aug - 2021

El documento de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 en España establece unos criterios comunes para la interpretación de los indicadores básicos en el Sistema Nacional de Salud con el fin de realizar una evaluación del riesgo en cada territorio. Para cada indicador se establecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto. En función de estos indicadores, se proponen unos niveles de alerta que determinan actuaciones proporcionales al nivel de riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 y adaptables según la situación y el contexto de cada territorio.

Desde el Ministerio de Sanidad se realiza un seguimiento continuado de la evolución de todos los indicadores a nivel autonómico y provincial. Se establecen dos tipos de indicadores, los considerados como indicadores principales, recogidos en la Tabla 1 del mencionado documento, y los indicadores complementarios, recogidos en el Anexo 1 del mismo documento y que ayudan a valorar y caracterizar la situación de la epidemia y las capacidades de gestión y respuesta con más detalle y adaptada a diferentes territorios. Es importante recalcar que ningún indicador por sí solo es capaz de dar una valoración correcta de la situación epidemiológica. Además de estos indicadores, las comunidades autónomas utilizarán todos aquellos que en su contexto consideren relevantes, así como aspectos referentes a la equidad en salud y la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio. Los indicadores complementarios incluyen entre otros la tendencia ascendente de cada indicador, su velocidad de cambio y la capacidad de respuesta de los sistemas.

El acceso a las vacunas desde finales de diciembre de 2021 ha ido modificando de forma importante la dinámica de transmisión de la enfermedad, cambiando el escenario de riesgo para la población en España. Este cambio se ha hecho más evidente a medida que se han conseguido coberturas de vacunación muy elevadas en los grupos diana establecidos en la estrategia de vacunación. Por otro lado, desde el fin del estado de alarma, el pasado 9 de mayo de 2021, se han ido suavizando progresivamente algunas de las medidas de control de la transmisión del SARS-CoV-2 que desafortunadamente ha ido acompañado de una falta de observancia importante de las todavía vigentes por parte de grande grupos de población, lo que ha supuesto un aumento de la probabilidad de exposición al virus para la población y de infección, sobretodo, para los grupos poco o no vacunados que a mediados de julio son los menores de 40 años y sobretodo los menores de 30 años.


Esta situación ha derivado en un importante incremento de la incidencia en los grupos todavía susceptibles, los menores de 30 años, entre los que la enfermedad es, en general, más leve y genera un porcentaje menor de hospitalizaciones, ingresos en UCIs y fallecimientos, aunque a medida que aumenta la incidencia el número bruto de casos graves también aumenta. Sin embargo, el aumento de la circulación del virus también supone un riesgo de infección para las personas que a pesar de haberse vacunado no han desarrollado inmunidad contra la enfermedad. De acuerdo a los datos de eficacia y efectividad de las vacunas disponibles, este grupo sería alrededor de un 10% de los vacunados.

En todos los casos, pero especialmente en situaciones de cambio importante en la dinámica de la transmisión del SARS-CoV-2, como la actual, se deben valorar, además de los indicadores principales, los indicadores complementarios que permiten una evaluación más fina del nivel de transmisión o de la capacidad de diagnóstico precoz del sistema. Esta evaluación debe hacerse en cada territorio con todos los datos necesarios y teniendo en cuenta que en situaciones en las que se detecte un empeoramiento brusco de la situación epidemiológica, los niveles de alerta podrán establecerse valorando únicamente uno de los dos bloques principales de indicadores, como también se indica en el documento de Actuaciones.

Dada el nuevo escenario de transmisión y riesgo generado tanto por las coberturas de vacunación como por la reducción de las medidas de control de la transmisión y la necesidad de adaptar la estimación de los niveles de alerta a la situación específica de cada territorio en base a los indicadores complementarios, este informe no incluye, a partir del 15 de julio de 2021, los mapas que indican el nivel de aleta de las CCAA y provincias manteniendo los que indican el nivel de riesgo asociado a cada uno de los indicadores principales.



BLOQUE I: Evaluación del nivel de transmisión





BLOQUE II: Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID





TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por CCAA

Comunidad	Incidencia	Incidencia	Incidencia	Incidencia	%	% de casos	%	%
Autónoma	x 100.000	x 100.000	x 100.000	x 100.000	positividad	con	ocupación	ocupación
	(14 días)	(7 días)	en >65	en >65	en PDIA*	trazabilidad	camas de	camas de
			años (14	años (7			agudos	UCI por
			días)	días)			por COVID	COVID
ANDALUCÍA	386.5	132.7	229.4	84.9	16.0	29.0	7.2	12.6
ARAGÓN	358.0	141.9	156.1	52.6	14.9	50.3	6.7	24.3
ASTURIAS	187.1	65.3	91.8	35.0	8.2	35.7	2.9	8.4
C.F.NAVARRA	409.0	172.4	218.2	87.1	13.7	66.8	3.7	22.1
CANARIAS	272.2	105.8	140.9	59.7	8.2	69.8	5.7	20.9
CANTABRIA	433.0	190.6	214.0	88.5	12.8	55.5	5.9	14.4
CASTILLA LA	366.0	139.7	245.0	89.2	15.4	65.5	5.5	14.7
MANCHA								
CASTILLA Y	352.2	151.3	217.9	96.4	13.5	40.5	5.4	19.5
LEÓN								
CATALUÑA	317.1	128.2	216.5	86.0	8.4	61.6	7.0	42.5
CEUTA	597.4	332.5	286.9	143.4	12.0	83.9	3.8	23.5
COMUNIDAD	295.4	110.7	131.9	49.5	13.7	56.7	4.9	12.1
VALENCIANA								
EUSKADI	445.4	201.7	189.1	88.3	14.1	40.0	7.9	20.2
EXTREMADURA	474.6	229.5	313.4	160.5	9.2	51.6	4.0	9.2
GALICIA	389.9	153.6	207.6	93.7	9.4	72.0	3.5	8.7
ISLAS	467.2	180.5	245.9	100.5	9.1	39.8	8.8	25.6
BALEARES								
LA RIOJA	447.3	198.5	235.0	94.0	10.3	66.0	5.1	17.0
MADRID	388.7	160.0	228.4	95.2	12.1	54.7	10.2	32.1
MELILLA	354.9	166.5	372.8	155.3	8.6	52.4	4.2	11.8
MURCIA	362.0	156.7	166.1	75.3	13.1	64.3	4.0	8.6

^{*} PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).



Desagregación de los indicadores del Bloque I por provincia o isla





Desagregación de los indicadores del Bloque II por provincia o isla





TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por provincia o isla*

Provincia o Isla	IA x	IA x	IA >65	IA >65	%	% de casos	%	%
	100.000	100.000	años x	años x	positividad	con	ocupación	ocupación
	(14 días)	(7 días)	100.000	100.000	en PDIA**	trazabilidad	camas de	camas de
			(14 días)	(7 días)			agudos por	UCI por
							COVID	COVID
ACoruña	435.9	166.2	218.9	98.2	11.4	70.7	3.4	10.1
Alacant/Alicante	362.9	139.4	146.0	58.2	15.9	55.2	5.3	12.8
Albacete	338.4	115.6	190.5	64.0	13.2	66.4	5.9	14.8
Almería	364.6	120.8	220.8	70.3	13.6	44.5	5.0	9.7
Araba/Álava	500.7	258.4	193.9	76.7	17.6	36.5	9.6	10.2
Asturias	181.0	62.5	89.9	34.6	8.2	35.7	2.9	8.4
Ávila	440.8	207.4	285.5	164.9	14.4	53.2	5.7	33.3
Badajoz	389.4	164.0	215.8	92.4	7.6	55.2	3.1	7.8
Barcelona	309.2	123.2	220.1	87.4	8.2	65.9	7.7	42.4
Bizkaia	470.2	207.3	196.8	92.3	14.4	39.8	9.4	21.1
Burgos	377.7	140.1	308.3	122.2	14.1	33.9	6.9	22.0
Cáceres	618.1	342.0	457.5	259.2	10.9	48.5	5.5	12.7
Cádiz	370.3	119.5	201.9	77.2	15.8	26.2	5.2	10.6
Cantabria	433.5	190.6	215.5	88.5	12.8	55.5	5.9	14.4
Castelló/Castellón	298.0	121.9	106.1	40.0	12.3	66.7	4.2	13.4
Ceuta	597.4	332.5	286.9	143.4	12.0	83.9	3.8	23.5
CiudadReal	308.3	109.9	215.7	72.6	10.4	71.0	3.1	15.1
Córdoba	335.8	117.5	222.4	87.1	13.9	45.9	6.3	13.3
Cuenca	347.2	134.6	242.1	78.5	13.3	59.8	4.9	2.5
ElHierro	62.8	26.9	50.8	0.0	8.2	100.0	7.7	25.5
Formentera	394.8	176.4	105.2	105.2	9.1	57.1	8.8	25.6
Fuerteventura	231.4	106.1	64.7	16.2	7.9	49.6	3.6	17.4
Gipuzkoa	383.2	167.4	175.1	87.5	12.3	42.8	4.8	23.5
Girona	362.9	158.4	201.7	80.4	9.1	55.7	7.1	55.4
Gomera	23.1	4.6	26.1	0.0	8.2	0.0	7.7	25.5
Granada	307.7	108.4	196.7	61.8	15.8	40.8	5.9	9.5
GranCanaria	288.5	108.1	152.5	59.7	7.9	83.6	3.6	17.4
Guadalajara	317.6	125.2	260.3	130.1	15.8	67.7	4.2	20.8



DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA



Huelva	468.3	156.4	244.0	93.0	16.6	77.3	6.7	17.8
Huesca	451.8	203.9	172.3	49.5	17.6	37.4	8.7	52.6
Ibiza	545.4	200.9	239.2	90.7	9.1	31.5	8.8	25.6
Jaén	422.1	132.4	242.2	85.6	14.1	52.1	8.3	6.1
Lanzarote	132.2	61.6	66.3	12.4	7.9	75.0	3.6	17.4
LaPalma	61.1	34.7	33.9	27.1	8.2	79.3	7.7	25.5
LaRioja	444.8	197.2	233.6	92.5	10.3	65.9	5.1	17.0
León	227.2	109.8	141.6	70.8	14.2	23.8	3.8	17.3
Lleida	369.0	154.8	232.6	101.2	7.5	65.2	2.8	49.2
Lugo	348.2	148.5	229.7	112.7	8.5	77.6	2.7	9.4
Madrid	388.4	160.2	229.0	95.4	12.1	54.6	10.2	32.1
Málaga	407.2	132.6	268.3	97.7	19.6	32.4	11.5	19.6
Mallorca	363.7	142.6	208.0	83.1	9.1	42.5	8.8	25.6
Melilla	354.9	166.5	372.8	155.3	8.6	52.4	4.2	11.8
Menorca	192.4	65.9	104.8	19.6	9.1	19.0	8.8	25.6
Murcia	360.4	156.1	162.3	74.5	13.1	64.5	4.0	8.6
Navarra	409.6	172.7	218.2	87.1	13.7	66.8	3.7	22.1
Ourense	217.5	90.7	144.9	66.3	3.5	61.2	3.6	9.5
Palencia	303.8	116.6	196.8	94.8	15.5	41.7	4.7	45.0
Pontevedra	405.4	160.6	210.8	91.3	9.7	73.9	3.8	6.2
Salamanca	237.2	112.7	117.2	43.2	10.0	24.3	2.1	7.7
Segovia	329.7	132.9	181.9	98.2	9.7	73.5	3.4	19.4
Sevilla	404.5	154.6	221.3	90.1	20.7	13.5	6.7	12.3
Soria	322.9	118.1	115.1	39.8	11.1	71.4	3.9	21.4
Tarragona	304.2	121.5	196.8	73.0	8.6	39.7	4.2	29.8
Tenerife	296.0	111.6	157.8	74.4	8.2	59.6	7.7	25.5
Teruel	304.8	101.4	154.4	43.2	10.9	56.6	4.1	33.3
Toledo	445.5	179.9	292.5	105.9	21.3	63.8	7.5	16.1
València/Valencia	243.4	86.2	126.5	44.6	12.6	55.7	4.6	11.4
Valladolid	340.7	139.4	206.9	81.6	12.8	40.6	8.2	19.3
Zamora	253.8	137.8	199.8	106.6	12.0	64.3	8.7	21.1
Zaragoza	332.9	127.9	149.5	52.9	15.0	55.1	6.6	21.3

^{*} La información se refiere a provincia de residencia (la única disponible). Por tanto, para el dato por provincias, se han excluído aquellos en los que la provincia de residencia no corresponda a esta comunidad. Para el TOTAL de la comunidad autónoma sí se han incluido todos los casos notificados por ésta, independientemente de su residencia. ** PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).