

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LOS CASOS DE MPOX EN ESPAÑA (antes denominada viruela del mono)

Datos extraídos de SiViES el 18/02/2025 a las 07:50h

A fecha de esta actualización se han notificado un total de 8.569 casos confirmados de mpox desde el inicio del brote en abril de 2022, procedentes de 17 Comunidades Autónomas. Ceuta y Melilla no han notificado casos en el periodo. En la tabla 1 se muestra el número de casos acumulados por año y Comunidad Autónoma de notificación.

Tabla 1. Nº de casos confirmados de mpox declarados en SiViES según año y CCAA de notificación

CCAA	Total casos (%)	Casos 2022 (%)	Casos 2023 (%)	Casos 2024 (%)	Casos 2025 (%)
Andalucía	1.031 (12,0)	884 (11,8)	37 (11,3)	110 (16,0)	0
Aragón	79 (0,9)	74 (1,0)	5 (1,5)	0	0
Asturias	61 (0,7)	59 (0,8)	2 (0,6)	0	0
Baleares	247 (2,9)	216 (2,9)	15 (4,6)	16 (2,3)	0
Canarias	182 (2,1)	176 (2,3)	0	6 (0,9)	0
Cantabria	38 (0,54)	36 (0,5)	0	2 (0,3)	0
Castilla La Mancha	84 (1,0)	66 (0,9)	3 (0,9)	14 (2,1)	1 (2,9)
Castilla y León	92 (1,1)	85 (1,1)	3 (0,9)	4 (0,6)	0
Cataluña	2.697 (31,5)	2.330 (31,0)	103 (31,9)	264 (38,4)	0
Extremadura	34 (0,4)	32 (0,4)	1 (0,3)	1 (0,2)	0
Galicia	130 (1,5)	122 (1,6)	2 (0,6)	6 (0,9)	0
Madrid	2.907 (33,9)	2.534 (33,7)	117 (35,9)	223 (32,5)	33 (94,3)
Murcia	106 (1,2)	89 (1,2)	10 (3,1)	7 (1,0)	0
Navarra	23 (0,3)	21 (0,3)	0	2 (0,3)	0
País Vasco	259 (3,0)	245 (3,3)	1 (0,3)	13 (1,9)	0
La Rioja	6 (0,1)	6 (0,1)	0	0	0
C. Valenciana	593 (6,9)	547 (7,3)	26 (8,0)	19 (2,8)	1 (2,9)
Total	8.569	7.522	325	687	35

Con respecto a la última actualización del 11 de febrero se han notificado 56 casos nuevos, correspondientes a 2022 (1 caso), 2024 (21 casos) y 2025 (34 casos).

A continuación, se describen las características de los casos notificados con fecha de inicio de síntomas desde el 01/01/2024 hasta el 18/02/2025 (fecha de cierre de este informe).

1. Características de los casos

Desde enero de 2024 se han notificado 722 casos, de los que 695 (96,3%) disponían de fecha de inicio de síntomas. Las características de estos casos se muestran en la tabla 2. La mayor parte fueron hombres 679 (97,7%); la edad osciló entre 6 y 76 años, con una mediana de edad de 36 años (rango intercuartílico (RIC): 30-43 años). El 65,1% de los casos tenía entre 30 y 49 años y el 42,2% de los casos habían nacido en España.

Tabla 2. Características demográficas de los casos de mpox declarados en SiViES


Características demográficas	Nº de casos	Porcentaje
Sexo		
Hombre	679	97,7
Mujer	16	2,3
Grupos de edad		
Menor de 20	8	1,2
20-29	147	21,2
30-39	275	39,6
40-49	177	25,5
50-59	67	9,6
60 y más	21	3,0
Región de nacimiento		
España	293	42,2
Europa Occidental	19	2,7
Europa Central – Este	9	1,3
Latinoamérica	223	32,1
África del Norte y Oriente Próximo	7	1,0
África Subsahariana	4	0,6
Otros	5	0,7
Desconocido	135	19,4
Total	695	100

2. Características de la enfermedad

Las fechas de inicio de síntomas se observaron entre el 01/01/2024 y el 10/02/2025. La distribución de los casos por mes de inicio de síntomas se muestra en la figura 1.

La mediana en días entre la fecha de inicio del primer síntoma y la fecha de confirmación por laboratorio fue de 7 días (RIC [4-11]) y respecto a la fecha de declaración a nivel de CCAA fue de 4 días (RIC [0-9]).

Figura 1. Curva epidémica de casos confirmados según mes de inicio de síntomas, 2024-2025




Los 31 casos con fecha de inicio de síntomas en enero de 2025 han sido notificados por Madrid y los casos de febrero de 2025 han sido notificados por Valenciana (1 caso) y Madrid (1 caso).

a) Aspectos clínicos

Un total de 459 casos (66,0%) presentaron alguna sintomatología general a lo largo de su proceso clínico (fiebre, astenia, dolor de garganta, dolor muscular o cefalea) siendo la fiebre la más frecuente (349 casos, 50,2%). Un total de 296 casos (42,6%) presentaron linfadenopatías localizadas. El exantema se localizó en la zona anogenital en 499 casos (71,8%), en la zona oral-bucal en 101 casos (14,5%) y en 322 (46,3%) en otras localizaciones (Figura 2).

Figura 2. Manifestaciones clínicas de los casos de mpox, 2024-2025



Sesenta y tres pacientes (10,0% de los 633 casos con información) presentaron complicaciones a lo largo de su proceso clínico: infección bacteriana secundaria (28 casos), ulcera bucal (13 casos), infección corneal (4 casos), celulitis (2 casos), proctitis (2 casos), miocarditis (1 caso), úlcera genital (1 caso), faringoamigdalitis (1 caso), uretritis (1 caso), fisura anal (1 caso), balanitis candidiásica (1 caso) y 8 casos con otras complicaciones.

Hubo 30 hospitalizaciones (4,3%). Todos ellos fueron hombres, con una mediana de edad de 33 años (RIC [25-41]). En los veinte casos en los que la fecha de ingreso y de alta está disponible, la estancia mediana en el hospital fue de 5 días (RIC [3-8]).

Se registró un caso que ingresó en UCI por una sepsis y que fue dado de alta a los 5 días.

b) Antecedentes personales

Un total de 219 casos (33,1% de los 662 casos con información) eran personas diagnosticadas de infección por el VIH.

Cuatro pacientes presentaron otras causas de inmunosupresión.

Respecto a la vacunación, 662 casos (95,3%) no estaban vacunados o se desconocía su estado vacunal, 30 casos (4,3%) estaban vacunados frente a mpox en el contexto actual del brote y tres casos (0,4%) habían sido vacunados de la viruela en la infancia. De los 30 casos vacunados con vacuna frente a mpox, 8 (26,7%) recibieron una sola dosis, 20 (66,7%) dos dosis y en 2 casos (6,7%) no consta el número de dosis.

c) Datos de laboratorio

Todos los casos fueron confirmados por PCR realizada en muestras de lesiones cutáneas (387 casos), líquido vesicular (203 casos), 31 casos en otras muestras y en 74 se desconoce esa información.

En 225 muestras analizadas se ha identificado el clado II. Estas muestras suponen el 60,3% de 373 casos con inicio de síntomas entre agosto de 2024 y febrero de 2025 y corresponden a casos con inicio de síntomas en agosto (10 casos), septiembre (35 casos), octubre (54 casos), noviembre (60 casos) y diciembre (38 casos) de 2024 y enero (28 casos) para 2025.

3. Características de la exposición

De los 567 casos con información, 99 (17,5%) reportaron un contacto estrecho con un caso probable o confirmado. Ochenta y tres casos refirieron antecedente de viaje en los 21 días previos a la fecha de inicio de síntomas, aunque solo 19 fueron clasificados como casos importados. En 9 de los casos importados se dispone de información sobre el destino del viaje (Marruecos (2 casos), Estados Unidos (2 casos), Andorra (1 caso), Hungría (1 caso), República Checa (1 caso), Serbia (1 caso) y Portugal (1 caso)).

Se detectó un brote familiar con afectación de tres miembros de la familia. Ninguno de ellos requirió hospitalización.

El mecanismo de transmisión más probable se atribuyó a un contacto estrecho en el contexto de una relación sexual en 579 casos (83,3%), en 23 casos fue debido a un contacto estrecho en un contexto no sexual (3,3%) y en 93 casos esta información no estaba disponible (13,4%).

Respecto a la orientación sexual de los afectados, excluyendo el caso del menor, 497 casos (71,6%) eran hombres que habían tenido relaciones sexuales con otros hombres, 23 casos (3,3%) eran hombres heterosexuales, 10 casos (1,4%) eran mujeres heterosexuales y en 164 casos (23,6%) no constaba la información.

4. Conclusiones:

- Se ha reforzado la vigilancia epidemiológica y se continúan notificando casos de mpox en España.
- No se observan cambios significativos respecto a las características clínicas y epidemiológicas de los casos con inicio de síntomas desde 2024 respecto a los notificados previamente.

NOTAS:

Debido a la declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud el día 14 de agosto de 2024, la actualización de datos se está realizando de forma semanal. Los datos incluidos en este informe están en continua actualización a través de las notificaciones de las CCAA.