

Statistični testi za dva vzorca

- odvisna vzorca, ang. paired-samples
- neodvisna vzorca, ang. two independent samples

	PARAMETRIČNI	NEPARAMETRIČNI
NEODVISNA VZORCA	T-test za neodvisna vzorca (ang. Independent-Samples T test) $H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \text{ ali } H_1: \mu_1 < \mu_2 \text{ ali } H_1: \mu_1 > \mu_2$ Testiranje deleža pri neodvisnih vzorcih (ang. Independent Samples Proportions) $H_0: p_1 = p_2$ $H_1: p_1 \neq p_2 \text{ ali } H_1: p_1 < p_2 \text{ ali } H_1: p_1 > p_2$	Mann-Whitney-ev test (ang. Mann-Whitney U) $H_0: \text{porazdelitvi sta enaki ali } H_0: Me_1 = Me_2$ $H_1: \text{porazdelitvi nista enaki ali } H_0: Me_1 \neq Me_2$
	T-test za odvisna vzorca (ang. Paired-Samples T test) $H_0: \mu_D = \mu_0$ $H_1: \mu_D \neq \mu_0 \text{ ali } H_1: \mu_D < \mu_0 \text{ ali } H_1: \mu_D > \mu_0$ $\mu_D \text{ je povprečje parnih razlik.}$	Wilcoxonov test (ang. Wilcoxon) $H_0: \text{porazdelitvi sta enaki ali } H_0: Me_1 = Me_2$ $H_1: \text{porazdelitvi nista enaki ali } H_0: Me_1 \neq Me_2$ Testiranje deleža pri odvisnih vzorcih – McNemarjev test (ang. Paired Samples Proportions) $H_0: p_1 = p_2$ $H_1: p_1 \neq p_2 \text{ ali } H_1: p_1 < p_2 \text{ ali } H_1: p_1 > p_2$
ODVISNA VZORCA		

14.1 Odvisni in neodvisni vzorci (odvisne in neodvisne meritve)

Primer

Želimo ugotoviti, ali dopust vpliva na raven stresa pri ljudeh.

Da bi to ugotovili, ustvarimo majhno spletno anketo z vprašanji, ki merijo raven stresa.

V anketi bomo ljudem zastavili vprašanja o ravni stresa pred in po dopustu.





Optično
preberite kodo
QR ali pa
uporabite
povezavo za
pridružitev



<https://forms.office.com/e/SzGZ72EceF>

Kopiraj povezavo

0 odgovor je poslan

Vzamemo vzorec ljudi, ki so imeli operacijo kolena, in jih anketiramo pred in po operaciji.

Odvisna vzorca.

Neodvisna vzorca

Drevesni grafikon z gnezdenimi pravokotniki

Bar



1
o
d



Pokaži pravilen odgovor

Komentar

Odvisni vzorci:

- Ista enota v dveh različnih časih (pred in po operaciji kolena)
- Ista enota z dvema različnima načinoma (načini šifriranja, teniški lopar)
- Ni nujno ista oseba, pač pa ista statistična enota (v partnerskih razmerjih ženske opravljajo več vrtnarskih del kot moški)

Neodvisni vzorci:

- vrednosti prihajajo iz dveh ali več različnih (neodvisnih) skupin

Vpišite podatke v SPSS

Anketiranec	Raven stresa pred dopustom	Raven stresa po dopustu
1	6	2
2	7	5
3	4	6
4	5	5
5	9	4
6	7	3
7	9	7
8	10	6

Vpišite podatke v SPSS

Dohodek moški	Dohodek ženske
1259	1828
1887	2027
1402	1399
1702	2720