PROTELO

(МОШИН)

КОНСПЕКТЫ УРОКОВ ПРОГРАММЫ ОСНОВЫ НУТРИЦИОЛОГИИ II СТУПЕНЬ

ПРОГРАММА КУРСА «ОСНОВЫ НУТРИЦИОЛОГИИ» - II СТУПЕНЬ

УРОК 1. Желудок. Пониженная и повышенная кислотность. Нутрицевтики для восстановления слизистой желудка. Гастрит, гастродуоденит, колит, НЯК: схема работы.

УРОК 2. ГЭРБ: причины, схема работы.

УРОК 3. Helicobacter pylori: причины, диагностика, схема работы, нутрицевтики.

УРОК 4. Печень. Фазы детоксификации печени. Лабораторная диагностика печени. Нутрицевтики для восстановления печени. Гемангиома.

УРОК 5. Желчный пузырь и его заболевания: дискинезия, холецистит, полипы, загибы желчного пузыря. Камни и схема работы с ними. Удаленный желчный пузырь. Схемы работы и нутрицевтики.

УРОК 6. Синдром Жильбера. Нутрицевтики и схема работы.

УРОК 7. Поджелудочная железа. Лучшие ферменты. Панкреатит. Лабораторная диагностика. Глютен. Целиакия. Лабораторная диагностика.

УРОК 8. Тонкий кишечник. Дисбактериоз. СИБР. СДК. Схемы работы. Анализ по Осипову.

УРОК 9. Толстый кишечник. Копрограмма. Пример расшифровки. Почки. Камни. Общий анализ мочи.

УРОК 10. Липидный спектр. Атеросклероз. Коэффициент атерогенности. Холестерин. Гомоцистеин. Статины. Схемы работы и нутрицевтики.

УРОК 11. Углеводный обмен. Инсулинорезистентность. Сахарный диабет I и II типа. Схема работы.

УРОК 12. Витамины. Анализы. Лучшие формы и дозировки.

УРОК 13. Минералы. Анализы. Лучшие формы и дозировки.

УРОК 14. Анемия. Препараты. Схема лечения.

УРОК 15. Общий анализ крови.

УРОК 16. Биохимический анализ крови. Работа с воспалениями.

УРОК 17. Щитовидная железа. Йод. Гипо и гипертиреоз. Анализы. Схема работы.

УРОК 18. Аутоиммунный тиреоидит. Причины. Способы работы со снижением антител. Вирус Эпшейна - Барр.

УРОК 19. Разбор анализов (обучение).

УРОК 20. Заболевания кожи: акне, розацеа, демодекоз. Схемы работы с заболеваниями кожи. Коллаген: препараты.

УРОК 21. Половые гормоны. Синдром доминирования эстрогенов: схема работы. Мастопатия: схема работы. КОК. Климакс.

УРОК 22. Аутоиммунные заболевания. Эндометриоз. Схема работы с аутоиммунными заболеваниями. Разбор анализа № 2.

УРОК 23. Цистит. Кандидоз. Схема работы. Пигментация.

УРОК 24. Выпадение волос: причины, план работы с выпадением волос. Лимфатическая и иммунная система: обзор.

УРОК 25. Нервная система. Стресс. Мигрень: причины и способы работы.

УРОК 26. Хронический тонзиллит: схема работы. Суставы. Остеопороз. Схема работы. Разбор анализа № 3.

УРОК 27. Подготовка к беременности. Восстановление и диагностика после COVID-19.

УРОК 28. Обзор адаптогенов: кому и зачем.

УРОК 29. Паразитоз. Два антипаразитарных курса на травах. Схема работы. Меню.

УРОК 30. Разбор анализа № 4. Работа с клиентами: анкета, дневник питания и его разбор. Чек лист анализов для клиентов. Где искать клиентов. Личный бренд нутрициолога.

УРОК 1. ЖЕЛУДОК. ПОНИЖЕННАЯ И ПОВЫШЕННАЯ КИСЛОТНОСТЬ. НУТРИЦЕВТИКИ ДЛЯ ЗАЛЕЧИВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛУДКА.

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – это система органов, в которых осуществляется механическая и химическая обработка пищи, всасывание переработанных питательных веществ и выведение неусвоенных составных частей пищи.

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ ЗДОРОВОГО ЖКТ?

- ✓ адекватное питание в соответствии с заболеваниями и конституцией тела;
- ✓ тщательное пережевывание пищи – это залог здоровья и долголетия!
- ✓ адекватное количество и качество пищеварительных соков и ферментов;
- ✓ здоровый микробиом и отсутствие паразитов;
- ✓ нейрогормональная регуляция.

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СОСТОИТ ИЗ:

Пищеварительного тракта	**Пищеварительных желез**
ротовая полость	печень
глотка и пищевод	часть поджелудочной железы
желудок	
тонкий кишечник	
толстый кишечник и анальное отверстие	

РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ (ФУНКЦИИ):

В ротовой полости происходит измельчение и переваривание пищи.

МУЦИНЫ – вещество слюны	Это сложные белки, придающие слюне вязкость и клейкость, способствуют смачиванию и склеиванию пищевого комка и облегчают его проглатывание. У эктоморфов часто не хватает муцинов и им нужно запивать еду теплой водой небольшими глоточками.

АЛЬФА-АМИЛАЗА – фермент слюны	Участвует в переваривании крахмалов и гликогена с образованием мальтозы и сахарозы.
ЛИЗОЦИМ – антибактериальный агент слюны	Разрушает клеточные стенки чужеродных бактерий. Обезвреживание пищи.

ГЛОТКА И ПИЩЕВОД

ПИЩЕВОД – это полный трубчатый орган, который служит для проведения пищи из глотки и желудок.

ЖЕЛУДОК

ЖЕЛУДОК – это полый мышечный орган, расположенный между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.

В желудке пища может находится от 30 минут до 4-6 часов.

В слизистой оболочке желудка образуется внутренний фактор Касла, который связывает B12 и способствует его адсорбции (поглощение) кишечной стенкой.

Желудок имеет два сфинктера (клапана). Один разделяет желудок и пищевод. Второй – желудок и двенадцатиперстную кишку.

При забросе пищи из желудка в пищевод образуется изжога.

РЕФЛ**Ю**КС – ОБРАТНЫЙ ТОК СОДЕРЖИМОГО ПОЛЫХ ОРГАНОВ ПО СРАВНЕНИЮ С НОРМАЛЬНЫМ ЕГО ДВИЖЕНИЕМ (ГЭРБ).

Форма желудка, его положение, размеры постоянно меняются в зависимости от принятой пищи и ее количества, положения тела и типа телосложения.

В желудке происходит механическое перемешивание еды, химическое переваривание пищи. Под воздействием соляной кислоты, а также ферментов пепсина и липазы, пищевой комок превращается в химус.

В верхней части желудка происходит образование соляной кислоты, а в нижней части вырабатывается щелочь для нейтрализации кислоты.



ЖЕЛУДОЧНЫЙ СОК СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ:

- соляную кислоту:

pH – 1,5 – 2 кислая среда. PH меньше 2 – норма для желудка.

pH от 3 до 5 – гипохлоргидрия (нехватка соляной кислоты).

pH больше 5 – нет кислоты вообще – АХЛОРГИДРИЯ.

- пепсины и желудочную липазу;
- муцин;
- внутренний фактор Касла (необходим для всасывания B12).

ГИПОХЛОРГИДРИЯ или ГИПОАЦИДНОСТЬ – это низкий уровень кислотности в организме.

Человек с низким уровнем кислотности не способен продуцировать в достаточном количестве соляной кислоты, в следствие чего нарушается процесс пищеварения и снижаются защитные свойства желудка по нейтрализации бактерий и патогенов.

ГИПОХЛОРГИДРИЯ – основная причина быстрого старения организма.

ТРИ ФУНКЦИИ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ:

1. Дробление сложных молекул белкового и иного происхождения.
2. В желудке вырабатывается слизь, которая содержит фактор Касла, который обеспечивает усвоение витамина B12.
3. Уничтожение бактерий, личинок, вирусов и патогенов соляной кислотой.

СИМПТОМЫ ГИПОХЛОРГИДРИИ:

- изжога;
- тяжесть после белковой пищи;
- диарея или запор;
- неприятный запах изо рта;
- отрыжка с серным привкусом (тухлого яйца).

ПОСЛЕДСТВИЯ ГИПОХЛОРГИДРИИ:

- дефицит белка;
- выпадение волос;
- пищевая аллергия;
- сухость во рту;
- частичная потеря вкуса и запаха;
- плохая непереносимость зубных протезов;
- вздутия, частые отрыжки, газы, изжога, тошнота;
- непереваренные куски пищи в кале, жирные кислоты, мышечные волокна (видно в копрограмме);
- дефицит B12, фолиевой кислоты, железа (низкий ферритин), т.к. соляная кислота дробит молекулы пищи для всасывания их в тонком кишечнике. Если кислоты мало, то пища плохо всасывается, образуя дефицитные состояния, особенно это проявляется еще и при углеводном питании;
- слабые ногти (мягкие, ломкие, слоящиеся);
- зловонный стул (из-за плохого переваривания белка и нехватки кислоты она начинает гнить в кишечнике).

ЗАБОЛЕВАНИЯ СВЯЗАННЫЕ С ГИПОХЛОРГИДРИЕЙ:

- гипо и гипертиреоз;
- камни, полипы в желчном пузыре, застой желчи;
- заболевания кожи: экзема, крапивница, витилиго, псориаз, розацеа;
- астма;
- артриты;
- целиакия;
- болезнь Аддисона;
- гастриты и полипы в желудке;
- дисбиоз:
- запоры (СИБР, СДК, СРК);
- сахарный диабет.

ПРИЧИНЫ СНИЖЕННОЙ КИСЛОТНОСТИ ЖЕЛУДКА:

- плохое пережевывание пищи (нужно жевать до состояния кашицы и только потом глотать);
- употребление пищи во время стресса, переедание;
- пищевая непереносимость (глютен и молочные продукты);

- дефицит магния, цинка, натрия, хлора, железа, витаминов С, Е, Д, витаминов группы В (все эти микроэлементы продуцирую выработку соляной кислоты);
- АИТ, гипотиреоз;
- возраст;
- прием лекарств: антациды и ИПП (ингибиторы протонной помпы, которые назначаются часто при сниженной кислотности для лечения Helicobacter Pylori), антибиотиков, КОК, НПВС;
- бактериальная инфекция (Helicobacter Pylori) – данная бактерия живет с нами миллионы лет. Но важно, чтобы она не разрасталась и не повреждала слизистую желудка. Часто это происходит при снижении кислотности;
- операции на ЖКТ.

ДОМАШНИЙ ТЕСТ

НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА

½ ч.л. соды развести в 100 мл теплой воды и выпить натощак. Засечь время: если отрыжка произошла в течение 2-3 минут, то желудочного сока достаточно, если за 3 минуты ничего не произошло, то это указывает на пониженную кислотность.

Данный тест нужно выполнять в динамике 3 дня. При дискомфорте в желудке не повторять.

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КИСЛОТНОСТИ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА:

1. **КОПРОГРАММА**. В копрограмме показателями низкой кислотности являются:

   - ✓ показатель щелочной среды pH выше 7,5-8;
   - ✓ остатки непереваренной пищи;
   - ✓ мышечные волокна с исчерченностью и без исчерченности;
   - ✓ соединительная ткань.

2. **ВНУТРИЖЕЛУДОЧНАЯ PH-МЕТРИЯ** (глотание зонда во время эндоскопии - ФГДС, не больно!, если на современном оборудовании), не является информативным методом, т.к. определяет уровень соляной кислоты в моменте;

3. **СУТОЧНАЯ PH-МЕТРИЯ** – самый достоверный способ, где в течение суток специальным прибором измеряется уровень кислотности шагом в час. Измеряется кислотность в пищеводе, разных отделах желудка и двенадцатиперстной кишке.



4. **ГАСТРОПАНЕЛЬ** – анализ крови на Пепсиноген-I-II, Гастрин-17, антитела к Helicobacter Pylori (косвенный показатель кислотности). Гастропанель должна оцениваться комплексно с копрограммой, уровнем общего белка и симптоматикой;

5. **КАПСУЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЯ** оценивает всю пищеварительную систему (широко распространена в США, не распространена в РФ). Проглатывается электронная видео капсула, которая продвигается по всему ЖКУТ, измеряя кислотность.

Повышенная кислотность диагностируется реже гипоацидности. Изжога не всегда указывает именно на повышенную кислотность, она также может быть и при пониженной кислотности.

ПОЧЕМУ ВАЖНО РАБОТАТЬ С ПОНИЖЕННОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ?

- при гипоацидности белка с трудом перевариваются. Отсюда у многих ощущений,что мясо гниет в кишечнике, т.к. возникает запор;
- углеводы при сниженной кислотности начинают процесс брожения;
- не переваренная пища приводит к СИБР в тонкой кишке;
- вследствие чего возникает СРК и СДК;
- хроническое воспаление кишечника приводит к аутоиммунным заболеваниям, пищевой непереносимости, аллергии, экземе и пр.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СНИЖЕННОЙ КИСЛОТНОСТИ?

- тщательно пережевывать пищу, есть только при чувстве голодан на 3-4 балла;
- убрать перекусы и не переедать;
- пить не холодную воду, а теплую;
- употребление минеральной воды Ессентуки 17, выпуская газы;
- до еды за 20-30 минут съесть фрукт: яблоко, грейпфрут, киви. Сладко-кислые фрукты до еды повышают кислотность в желудке. Люди с повышенной кислотностью не могут натощак есть такие фрукты, также аккуратно при инсулинорезистентности;
- мясо, рыбу обильно поливать лимоном;
- включать сырую клетчатку (сырые салаты);
- до еды выпить 100-150 мл теплой воды с лимоном (не кружок лимона кинуть в стакан, а выжать сок из ¼ части лимона) или после еды выпить до 100 мл теплого травяного чая с лимоном (не сладкий);
- до или после белковой еды (кроме бобовых) выпить грейпфрутовый фреш;
- 1-2 ч.л. нефильтрованного яблочного уксуса размешать в стакане воды и выпить за 30 минут до еды. Яблочный уксус хорошо работает с патогенной флорой, в том числе и с кандидозом. Дозировку нефильтрованного яблочного уксуса иожно увеличивать до 4 ч.л. на стакан воды, пока вы не начнете испытывать дискомфорт.

Яблочный укус в капсулах подходит тем людям, у кого чувствительная эмаль зубов или препарат нужно брать с собой. Яблочный уксус в капсулах пить по 1-2 капсулы уксуса во время еды.

После фруктов, ягод, кислых напитков нужно обязательно полоскать рот, чтобы кислота не разрушала эмаль зубов.

Если желудок плохо реагирует – в начале еды употреблять. Или пройти этап заживления слизистой сначала (или сочетать).

НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС В КАПСУЛАХ И В ЖИДКОМ ВИДЕ

КАК ПРИНИМАТЬ:

1- 4 ч.л. на стакан воды за 30 минут до еды.

1-2 капсулы во время приема белковой пищи.

- убрать дефициты магния, цинка, железа, витаминов С, Е, Д, витаминов группы В;
- прием бетаина с пепсином во время основных белковых приемов пищи (запрещено пить данный препарат до еды или натощак).

БЕТАИН ГИДРОХЛОРИД – препарат, который помогает выработать соляную кислоту за счёт пепсина. Пепсин – это фермент участвующий в разложении белков. Также содержит ферменты, улучшающие процесс пищеварения и устранения дефицитов.

Если после еды сильная тяжесть, если снижен общий белок, в копрограмме есть мышечные волокна, то возможен прием бетаина гидрохлорида.

БЕТАИН ГИДРОХЛОРИД

Принимать при сильной тяжести после еды.

Не принимать при гастритах с атрофией, при обострении гастрита, при голодных болях в желудке.

1-2 капсулы во время белковой пищи.

КАК ПРИНИМАТЬ ЭТОТ ПРЕПАРАТ?

По 1 капсуле СТРОГО ВО ВРЕМЯ ЕДЫ (БЕЛКОВАЯ ПИЩА ПРИ ЭТОМ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО) в каждый основной прием пищи. Если появляется дискомфорт (жжение, печение) убрать или снизить дозировку. Не принимать на голодный желудок или натощак.

ВНИМАНИЕ! Бетаин противопоказан при язве желудка, двенадцатиперстной кишки, при обострении гастродуоденита, при гастритах с атрофией, при обострении гастрита, при голодных болях в желудке.

Капсулы нельзя растворять в воде или выливать содержимое в пищу (можно повредить эмаль зубов).

Перед применением во время беременности, лактации, приема лекарств или при наличии каких-либо заболеваний (особенно кислотного рефлюкса) следует проконсультироваться с врачом.

Прежде чем принимать бетаин разберитесь с тем, что написано на странице 6 данного конспекта, т.е. с причинами сниженной кислотности.

ХОРОШИЙ УРОВЕНЬ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ НЕ ДОПУСКАЕТ РАЗРАСТАНИЕ БАКТЕРИИ Helicobacter Pylori, которая является причиной №1 гастритов и язв двенадцатиперстной кишки.

КАКИЕ АНАЛИЗЫ СДАТЬ ПОСЛЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ГИПОХЛОРГИДРИИ?

- цинк;
- кальций;
- В12;
- ферритин и гемоглобин в ОАК;
- фолиевая кислота;
- витамин С;
- общий белок.

СИМПТОМЫ ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТИ ЖЕЛУДКА (ГИПЕРАЦИДНОСТИ):

- изжога;
- кислота во рту;
- отрыжка;
- приступы боли;
- тяжесть после еды – ощущение переполненности желудка даже после небольшого перекуса;
- диарея, запор, вздутия из-за избытка кислоты.

ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ КИСЛОТНОСТИ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА:

Основная причина – пищевая (алиментарная):

- нерегулярный прием пищи;
- питание фаст-фудом;
- злоупотребление кофе, спиртными напитками, копченостями.

Вторая причина - длительный прием препаратов, оказывающих негативное действие на стенку желудка (ИПП и антациды).

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТИ?

Работать с питанием и принимать один из нутрицевтиков ниже, снижающие кислотность и залечивающие слизистую желудка.

ПРИ ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТИ ИЗ РАЦИОНА ИСКЛЮЧАЮТСЯ:

- кофе, фрукты, кислые ягоды, молочные и кисломолочные продукты, цитрусовые;
- пасленовые: томаты, перец, баклажан, картофель;
- крепкие и жирные бульоны (особенно грибные);
- сырые овощи, соленья, маринады, острые овощные закуски;
- свежие лук и чеснок, лимонный сок;
- копчености с большим количеством специй;
- черный хлеб;
- газированные напитки.

Добавить в рацион каши, рис, легкий вид мяса, рыбы и морепродукты, тушеные овощи, полусырые салаты (с ними нужно экспериментировать при помощи дневника питания).

НУТРИЦЕВТИКИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КИСЛОТНОСТИ

(не принимать все сразу, принимать по одному, наблюдая за реакцией организма на них)

ACID SOOTHE - содержит ферменты, лист папайи и другие растительные средства для поддержания оптимального пищеварения и облегчения симптомов, связанных с эпизодическими желудочно-кишечными расстройствами. Zinc Carnosine способствует укреплению слизистой оболочки желудка, действуя как буфер для желудочной кислоты.

Acid Soothe -
это смесь ферментов и цинка карнозина.

КАК ПРИНИМАТЬ?

По 1 капсуле после приема пищи

МАСТИКОВАЯ СМОЛА (Mustic Gum) – поддерживает здоровье клеток желудка, регулирет выработку соляной кислоты и заживляет стенку желудка. Уменьшает воспаление не только при ГЭРБ, но и при болезни Крона.

МАСТИКОВАЯ СМОЛА

КАК ПРИМЕНЯТЬ:

2 капсулы перед завтраком

НУТРИЦЕВТИКИ ДЛЯ ЗАЖИВЛЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛУДКА

ВНИМАНИЕ! Данные нутрицевтики необходимо принимать не все сразу, а по одному виду и отслеживать реакцию, при малейших неприятных ощущениях – отменяйте.

АЛОЭ ВЕРА – нормализует pH желудка, имеет антибактериальное свойство, восстанавливает слизистую не только желудка, но и кишечника. Эффективна при запорах.

АЛОЭ ВЕРА

КАК ПРИНИМАТЬ:

30 мл за 15-20 минут до еды
1-2 раза в день

!!! Нельзя при аутоиммунном гастрите

Не должен содержать спирт в составе

МАСТИКОВАЯ СМОЛА (Mustic Gum) – соединения мастиковой смолы являются природными антибиотиками и антисептиками. Уменьшает воспаление не только при ГЭРБ, но и при болезни Крона.

МАСТИКОВАЯ СМОЛА

КАК ПРИМЕНЯТЬ:

2 капсулы
перед завтраком

РЖАВЫЙ ВЯЗ (Slippery Elm) – скользкий (ржавый, красный) вяз благодаря слизи, которая содержит полиурониды, приобретает гелеобразную форму в ЖКТ. Обволакивает слизистые оболочки, уменьшает воспаление и раздражение в пищеварительном тракте (а также при заболеваниях дыхательных путей).

РЖАВЫЙ ВЯЗ

КАК ПРИМЕНЯТЬ:

½-1 ч. ложки развести в 1 стакане воды за 30 мин до еды. Лучше в порошке.

Или по 2 капсулы 3 раза в день во время еды.

ЦИНКА КАРНОЗИН (Zinc-L-Carnosine) – обладает одним из лучших гастрозащитных эффектов, работает с нейтрализацией бактерии Helicobacter Pylori и уменьшает повреждение слизистой ЖКТ на 75%. Также данный нутрицевтик очень эффективен при язвенном колите.

ЦИНКА КАРНОЗИН

КАК ПРИНИМАТЬ?

По 2 капсулы 2 раза в день за 30 минут до еды (можно 1 раз перед сном)

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ для восстановления слизистой, подходят при любой кислотности.

КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ

ПОДХОДЯТ ПРИ ЛЮБОЙ КИСЛОТНОСТИ

КАК ПРИМЕНЯТЬ:

по 1 капсуле 2 раза в день перед едой

ЛЬНЯНОЙ КИСЕЛЬ (для тех, кому можно лен) также хорошо помогает заживлять стенки ЖКТ.

Курс приема киселя - 3 курса по 10 дней с перерывом 5-10 дней между курсами.

В период приема киселя отменяем все желчегонные средства.

Показания для приема киселя из льняного семени:

- эзофагит (воспаление пищевода);
- гастроэнтерит, острый и хронический;
- язва желудка;
- язва двенадцатиперстной кишки;
- запоры.

Льняной кисель противопоказан при холецистите, при камнях в желчном пузыре.

Рецепт приготовления: столовую ложку семян засыпать в термос, залить 2 стаканами кипятка, настоять 8 часов, процедить. Пить за 30 минут до еды по ½ стакана.

ГАСТРИТ

Гастрит – это заболевание воспалительного или воспалительно-дистрофического характера, при котором поражается внутренняя поверхность желудка. В норме слизистая оболочка выстилает всю поверхность органа и играет важную роль в процессе пищеварения.

ПРИЧИНЫ ГАСТРИТА:

- пищевые отравления;
- переедания;
- прием фарм препаратов;
- агрессивный желчегонный, паразитарный или противогрибковый курс;
- сниженная или повышенная кислотность желудочного сока;
- Helicobacter Pillory

СИМПТОМЫ ГАСТРИТА:

- боли в желудке;
- жжение;
- голодные боли в области желудка или 12-перстной кишки.

НУТРИЦЕВТИЧЕСКАЯ СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРИТА, А ТАКЖЕ ГАСТРОДУОДЕНИТА, КОЛИТА и НЯК.

1. Работа с питанием и переход на безмолочный и безглютеновый рацион питания с ограничением сладких продуктов.
2. Исключение Helicobacter Pillory.
3. Прием нутрицевтиков, обладающих обволакивающим свойством, создающие «пленку» на слизистой и стимулирующие рост и восстановление эпителиального покрова слизистых + прием болеутоляющих препаратов.

НУТРИЦЕВТИЧЕСКАЯ СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРИТА, ГАСТРОДУОДЕНИТА, КОЛИТА, НЯК.

препараты принимаются в комплексе от 1 недели до 2 месяцев

(зависит от симптомов гастрита)

На время лечение данные нутрицевтики создают защитную пленку в желудке, поэтому прием витаминов и минералов следует отложить, т.к. может нарушаться их всасываемость.

Схема подходит для лечения гастрита (острого и хронического), гастродуоденита, колита, НЯК, СРК.

1. **Органическая мастика/мастиковая смола (mastic gum)** по 2 капсуле за 20 минут до завтрака натощак.
2. **Корень Алтея (Marshmallow)** по 2 капсуле 2 раза в день с едой.
3. **Экстракт корня лакрицы/солодки (DGL)** за 20 минут до еды 3 раза в день по 1 капсуле.
4. **Скользкий Вяз** по 2 капсуле 3 раза в день между приемами пищи.
5. **L-глютамин** по 1 мерной ложке в стакане воды за час до завтрака и ужина.

АПТЕЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОТ БОЛИ В ЖЕЛУДКЕ

1. **Mucosa compositum** – гомеопатическое средство. Продается в ампулах, для внутривенного введения, но при болях в желудке нужно одну ампулу развести в 150 мл воды и выпить. Принимать по 1 ампуле в день 5 дней подряд, наряду с лечением выше. Восстанавливает слизистую и снимает боли в желудке.

2. **Гастрарекс НЕО или Гастрарекс** – это витамин U, который является противоязвенным фактором, уменьшает боли в желудке, восстанавливает слизистую и нормализует кислотность.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

1. Какие органы и железы входят в систему пищеварения?
2. Что такое муцины?
3. Как называется фермент слюны, который участвует в расщеплении крахмалов?
4. Что такое лизоцим? Для чего он нужен?
5. Какие клапаны есть в желудке?
6. Что такое рефлюкс?
7. Из каких веществ состоит желудочный сок?

8. Что такое: гипохлоргидрия, гипоацидность, ахлоргидрия, гиперацидность?
9. Какой pH говорит о хорошей кислотности?
10. Какой pH указывает на гипохлоргидрию, а какой на ахлогидрию?
11. Расскажите о трех функциях соляной кислоты.
12. Назовите симптомы и последствия гипохлоргидрии?
13. Какие заболевания могут возникнуть при гипоацидности?
14. Расскажите о домашнем тесте на гипохлоргидрию?
15. Какие причины снижения кислотности вы знаете?
16. Какой лабораторный метод определения кислотности самый лучший?
17. А какой менее информативный?
18. Изжога бывает только при повышенной кислотности?
19. Почему важно работать с повышением кислотности желудочного сока?
20. К вам пришел клиент со сниженной кислотностью, какие рекомендации вы ему дадите в первую очередь?
21. Как правильно принимать яблочный уксус?
22. В каких случаях назначается бетаин хлорид?
23. Как бактерия Helicobacter Pylori связана с кислотностью желудочного сока?
24. Какие дефициты чаще всего возникают при гипохлоргидрии?
25. Назовите симптомы гиперацидности?
26. Почему повышается кислотность?
27. Какие продукты нужно исключить при гиперацидности?
28. Какие нутрицевтики помогают снизить кислотность?
29. Какие нутрицевтики для заживления слизистой желудка вы знаете? Их можно применять все сразу, одновременно или один на выбор?
30. Как лечить гастрит и другие заболевания желудка?
31. Какие препараты помогут снять боль в желудке?
32. Как готовить льняной кисель для заживления слизистой желудка?
33. Как лечить гастрит?
34. Какие симптомы гастрита?
35. Назовите причины гастрита.