

Abgabe Algebra I, Blatt 09

Studierende(r): Weerts, Steffen, steffen.weerts@uni-oldenburg.de

Aufgabe 9.1

- (a) Sei p eine Primzahl, $F_p := \sum_{i=0}^{p-1} t^i \in \mathbb{Q}[t]$ und $\zeta_p := e^{\frac{2\pi i}{p}}$.

Zu zeigen: F_p ist Minimalpolynom von ζ_p über \mathbb{Q} .

Es gilt:

$$\begin{aligned} \left(e^{\frac{2\pi i}{p}}\right)^p &= e^{2\pi i} = 1. \\ \implies \text{für } h &:= t^p - 1 \text{ gilt } h(\zeta_p) = 0. \end{aligned}$$

Da jedoch h nicht irreduzibel ist, ist h nicht das Minimalpolynom von ζ_p über \mathbb{Q} . Es gilt:

$$\begin{aligned} t^p - 1 &= (t - 1)(t^{p-1} + t^{p-2} + \dots + t^2 + t + 1) \\ &= (t - 1) \sum_{i=0}^{p-1} t^i = (t - 1) \cdot F_p. \\ \implies e^{\frac{2\pi i}{p}} - 1 &= 0 \text{ oder } F_p / e^{\frac{2\pi i}{p}} = 0. \end{aligned}$$

Da $e^{\frac{2\pi i}{p}} - 1 = 0 \iff p = 1$, kann $e^{\frac{2\pi i}{p}} - 1 \neq 0$, denn p ist Primzahl und damit nicht 1. Folglich muss $F_p(\zeta_p) = 0$ gelten.

Zu zeigen: F_p ist irreduzibel.

Es gilt:

$$\begin{aligned} F_p &= \sum_{i=0}^{p-1} t^i \\ \implies F_p &\text{ konstant} \iff p = 1 \\ &\stackrel{p \text{ Primzahl}}{\implies} F_p \text{ nicht konstant.} \end{aligned}$$

Sei $a := 1 \in \mathbb{Q}$. Es gilt:

$$\begin{aligned} F_p(t+1) &= \sum_{i=0}^{p-1} (t+1)^i \\ &= (t+1)^{p-1} + (t+1)^{p-2} + \dots + (t+1)^2 + (t+1)^1 + (t+1)^0 \\ &= \sum_{i=0}^{p-1} \binom{p-1}{i} \cdot t^{p-1-i} \cdot 1^i + \sum_{i=0}^{p-2} \binom{p-2}{i} \cdot t^{p-2-i} \cdot 1^i + \dots \\ &\quad + \sum_{i=0}^2 \binom{2}{i} \cdot t^{2-i} \cdot 1^i + \sum_{i=0}^1 \binom{1}{i} \cdot t^{1-i} \cdot 1^i + \sum_{i=0}^0 \binom{0}{i} \cdot t^{0-i} \cdot 1^i \end{aligned}$$

$$= \sum_{i=0}^{p-1} \left(\sum_{j=0}^i \binom{i}{j} \cdot t^{i-j} \right)$$

Die Koeffizienten der einzelnen Summen (für $n \in \{0, \dots, p-1\}$) finden sich als Zeilen im Pascalschen Dreieck, wobei die Koeffizienten mit gleicher Potenz von t auf einer Spalte (von rechts oben nach links unten) liegen. Diese Summe kann man also als Summe der Spalten bis zur Zeile $p-1$ auffassen. Diese ist:

$$\sum_{i=0}^{p-1} \left(t^i \cdot \sum_{j=0}^{p-1} \binom{j}{i} \right) = \sum_{i=0}^{p-1} \left(t^i \cdot \sum_{j=i}^{p-1} \binom{j}{i} \right).$$

Nach (A1) (siehe Anhang) gilt:

$$\sum_{i=0}^{p-1} \left(t^i \cdot \sum_{j=i}^{p-1} \binom{j}{i} \right) \stackrel{\text{A1}}{=} \sum_{i=0}^{p-1} \binom{p}{i+1} \cdot t^i =: f$$

Nun gilt:

- (i) $p \nmid \binom{p}{(p-1)+1} = 1 = \text{LC}(F_p),$
- (ii) $p \mid \binom{p}{i+1} = a_i \quad \forall i = 0, \dots, p-2,$
- (iii) $p^2 \nmid \binom{p}{1} = p = a_0.$

$\xRightarrow{\text{Eisenstein}} F_p$ Minimalpolynom von ζ_p über \mathbb{Q} .

Nach Eisenstein folgt zunächst nur Irreduzibilität in \mathbb{Z} Es muss dafür noch überprüft werden, ob das Polynom in \mathbb{Z} liegt und primitiv ist. -0,5 P

Zu zeigen: $[\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}] = p-1$ und $(1, \zeta_p, \zeta_p^2, \dots, \zeta_p^{p-2})$ ist Basis von $\mathbb{Q}(\zeta_p)$.
Es gilt:

ζ_p ist algebraisch über \mathbb{Q}

$$\xRightarrow{6.2.9} [\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}] = \deg(F_p) = p-1 \text{ und } (1, \zeta_p, \zeta_p^2, \dots, \zeta_p^{p-2}) \text{ ist Basis von } \mathbb{Q}(\zeta_p).$$

Zu zeigen: Alle Nullstellen von F_p liegen in $\mathbb{Q}(\zeta_p)$.

Fehlt. -1 P

”□”

Punkte Teil a): 1,5/3

- (b) (i) Sei $f_1 = t^4 - 5 \in \mathbb{Q}[t]$.
Es gilt:

$$\begin{aligned} f_1 &= t^4 - 5 \\ &= (t^2 + \sqrt{5})(t^2 - \sqrt{5}) \\ &= (t + \sqrt[4]{5}i)(t - \sqrt[4]{5}i)(t + \sqrt[4]{5})(t - \sqrt[4]{5}) \end{aligned}$$

Da $\pm\sqrt[4]{5}, \pm\sqrt[4]{5}i \in \mathbb{Q}(\sqrt[4]{5}, i)$, zerfällt f_q über $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{5}, i)$.

Zu zeigen: $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{5}, i) : \mathbb{Q}(\sqrt[4]{5})] = 2$.

Da $f_{i, \mathbb{Q}(\sqrt[4]{5})} = t^2 + 1$, ist $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{5}, i) : \mathbb{Q}(\sqrt[4]{5})] = \deg(f_{i, \mathbb{Q}(\sqrt[4]{5})}) = 2$.

Warum ist $f_{i, \mathbb{Q}(\sqrt[4]{5})} = t^2 + 1$?

Zu zeigen: $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{5}) : \mathbb{Q}] = 4$.

Das Minimalpolynom zu einem α wird üblicherweise folgendermaßen bestimmt: Man nimmt sich ein Polynom, welches α als Nullstelle hat, dann überprüft man es auf Irreduzibilität. Ist es Irreduzibel, so normiert man es und erhält damit das Minimalpolynom. Ist es nicht Irreduzibel, so zerlegt man es in seine Faktoren und überprüft, welcher davon α als Nullstelle hat. Dann wiederholt man den Vorgang mit diesem neuen Polynom, bis man das Minimalpolynom erhält.

Angenommen, $\deg(f_{\sqrt[4]{5}, \mathbb{Q}}) = 1$.

Es gilt:

$$\begin{aligned} f_{\sqrt[4]{5}, \mathbb{Q}}(\sqrt[4]{5}) &= \sqrt[4]{5} + a_0 \stackrel{!}{=} 0 \\ \implies a_0 &= -\sqrt[4]{5} \notin \mathbb{Q} \\ \implies \deg(f_{\sqrt[4]{5}, \mathbb{Q}}) &\neq 1. \end{aligned}$$

Angenommen, $\deg(f_{\sqrt[4]{5}, \mathbb{Q}}) = 2$.

Es gilt:

$$\begin{aligned} f_{\sqrt[4]{5}, \mathbb{Q}}(\sqrt[4]{5}) &= \sqrt[4]{5}^2 + a_1\sqrt[4]{5} + a_0 \stackrel{!}{=} 0 \\ \implies a_0 &= -\sqrt{5} - a_1\sqrt[4]{5} \notin \mathbb{Q} \quad \forall a_1 \in \mathbb{Q} \\ \implies \deg(f_{\sqrt[4]{5}, \mathbb{Q}}) &\neq 2. \end{aligned}$$

Warum ist $-\sqrt{5} - a_1\sqrt[4]{5} \notin \mathbb{Q}$? Genau begründen. -0,5 P.

Angenommen, $\deg(f_{\sqrt[4]{5}, \mathbb{Q}}) = 3$.

Es gilt:

$$\begin{aligned}
 f_{\sqrt[4]{5}, \mathbb{Q}}(\sqrt[4]{5}) &= \sqrt[4]{5}^3 + a_2 \sqrt[4]{5}^2 + a_1 \sqrt[4]{5} + a_0 \\
 &= \sqrt{5} \sqrt[4]{5} + a_2 \sqrt{5} + a_1 \sqrt[4]{5} + a_0 \stackrel{!}{=} 0 \\
 \implies a_0 &= -\sqrt{5} \sqrt[4]{5} - a_2 \sqrt{5} - a_1 \sqrt[4]{5} \notin \mathbb{Q} \quad \forall a_1, a_2 \in \mathbb{Q} \\
 \implies \deg(f_{\sqrt[4]{5}, \mathbb{Q}}) &\neq 3.
 \end{aligned}$$

Warum gilt $-\sqrt{5} \sqrt[4]{5} - a_2 \sqrt{5} - a_1 \sqrt[4]{5} \notin \mathbb{Q}$? Woran kann man das erkennen?

Angenommen, $\deg(f_{\sqrt[4]{5}, \mathbb{Q}}) = 4$.

Es gilt:

$$\begin{aligned}
 f_{\sqrt[4]{5}, \mathbb{Q}}(\sqrt[4]{5}) &= \sqrt[4]{5}^4 + a_3 \sqrt[4]{5}^3 + a_2 \sqrt[4]{5}^2 + a_1 \sqrt[4]{5} + a_0 \\
 &= 5 + a_3 \sqrt{5} \sqrt[4]{5} + a_2 \sqrt{5} + a_1 \sqrt[4]{5} + a_0 \stackrel{!}{=} 0 \\
 \implies a_0 &= -5 - a_3 \sqrt{5} \sqrt[4]{5} - a_2 \sqrt{5} - a_1 \sqrt[4]{5} \in \mathbb{Q} \text{ für } a_1 = a_2 = a_3 = 0 \\
 \implies f_{\sqrt[4]{5}, \mathbb{Q}} &= t^4 - 5 \\
 \implies [\mathbb{Q}(\sqrt[4]{5}) : \mathbb{Q}] &= \deg(f_{\sqrt[4]{5}, \mathbb{Q}}) = 4.
 \end{aligned}$$

Hier wurde unter der Annahme, dass das Minimalpolynom den Grad 4 hat, geschlussfolgert, dass der Körpererweiterungsgrad 4 ist. Es wurde nicht gezeigt, dass der Grad des Minimalpolynomes 4 ist. -0,5 P.

Insgesamt ergibt sich:

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{5}, i) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt[4]{5}, i) : \mathbb{Q}(\sqrt[4]{5})] \cdot [\mathbb{Q}(\sqrt[4]{5}) : \mathbb{Q}] = 2 \cdot 4 = 8.$$

□

(ii) Sei $f_2 = t^4 + 1$.

Es gilt:

$$\begin{aligned}
 f_2 &= t^4 + 1 \\
 &= (t^2 + i)(t^2 - i) \\
 &= (t + i\sqrt{i})(t - i\sqrt{i})(t + \sqrt{i})(t - \sqrt{i}).
 \end{aligned}$$

Wurzeln sind eigentlich nur für nicht negative reelle Zahlen definiert.

Da $\sqrt{i}, i\sqrt{i} \notin \mathbb{Q}$, zerfällt f_2 nicht über \mathbb{Q} , jedoch über $\mathbb{Q}(i, \sqrt{i})$, denn $\sqrt{i}, i\sqrt{i}$ sind die Nullstellen von f_2 in $\mathbb{Q}(i, \sqrt{i})$.

Zu zeigen: $[\mathbb{Q}(i) : \mathbb{Q}] = 2$.

Es gilt:

$$\begin{aligned}
 f_{i, \mathbb{Q}} &= t^2 + 1. \\
 \implies [\mathbb{Q}(i) : \mathbb{Q}] &= \deg(f_{i, \mathbb{Q}}) = 2.
 \end{aligned}$$

Zu zeigen: $[\mathbb{Q}(i, \sqrt{i}) : \mathbb{Q}(i)] = 2$.

Angenommen, $\deg(f_{\sqrt{i}, \mathbb{Q}(i)}) = 1$.

Es gilt:

$$\begin{aligned} f_{\sqrt{i}, \mathbb{Q}(i)}(\sqrt{i}) &= \sqrt{i} + a_0 \stackrel{!}{=} 0 \\ \implies a_0 &= -\sqrt{i} \notin \mathbb{Q}(i) \\ \implies \deg(f_{\sqrt{i}, \mathbb{Q}(i)}) &\neq 1. \end{aligned}$$

Angenommen, $\deg(f_{\sqrt{i}, \mathbb{Q}(i)}) = 2$.

Es gilt:

$$\begin{aligned} f_{\sqrt{i}, \mathbb{Q}(i)}(\sqrt{i}) &= \sqrt{i}^2 + a_1 \sqrt{i} + a_0 \\ &= i + a_1 \sqrt{i} + a_0 \stackrel{!}{=} 0 \\ \implies a_0 &= -i - a_1 \sqrt{i} \\ \implies (a_0 \in \mathbb{Q}(i) \iff a_1 = 0) \\ \implies f_{\sqrt{i}, \mathbb{Q}(i)} &= t^2 - i \\ \implies [\mathbb{Q}(i, \sqrt{i}) : \mathbb{Q}(i)] &= \deg(f_{\sqrt{i}, \mathbb{Q}(i)}) = 2. \end{aligned}$$

S.o. -0,5 P

Insgesamt ergibt sich:

$$[\mathbb{Q}(i, \sqrt{i}) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(i, \sqrt{i}) : \mathbb{Q}(i)] \cdot [\mathbb{Q}(i) : \mathbb{Q}] = 2 \cdot 2 = 4.$$

□

Punkte Teil b): 2,5/4

- (c) (i) Sei $K := \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(i) =: L$ Körpererweiterung, $f = t^2 + 1 \in K[t]$, $n := \deg(f) = 2$.

Es gilt:

$$\begin{aligned} f &= t^2 + 1 \\ &= t^2 - i^2 \\ &= (t + i)(t - i). \end{aligned}$$

Außerdem gilt:

$$t + i, t - i \in L[t] \implies f \text{ zerfällt über } L, \text{ aber nicht über } K, \text{ da } i \notin K.$$

Zu zeigen: $[L : K] = 2$.

Da $i \notin \mathbb{Q}$ ist, muss der Grad des Minimalpolynoms von i größer als 1 sein. Da $i^2 + 1 = 0$, ist f das Minimalpolynom von i über \mathbb{Q} .

f ist auch noch irreduzibel und normiert.

Es gilt:

$$[L : K] = \deg(f) = 2.$$

□

- (ii) Sei $K = \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C} = \mathbb{R}(i) = L$ eine Körpererweiterung, $f = t^2 + 1 \in \mathbb{R}[t]$ Polynom.

Es gilt:

$$f = t^2 + 1 = (t + i)(t - i)$$

Außerdem gilt:

$$\begin{aligned} & i \text{ algebraisch über } \mathbb{R} \\ \implies [\mathbb{C} : \mathbb{Q}] &= [\mathbb{Q}(i) : \mathbb{Q}] = \deg(f) = 2 = 2!. \end{aligned}$$

□

- (iii) Seien $K = \mathbb{Q}, L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$ Körper, $f := t^3 \in \mathbb{Q}[t]$ mit $n := \deg(f) = 3$.

Es gilt:

$$[L : K] = [\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] \cdot [\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2 \cdot 2 = 4$$

Warum ist $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = [\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$? Genau begründen.
-0,5 P

Außerdem gilt:

$$n = 3 < 4 = [L : K] = 4 < 6 = 3! = n!$$

Da f über \mathbb{Q} zerfällt, zerfällt f auch über $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$.

□

Punkte Teil c): 2,5/3

6,5/10 P

Aufgabe 9.2

- (a) Sei $f := t^4 + t^3 + 2t^2 + 1 \in \mathbb{Z}_3[t]$.

Zu zeigen: $f = (t + 1) \cdot (t^3 + 2t + 1)$ ist eine Zerlegung von f in irreduzible Polynome über \mathbb{Z}_3 .

Es gilt:

$$\begin{aligned} f &= t^4 + t^3 + 2t^2 + 1 \\ &= t^4 + t^3 + 2t^2 + 2t + t + 1 \\ &= (t + 1)(t^3 + 2t + 1). \end{aligned}$$

Zu zeigen: $t + 1$ irreduzibel über \mathbb{Z}_3 .

Es gilt:

$$\mathbb{Z}_3 \text{ Körper und } \deg(t + 1) = 1 \xrightarrow{5.1.2} t + 1 \text{ irreduzibel über } \mathbb{Z}_3.$$

Zu zeigen: $h := t^3 + 2t + 1$ irreduzibel über \mathbb{Z}_3 .

Angenommen, h sei reduzibel über \mathbb{Z}_3 . Da \mathbb{Z}_3 Körper ist und $\deg(h) = 3$ hat h nach Beobachtung 5.1.6 eine Nullstelle in \mathbb{Z}_3 . Es gilt:

$$h(0) = 0^3 + 2 \cdot 0 + 1 = 1 \neq 0,$$

$$h(1) = 1^3 + 2 \cdot 1 + 1 = 1 \neq 0,$$

$$h(2) = 2^3 + 2 \cdot 2 + 1 = 1 \neq 0.$$

Dies steht im Widerspruch zu Beobachtung 5.1.6, weshalb h nicht reduzibel über \mathbb{Z}_3 sein kann.

Insgesamt ergibt sich, dass $f = (t + 1) \cdot (t^3 + 2t + 1)$ eine Zerlegung von f in irreduzible Polynome über \mathbb{Z}_3 ist.

□

Punkte Teil a): 2/2

(b) Fehlt.

Punkte Teil b): 0/3

(c) Fehlt.

Punkte Teil c): 0/3

2/8 P

Aufgabe 9.3

Sei $R := \mathbb{Z}_6$ und $M := R \times R$.

Zu zeigen: $X := ((2, 4))$ linear unabhängig.

Es gilt:

$$0 \neq 3 \in R$$

$$\implies 3 \cdot (2, 4) = (3 \cdot 2, 3 \cdot 4) = (0, 0)$$

$$\implies ((2, 4)) \text{ ist eine linear abhängige Familie.}$$

□

2/2 P

Anhang

(A1) Sei $n \in \mathbb{N}_0$, $p \in \mathbb{N}$. Dann ist

$$\sum_{i=0}^{p-1} \binom{n+i}{n} = \binom{n+p}{n+1}.$$

Beweis:

(IA) Sei $p = 1$. Es gilt:

$$\sum_{i=0}^{1-1} \binom{n+i}{n} = \binom{n}{n} = \binom{n+1}{n+1} = \binom{n+p}{n+1}.$$

(IV) Gelte die Behauptung für ein beliebiges, aber festes $p \in \mathbb{N}$.

(IS) $p \rightsquigarrow p+1$.
Es gilt:

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{(p+1)-1} \binom{n+i}{n} &= \sum_{i=0}^{p-1} \binom{n+i}{n} + \binom{n+p}{n} \\ &= \binom{n+p}{n+1} + \binom{n+p}{n} = \binom{n+(p+1)}{n+1}. \end{aligned}$$

□

(A2) Sei p Primzahl. Sei $n \in \{1, 2, \dots, p-1\}$. Dann gilt:

$$p \mid \binom{p}{n}.$$

Beweis:

Sei p Primzahl, $n \in \{1, 2, \dots, p-1\}$. Es gilt:

$$\begin{aligned} \binom{p}{n} \cdot n! &= \frac{p!}{n! \cdot (p-n)!} \cdot n! \\ &= \frac{p!}{(p-n)!} \\ &= p(p-1)(p-2) \cdots (p-n+2)(p-n+1) \\ \implies p &\mid \frac{p!}{(p-n)!} \\ \implies p &\mid \binom{p}{n} \cdot n! \\ \stackrel{p \text{ Primzahl}}{\implies} \stackrel{p > n > 0}{p} &\mid \binom{p}{n}. \end{aligned}$$



Insgesamt 10,5/20 Punkten.

korrigiert von Tom Engels am 02.07.2020