

KAPITEL 1

Fördjupning: Biologi som vetenskap

Den största utmaningen för en forskare är inte att hitta svar. Det är att inte lura sig själv. Vi ser gärna det vi vill se, och slumpen kan få nästan vad som helst att se ut som ett samband. I den här fördjupningen lär du dig hur forskare planerar rättvisa undersökningar, hur man värderar hur säkert ett resultat är, var vetenskapens gränser går, varför nya idéer ibland möts av motstånd och hur du väger källor som säger emot varandra. Namn, klasser, produkter och mätvärden i kapitlet är påhittade exempel, om inget annat står. Forskarna och undersökningarna Pasteur, Semmelweis, Marshall och Warren samt Carlson är verkliga.

SÅ NÅR DU HÖGSTA NIVÅN

- Resonera i flera led: visa hur en sak leder till nästa, med ”eftersom … därför … vilket leder till …”.
- Använd begreppen korrekt och förklara dem i sammanhanget.
- Väg för- och nackdelar, och se frågan från flera perspektiv.
- Var nyanserad: visa vad som är osäkert och vad man mer skulle behöva veta.
- Ta ställning och motivera med naturvetenskapliga argument.

F1.1.1	Planera ett eget försök	2
F1.1.2	Tolka data och redovisa osäkerhet	4
F1.1.3	Hur säker är slutsatsen?	5
F1.2.1	Vetenskapens gränser	6
F1.2.2	Varför möts nya idéer av motstånd?	7
F1.2.3	Väga källor och granska påståenden	8
	Resonera och ta ställning	9–10

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Läs först grundtexten i kapitel 1. Fördjupningen bygger på begreppen hypotes, variabel, kontrollgrupp, felkälla, belägg, trovärdig och relevant.

F1.1.1 Planera ett eget försök

1+

Föreställ dig att ett företag påstår att deras nya tablett gör att förkylningar går över snabbare. Hur skulle man testa det? Det låter enkelt: ge tabletten till några förkylda personer och se om de blir friska. Men de flesta förkylningar går över av sig själva inom en vecka. Hur vet man då att det var tabletten som hjälpte? En bra plan svarar på det i förväg.




Bild F1.1 En randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie: en av de mest pålitliga sorternas medicinska försök.

Så motiverar du valen i din plan

Variabler. Välj en oberoende variabel och motivera varför just den. Välj en beroende variabel som verkligen mäter det du vill veta (giltighet). Lista vad som måste hållas lika.

Kontrollgrupp och placebo. Kontrollgruppen får inte behandlingen. Får den en likadan tablett utan verksamt ämne, kan förväntningar inte förklara skillnaden.

Randomisering. Slumpen bestämmer vem som hamnar i vilken grupp. Annars kan forskaren omedvetet lägga de friskaste i den ena gruppen.

Blindning. Om varken deltagare eller forskare vet vem som fått vad är studien dubbelblind. Då blir det svårare att påverka resultatet, även omedvetet.

Antal upprepningar. Med fem personer i varje grupp kan slumpen avgöra resultatet. Med hundratals blir slumpens betydelse liten. I ett skolförsök kan du inte ha hundratals, så du måste vara öppen med vad det betyder för hur säker slutsatsen blir.

Begrepp

Randomisering
Slumpmässig fördelning till grupper.

Dubbelblind
Varken deltagare eller forskare vet vem som fått vad.

Stickprov
De individer man undersöker, som ska representera en större grupp.

Resonera om störningar

Du ska testa om du minns fler ord med musik. Vad kan störa? Hur kan du planera så att varje störning minskar?

Del av planen	Fråga att svara på	Motivera
Frågeställning	Går den att besvara med mätning?	Skriv vad som ska mätas.
Variabler	Vad ändras, mäts och hålls lika?	Varför just dessa?
Mätmetod	Hur mäter jag, med vilken noggrannhet?	Varför är metoden giltig?
Upprepning	Hur många försök och deltagare?	Hur påverkar antalet slumpen?
Störningar	Vad kan göra resultatet fel?	Hur förebygger jag det?

F1.1.2 Tolka data och redovisa osäkerhet

1+

Ett diagram visar inte bara svaret. Det visar också hur osäkert svaret är. **Påhittat exempel**
En grupp undersökte hur temperaturen påverkar gasbildningen hos jäst. De gjorde tre försök vid varje temperatur och mätte hur mycket en ballong växte.

Temperatur	Försök 1	Försök 2	Försök 3	Medelvärde
10 °C	13 cm	12 cm	14 cm	13 cm
25 °C	22 cm	24 cm	23 cm	23 cm
40 °C	31 cm	18 cm	30 cm	?

Det avvikande värdet

Vid 40 °C avviker ett värde mycket från de andra (18 cm). Om man räknar med det blir medelvärdet 26 cm. Utan det blir det 30,5 cm. Vad ska man göra? Man ska inte stryka ett värde bara för att det passar illa. Man frågar först: Finns det en rimlig förklaring, till exempel att ballongen satt löst? Om ja, redovisa värdet, förklara varför det kan vara fel och visa resultatet med och utan det. Om nej, gör fler försök.

Begrepp

Avvikande värde
Ett värde som ligger långt från de andra.

Spridning
Hur mycket mätvärdena skiljer sig åt.

Osäkerhet
Hur säkert ett resultat är.

Osäkerhet

Ju mer mätvärdena skiljer sig inom en grupp, desto osäkrare är medelvärdet. Man kan redovisa osäkerheten genom att visa lägsta och högsta värde. Skillnaden mellan 10 och 25 °C är stor jämfört med spridningen. Skillnaden mellan 25 och 40 °C är mindre tydlig, eftersom ett av värdena avviker.

Digitala verktyg

I ett kalkylblad kan du räkna medelvärde med och utan ett värde, och rita diagram med både medelvärden och enskilda mätpunkter.

Fundera

Vilken slutsats kan du dra om temperaturens påverkan, och vilken kan du inte dra? Vad skulle du göra för att bli säkrare?

F1.1.3 Hur säker är slutsatsen?

1+

Många nyheter bygger på undersökningar där forskare har jämfört grupper av människor, till exempel ”personer som äter mycket fisk lever längre”. Sådana **observationsstudier** är viktiga, men grupperna kan skilja sig åt på många andra sätt än det man undersöker.

Störfaktorer

En **störfaktor** är något som påverkar både det man tror är orsaken och det man mäter. Kanske äter personer som äter mycket fisk också mer grönsaker, röker mindre och har högre inkomst. Då kan det vara de sakerna, och inte fisken, som gör att de lever längre.




Bild F1.2 En störfaktor kan skapa ett samband mellan två saker som inte påverkar varandra.

Forskare försöker räkna bort kända störfaktorer, men det kan alltid finnas sådana som ingen har tänkt på. Därför är kontrollerade experiment med slumpad fördelning det säkraste sättet att visa orsak.

Slumpen lurar

Om du singlar slant tio gånger är det inte konstigt att få sju krona. Det betyder inte att myntet är fusk. Samma sak gäller i biologiska undersökningar: små skillnader mellan små grupper kan bero på ren slump. Ju större stickprov och ju större skillnad, desto säkrare kan man vara på att skillnaden är verklig.

När du värderar ett försök, resonera om vilka felkällor som är störst, hur mycket de kan ha påverkat slutsatsen och hur du skulle förbättra försöket. Sluta med att säga hur säker slutsatsen är: ”Resultatet tyder på …, men eftersom … kan vi inte vara säkra på …”.

Begrepp

Observationsstudie
Man jämför grupper utan att själv ändra något.

Störfaktor
En faktor som påverkar både den misstänkta orsaken och resultatet.

Tänk efter

”Barn som har många böcker hemma får bättre betyg.” Ge två möjliga störfaktorer.

F1.2.1 Vetenskapens gränser

1+

Naturvetenskapen är kraftfull, men den svarar bara på vissa sorters frågor: frågor som går att pröva med belägg. Frågan ”Hur påverkar en gödning tomatplantors skörd?” är en sådan. ”Är det rätt att äta kött?” är en annan sorts fråga. Biologin kan ge fakta om hur djur påverkas och hur klimatet påverkas, men vad som är rätt beror också på värderingar. Därför behövs både fakta och etiska argument.

Ett påstående måste kunna visas vara fel

Ett vetenskapligt påstående måste kunna visa sig vara fel. Om alla tänkbara resultat passar med påståendet kan man aldrig pröva det. ”Hälsokosten hjälper om du tror på den, och om den inte hjälper tror du inte tillräckligt” går aldrig att motbevisa. Då har påståendet lämnat vetenskapen.

Resonera

Vilka frågor om samma sak, till exempel jakt på varg, kan naturvetenskapen svara på, och vilka kan den inte avgöra?

Det betyder inte att alla icke-vetenskapliga svar är värdelösa. Konst, etik, religion och filosofi svarar på andra frågor än naturvetenskapen. Problemet uppstår när något gör anspråk på att vara vetenskap utan att kunna prövas.

Påstående	Går det att pröva?	Hur skulle du pröva det?
Vi sover bättre i ett kallt rum.	Ja	Mät sömnlängd eller antal uppvaknanden vid olika temperaturer.
Naturen mår bäst när människan inte rör den.	Delvis	Måste först definiera ”mår bäst” (t.ex. antal arter) och därefter mäta. Värderingen ligger i orden.
Stjärntecknet styr din personlighet.	Ja, och prövat	Dubbelblint test (Carlson, Nature 1985): astrologerna klarade inte mer än slumpen.

F1.2.2 Varför möts nya idéer av motstånd?

1+

I grundtexten mötte du Pasteur, Semmelweis samt Marshall och Warren. Nu ska vi jämföra dem och fråga varför det ibland tar så lång tid att ändra en förklaring.

	Pasteur (1861)	**Semmelweis (1847)**	**Marshall och Warren (1982)**
Gammal förklaring	Små organismer kan uppstå av sig själva.	Barnsängsfeber har många orsaker, ingen tänker på händerna.	Magsår beror på stress och livsstil. Bakterier kan inte leva i magsyran.
Belägg	Buljong i svanhalskolv förblev klar, i rak kolv blev den grumlig.	Dödligheten på läkarkliniken föll från 11,4 % till 1,3 % efter handtvätt.	Bakterie i magsäcken. Marshalls självförsök 1984. Antibiotika botar.
Motstånd	Fick mothugg men kontrollerade försök övertygade.	Hånades. Saknade förklaring till hur. Fick inte förlängt kontrakt.	Marshall möttes av stark skepsis.
Vad övertygade?	Ett enkelt och upprepbart försök.	Bakterieläran växte fram årtionden senare.	Upprepade studier och en behandling som fungerade. Nobelpriset 2005.

Mönstret

I alla tre fall passade resultatet inte den förklaring som alla trodde på. Det är inte konstigt att forskare håller fast vid en modell som fungerat länge. En modell är en förenkling som har varit användbar, och en enstaka avvikelse kan bero på ett fel. Motståndet kan därför vara rimligt i början. Men när belägg samlas, från olika forskare och olika metoder, ändras bilden.

Det betyder inte att alla nya idéer har rätt. Marshall och Warren fick rätt för att de hade belägg som kunde granskas och upprepas, inte för att de var envisa.

Lärdom

En bra modell förklarar vad man ser, förutsäger nya saker och kan prövas. Den behöver inte vara hela sanningen för att vara användbar.

Etik

Marshalls självförsök var riskabelt. Forskning på människor måste granskas av en etikprövningsmyndighet.

Modeller har begränsningar

Ett exempel: bakterien **Helicobacter pylori** orsakar magsår, men långt ifrån alla som är smittade får magsår. Modellen ”bakterie orsakar magsår” är användbar, men inte hela förklaringen. Fler faktorer spelar in.

F1.2.3 Väga källor och granska påståenden

1+

Ibland säger trovärdiga källor emot varandra. Då räcker det inte att fråga om en källa är trovärdig. Man måste väga dem mot varandra: Vilken bygger på flest och bäst undersökningar? Vem har gjort studien, och vem har betalat för den? Finns det en oberoende upprepning?

Oberoende
Har källan undersökt själv eller bara hört av andra? Går uppgifterna att följa tillbaka?

Tendens
Vem tjänar på budskapet? Vem betalade för undersökningen?

Samsyn
Säger andra, oberoende källor samma sak? Vad säger sammanställningar?

Aktualitet
Är det nytt nog? Har nyare studier ändrat bilden?

Läs diagram och statistik med kritiskt öga

Korrelation är inte orsak. När glassförsäljningen ökar, ökar också antalet drunkningsolyckor. Båda beror på en tredje sak: värmen.

Avkortad axel. Om y-axeln börjar på 90 i stället för 0 ser en liten skillnad enorm ut.

Relativ ökning. ”Risken dubblas!” kan betyda att den går från 1 på 100 000 till 2 på 100 000. Fråga alltid efter hur stor risken var från början.

Sponsring och tendens. En studie betald av ett företag är inte automatiskt fel, men man bör se om den är oberoende granskad och om andra har fått samma resultat.




Bild F1.3 Två kurvor som följer varandra utan att den ena orsakar den andra.

Bemöt motargument

Ett starkt argument tar motargumentet på allvar. Skriv påstående, belägg, det starkaste motargumentet och ett svar som visar varför beläggen ändå väger tyngre, eller var du kan hålla med. Avsluta med en slutsats som säger hur säker du är.

Tänk efter
En tidning skriver: ”Studie: Kaffe förlänger livet!” Vilka tre frågor ställer du innan du tror på det?

Resonera och ta ställning

Uppgifterna liknar de svåraste uppgifterna på nationella prov. Personer, rubriker och mätvärden är påhittade. Svara utförligt och resonera i flera led. ● grundläggande ●● utvecklat ●●● välutvecklat

1+

1 Ett företag påstår att deras sportdryck ger bättre kondition. Planera en undersökning som kan pröva påståendet. Beskriv hur du använder kontrollgrupp, placebo, randomisering och blindning, och förklara varför varje del behövs. ●●●

2 Semmelweis jämförde två avdelningar. Förklara varför jämförelsen gjorde hans slutsats starkare, och ge ett skäl till att hans slutsats ändå inte var helt säker innan handtvätten infördes. ●●●

3 En tidning skriver: ”Ny studie: Kaffe gör att du lever längre! Forskare har följt 500 000 personer och de som drack 2–3 koppar om dagen dog i lägre grad.” Värdera rubriken med begreppen observationsstudie, störfaktor och orsakssamband. Vad skulle krävas för att man säkert kan säga att kaffet är orsaken? ●●●

Resonera och ta ställning, forts.

4 Två klasser testar om gödning gör att bönplantor växer högre. Klass A har 3 plantor per grupp och får skillnaden 4 mm. Klass B har 30 plantor per grupp och får skillnaden 2 mm. Vilket resultat litar du mest på? Motivera och diskutera slumpens betydelse. ●●

5 Tabellen om jäst (F1.1.2) har ett avvikande värde vid 40 °C. Förklara hur du hanterar det och hur du redovisar resultatet så att läsaren kan avgöra hur säker slutsatsen är. ●●●

6 Jämför två av exemplen Pasteur, Semmelweis och Marshall och Warren. Vad är gemensamt, och vad skiljer dem åt? Resonera om varför nya idéer ibland möts av motstånd, och om motståndet alltid är oberättigat. ●●●

7 Två trovärdiga källor säger olika om ett kosttillskott: en myndighet avråder, en studie betald av tillverkaren visar effekt. Resonera om hur du väger källorna och vilken ytterligare information du skulle vilja ha. Formulera ett argument och bemöt ett motargument. ●●●

Till läraren: facit och bedömningsstöd

Fördjupningen riktar sig till elever som är klara tidigt eller som behöver mer utmaning mot de högre kriterierna. Den fördjupar systematiska undersökningar (planering, värdering, osäkerhet), vetenskapens gränser, förklaringsmodellers föränderlighet och kritisk granskning med argumentation.

Svarsexempel

1. Slumpa deltagare till två grupper (randomisering) så att grupperna blir lika från början. Grupp A får sportdrycken, grupp B en likadan dryck utan det verksamma ämnet (placebo). Varken deltagare eller testledare vet vem som fått vad (dubbelblind). Mät konditionen före och efter med samma test. Många deltagare och lika träning i grupperna. Ett välutvecklat svar förklarar för varje moment vilket fel det förhindrar.

2. Avdelningarna var troligen lika i det mesta utom en sak (obduktioner före förlossningar), vilket gör att skillnaden i dödlighet troligen beror på den faktorn; avdelningen fungerar som kontrollgrupp. Osäkert eftersom andra skillnader kunde finnas, t.ex. vilka kvinnor som kom till vilken avdelning, och eftersom man inte visste hur sjukdomen spreds.

3. Observationsstudie: forskarna har inte slumpat vem som dricker kaffe. Störfaktorer kan förklara sambandet (livsstil, inkomst, att sjuka slutat dricka kaffe). Studien visar korrelation, inte orsak. Många deltagare minskar slumpen men tar inte bort störfaktorer. Säker slutsats kräver randomiserade försök eller många olika studier som pekar åt samma håll samt en rimlig förklaring.

4. Klass B. Med 3 plantor kan en enda ovanlig planta ge en stor skillnad av slump. Med 30 plantor jämnar slumpen ut sig. Välutvecklat svar: båda skillnaderna är små; titta på spridningen inom grupperna och gör om försöket.

5. Undersök först om det finns en rimlig förklaring (t.ex. att ballongen satt löst). Redovisa värdet, förklara det, och visa medelvärde med och utan värdet (26 cm respektive 30,5 cm). Redovisa spridning (lägsta och högsta). Gör fler försök. Skriv hur osäker slutsatsen är.

6. Gemensamt: belägg som inte passade den gamla förklaringen; motstånd i början; modellen ändrades när belägg samlades. Skillnader: Pasteur övertygade med ett enkelt, upprepbart försök; Semmelweis saknade förklaring till hur handtvätt hjälpte; Marshall och Warren mötte en etablerad bild (syra dödar bakterier). Motstånd kan vara rimligt när en modell fungerat länge, men det kan också bero på stolthet och brist på förklaring. Välutvecklat svar nyanserar.

7. Väg: Vad bygger respektive källa på? Är studien oberoende granskad och upprepad? Tendens hos tillverkaren. Önskad info: fler oberoende studier, sammanställningar, storlek och design. Argument i formen påstående, belägg, motargument, bemötande, slutsats med angiven säkerhet.

Till läraren: bedömning och svar på rutorna

Bedömningsstöd för resonemangsuppgifter

	Grundläggande	Utvecklat	Välutvecklat
Resonemang	Enkla påståenden, ett led. Orsak eller verkan nämns.	Orsak och verkan kopplas ihop i två led.	Flera led i en sammanhängande kedja. Visar hur stegen hänger ihop.
Begrepp	Några begrepp används, ibland oprecist.	Relevanta begrepp används korrekt.	Begreppen används korrekt och förklaras i sammanhanget.
Värdering	Ger ett argument eller en åsikt.	Ger argument för och emot.	Väger argument mot varandra, visar osäkerheter och tar motiverat ställning.
Undersökningar	Föreslår en enkel undersökning.	Planerar med variabler och upprepningar.	Värderar metoden, felkällor och hur säker slutsatsen kan bli.

Svar på rutorna i texten

Resonera om störningar (F1.1.1): T.ex. olika svåra ordlistor, ordningen på försöken, trötthet. Byt ordning, använd likvärdiga listor, flera deltagare.

Fundera (F1.1.2): Temperaturen verkar öka gasbildningen mellan 10 och 25 °C. Vid 40 °C är resultatet osäkert på grund av det avvikande värdet. Gör fler försök.

Tänk efter (F1.1.3): T.ex. föräldrarnas utbildning, inkomst, tid som föräldrar läser med barnen.

Resonera (F1.2.1): Naturvetenskap: hur varg påverkar bytesdjur, och hur djur påverkas. Inte: om det är rätt, vilket också beror på värderingar.

Tänk efter (F1.2.3): Vem betalade? Hur många deltog och hur var det upplagt? Har andra fått samma resultat?

Faktakontroll och källor

Siffrorna om Semmelweis (11,4 % 1846, 1,3 % 1848): MJA 2018. Marshall och Warren: Nobelstiftelsen 2005 och PMC2661189; att långt ifrån alla smittade får magsår är allmänt känt; ingen siffra anges. Kontrollera gärna mot en medicinsk källa. Carlson, Nature 1985. Jästdata och exempel är påhittade för undervisning (medelvärden: 30,5 cm utan och 26 cm med det avvikande värdet). · Illustrationer: egenritade.