LÄRARVERSION · [n] = källhänvisning, se källförteckningen sist



KAPITEL 1

Fördjupning: Biologi som vetenskap

Den största utmaningen för en forskare är inte att hitta svar. Det är att inte lura sig själv. Vi ser gärna det vi vill se, och slumpen kan få nästan vad som helst att se ut som ett samband. I den här fördjupningen lär du dig hur forskare planerar rättvisa undersökningar, hur man värderar hur säkert ett resultat är, var vetenskapens gränser går, varför nya idéer ibland möts av motstånd och hur du väger källor som säger emot varandra. Namn, klasser, produkter och mätvärden i kapitlet är påhittade exempel, om inget annat står. Forskarna och undersökningarna Pasteur, Semmelweis, Marshall och Warren samt Carlson är verkliga.

SÅ NÅR DU HÖGSTA NIVÅN

- Resonera i flera led: visa hur en sak leder till nästa, med ”eftersom … därför … vilket leder till …”.
- Använd begreppen korrekt och förklara dem i sammanhanget.
- Väg för- och nackdelar, och se frågan från flera perspektiv.
- Var nyanserad: visa vad som är osäkert och vad man mer skulle behöva veta.
- Ta ställning och motivera med naturvetenskapliga argument.

Planera ett eget försök 2
Tolka data och redovisa osäkerhet 4
Hur säker är slutsatsen? 5
Vetenskapens gränser 6
Varför möts nya idéer av motstånd? 7
Väga källor och granska påståenden 8
Resonera och ta ställning 9–11


FUNDERA INNAN DU LÄSER

Läs först grundtexten i kapitel 1. Fördjupningen bygger på begreppen hypotes, variabel, kontrollgrupp, felkälla, belägg, trovärdig och relevant.

Planera ett eget försök

1.1+

Föreställ dig att ett företag påstår att deras nya tablett gör att förkylningar går över snabbare. Hur skulle man testa det? Det låter enkelt: ge tabletten till några förkylda personer och se om de blir friska. Men de flesta förkylningar går över av sig själva inom en vecka. Hur vet man då att det var tabletten som hjälpte? En bra plan svarar på det i förväg.



En randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie[1]: en av de mest pålitliga sorternas medicinska försök.

Så motiverar du valen i din plan

Variabler. Välj en oberoende variabel och motivera varför just den. Välj en beroende variabel som verkligen mäter det du vill veta (giltighet). Lista vad som måste hållas lika.

Kontrollgrupp och placebo. Kontrollgruppen får inte behandlingen. Får den en likadan tablett utan verksamt ämne, kan förväntningar inte förklara skillnaden.

Randomisering. Slumpen bestämmer vem som hamnar i vilken grupp.[2] Annars kan forskaren omedvetet lägga de friskaste i den ena gruppen.

Blindning. Om varken deltagare eller forskare vet vem som fått vad är studien dubbelblind. Då blir det svårare att påverka resultatet, även omedvetet.

Antal upprepningar. Med fem personer i varje grupp kan slumpen avgöra resultatet. Med hundratals blir slumpens betydelse liten.[3] I ett skolförsök kan du inte ha hundratals, så du måste vara öppen med vad det betyder för hur säker slutsatsen blir.

BEGREPP

Randomisering
Slumpmässig fördelning till grupper.

Dubbelblind
Varken deltagare eller forskare vet vem som fått vad.

Stickprov
De individer man undersöker, som ska representera en större grupp.

RESONERA OM STÖRNINGAR

Du ska testa om du minns fler ord med musik. Vad kan störa? Hur kan du planera så att varje störning minskar?

Del av planen	Fråga att svara på	Motivera
Frågeställning	Går den att besvara med mätning?	Skriv vad som ska mätas.
Variabler	Vad ändras, mäts och hålls lika?	Varför just dessa?

Mätmetod	Hur mäter jag, med vilken noggrannhet?	Varför är metoden giltig?
Upprepning	Hur många försök och deltagare?	Hur påverkar antalet slumpen?
Störningar	Vad kan göra resultatet fel?	Hur förebygger jag det?

Tolka data och redovisa osäkerhet

Ett diagram visar inte bara svaret. Det visar också hur osäkert svaret är. PÅHITTAT EXEMPEL
En grupp undersökte hur temperaturen påverkar gasbildningen hos jäst. De gjorde tre försök vid varje temperatur och mätte hur mycket en ballong växte.

Temperatur	Försök 1	Försök 2	Försök 3	Medelvärde
10 °C	13 cm	12 cm	14 cm	13 cm
25 °C	22 cm	24 cm	23 cm	23 cm
40 °C	31 cm	18 cm	30 cm	?

Det avvikande värdet

Vid 40 °C avviker ett värde mycket från de andra (18 cm). Om man räknar med det blir medelvärdet 26 cm. Utan det blir det 30,5 cm. Vad ska man göra? Man ska inte stryka ett värde bara för att det passar illa. Man frågar först: Finns det en rimlig förklaring, till exempel att ballongen satt löst? Om ja, redovisa värdet, förklara varför det kan vara fel och visa resultatet med och utan det. Om nej, gör fler försök.

Osäkerhet

Ju mer mätvärdena skiljer sig inom en grupp, desto osäkrare är medelvärdet. Man kan redovisa osäkerheten genom att visa lägsta och högsta värde. Skillnaden mellan 10 och 25 °C är stor jämfört med spridningen. Skillnaden mellan 25 och 40 °C är mindre tydlig, eftersom ett av värdena avviker.

BEGREPP

Avvikande värde
Ett värde som ligger långt från de andra.

Spridning
Hur mycket mätvärdena skiljer sig åt.

Osäkerhet
Hur säkert ett resultat är.

DIGITALA VERKTYG

I ett kalkylblad kan du räkna medelvärde med och utan ett värde, och rita diagram med både medelvärden och enskilda mätpunkter.

FUNDERA

Vilken slutsats kan du dra om temperaturens påverkan, och vilken kan du inte dra? Vad skulle du göra för att bli säkrare?


Hur säker är slutsatsen?

Många nyheter bygger på undersökningar där forskare har jämfört grupper av människor, till exempel ”personer som äter mycket fisk lever längre”. Sådana **observationsstudier** är viktiga, men grupperna kan skilja sig åt på många andra sätt än det man undersöker.

Störfaktorer

En **störfaktor** är något som påverkar både det man tror är orsaken och det man mäter. Kanske äter personer som äter mycket fisk också mer grönsaker, röker mindre och har högre inkomst. Då kan det vara de sakerna, och inte fisken, som gör att de lever längre.

Forskare försöker räkna bort kända störfaktorer, men det kan alltid finnas sådana som ingen har tänkt på. Därför är kontrollerade experiment med slumpad fördelning det säkraste sättet att visa orsak.[4]



En störfaktor kan skapa ett samband mellan två saker som inte påverkar varandra.

Slumpen lurar

Om du singlar slant tio gånger är det inte konstigt att få sju krona. Det betyder inte att myntet är fusk. Samma sak gäller i biologiska undersökningar: små skillnader mellan små grupper kan bero på ren slump. Ju större stickprov och ju större skillnad, desto säkrare kan man vara på att skillnaden är verklig.

När du värderar ett försök, resonera om vilka felkällor som är störst, hur mycket de kan ha påverkat slutsatsen och hur du skulle förbättra försöket. Sluta med att säga hur säker slutsatsen är: ”Resultatet tyder på …, men eftersom … kan vi inte vara säkra på …”.

BEGREPP

Observationsstudie
Man jämför grupper utan att själv ändra något.

Störfaktor
En faktor som påverkar både den misstänkta orsaken och resultatet.

TÄNK EFTER

”Barn som har många böcker hemma får bättre betyg.” Ge två möjliga störfaktorer.

Vetenskapens gränser

1.2+

Naturvetenskapen är kraftfull, men den svarar bara på vissa sorters frågor: frågor som går att pröva med belägg. Frågan ”Hur påverkar en gödning tomatplantors skörd?” är en sådan. ”Är det rätt att äta kött?” är en annan sorts fråga. Biologin kan ge fakta om hur djur påverkas och hur klimatet påverkas, men vad som är rätt beror också på värderingar. Därför behövs både fakta och etiska argument.

Ett påstående måste kunna visas vara fel

Ett vetenskapligt påstående måste kunna visa sig vara fel.[5] Om alla tänkbara resultat passar med påståendet kan man aldrig pröva det. ”Hälsokosten hjälper om du tror på den, och om den inte hjälper tror du inte tillräckligt” går aldrig att motbevisa. Då har påståendet lämnat vetenskapen.

RESONERA

Vilka frågor om samma sak, till exempel jakt på varg, kan naturvetenskapen svara på, och vilka kan den inte avgöra?

Det betyder inte att alla icke-vetenskapliga svar är värdelösa. Konst, etik, religion och filosofi svarar på andra frågor än naturvetenskapen. Problemet uppstår när något gör anspråk på att vara vetenskap utan att kunna prövas.

Påstående	Går det att pröva?	Hur skulle du pröva det?
Vi sover bättre i ett kallt rum.	Ja	Mät sömnlängd eller antal uppvaknanden vid olika temperaturer.
Naturen mår bäst när människan inte rör den.	Delvis	Måste först definiera ”mår bäst” (t.ex. antal arter) och därefter mäta. Värderingen ligger i orden.
Stjärntecknet styr din personlighet.	Ja, och prövat	Dubbelblint test (Carlson, Nature 1985): astrologerna klarade inte mer än slumpen[6].

Varför möts nya idéer av motstånd?

I grundtexten mötte du Pasteur, Semmelweis samt Marshall och Warren. Nu ska vi jämföra dem och fråga varför det ibland tar så lång tid att ändra en förklaring.

	Pasteur (1861)	Semmelweis (1847)	Marshall och Warren (1982)
Gammal förklaring	Små organismer kan uppstå av sig själva.	Barnsängsfeber har många orsaker, ingen tänker på händerna.	Magsår beror på stress och livsstil. Bakterier kan inte leva i magsyran.
Belägg	Buljong i svanhalskolv förblev klar, i rak kolv blev den grumlig.	Dödligheten på läkarkliniken föll från 11,4 % till 1,3 % efter handtvätt.[7]	Bakterie i magsäcken. Marshalls självförsök 1984. Antibiotika botar.
Motstånd	Fick mothugg men kontrollerade försök övertygade.	Hånades. Saknade förklaring till hur. Fick inte förlängt kontrakt.	Marshall möttes av stark skepsis.
Vad övertygade?	Ett enkelt och upprepbart försök.	Bakterieläran växte fram årtionden senare.	Upprepade studier och en behandling som fungerade. Nobelpriset 2005.

Mönstret

I alla tre fall passade resultatet inte den förklaring som alla trodde på. Det är inte konstigt att forskare håller fast vid en modell som fungerat länge. En modell är en förenkling som har varit användbar, och en enstaka avvikelse kan bero på ett fel. Motståndet kan därför vara rimligt i början. Men när belägg samlas, från olika forskare och olika metoder, ändras bilden.

Det betyder inte att alla nya idéer har rätt. Marshall och Warren fick rätt för att de hade belägg som kunde granskas och upprepas, inte för att de var envisa.

LÄRDOM

En bra modell förklarar vad man ser, förutsäger nya saker och kan prövas. Den behöver inte vara hela sanningen för att vara användbar.

ETIK

Marshalls självförsök var riskabelt. Forskning på människor måste granskas av en etikprövningsmyndighet.

Modeller har begränsningar

Ett exempel: bakterien *Helicobacter pylori* orsakar magsår, men långt ifrån alla som är smittade får magsår[8]. Modellen ”bakterie orsakar magsår” är användbar, men inte hela förklaringen. Fler faktorer spelar in.

Väga källor och granska påståenden

Ibland säger trovärdiga källor emot varandra. Då räcker det inte att fråga om en källa är trovärdig. Man måste väga dem mot varandra: Vilken bygger på flest och bäst undersökningar? Vem har gjort studien, och vem har betalat för den? Finns det en oberoende upprepning?

Oberoende

Har källan undersökt själv eller bara hört av andra? Går uppgifterna att följa tillbaka?

Tendens

Vem tjänar på budskapet? Vem betalade för undersökningen?

Samsyn


Säger andra, oberoende källor samma sak? Vad säger sammanställningar?

Aktualitet

Är det nytt nog? Har nyare studier ändrat bilden?

Läs diagram och statistik med kritiskt öga

Korrelation är inte orsak.[9] När glassförsäljningen ökar, ökar också antalet drunkningsolyckor. Båda beror på en tredje sak: värmen.



Två kurvor som följer varandra utan att den ena orsakar den andra.

Avkortad axel. Om y-axeln börjar på 90 i stället för 0 ser en liten skillnad enorm ut.

Relativ ökning. ”Risken dubblas!” kan betyda att den går från 1 på 100 000 till 2 på 100 000. Fråga alltid efter hur stor risken var från början.

Sponsring och tendens. En studie betald av ett företag är inte automatiskt fel, men man bör se om den är oberoende granskad och om andra har fått samma resultat.

Bemöt motargument

Ett starkt argument tar motargumentet på allvar. Skriv påstående, belägg, det starkaste motargumentet och ett svar som visar varför beläggen ändå väger tyngre, eller var du kan hålla med. Avsluta med en slutsats som säger hur säker du är.

TÄNK EFTER

En tidning skriver: ”Studie: Kaffe förlänger livet!” Vilka tre frågor ställer du innan du tror på det?

Resonera och ta ställning

1+

Uppgifterna liknar de svåraste uppgifterna på nationella prov. Personer, rubriker och mätvärden är påhittade. Svara utförligt och resonera i flera led. ● grundläggande ●● utvecklat ●●● välutvecklat

1 Ett företag påstår att deras sportdryck ger bättre kondition. Planera en undersökning som kan pröva påståendet. Beskriv hur du använder kontrollgrupp, placebo, randomisering och blindning, och förklara varför varje del behövs. ●●●

2 Semmelweis jämförde två avdelningar. Förklara varför jämförelsen gjorde hans slutsats starkare, och ge ett skäl till att hans slutsats ändå inte var helt säker innan handtvätten infördes. ●●●

3 En tidning skriver: ”Ny studie: Kaffe gör att du lever längre! Forskare har följt 500 000 personer och de som drack 2–3 koppar om dagen hade lägre dödlighet.” Värdera rubriken med begreppen observationsstudie, störfaktor och orsakssamband. Vad skulle krävas för att man säkert kan säga att kaffet är orsaken? ●●●

Resonera och ta ställning, forts.

1+

4 Två klasser testar om gödning gör att bönplantor växer högre. Klass A har 3 plantor per grupp och får skillnaden 4 mm. Klass B har 30 plantor per grupp och får skillnaden 2 mm. Vilket resultat litar du mest på? Motivera och diskutera slumpens betydelse. ●●

5 Tabellen om jäst (momentet om att tolka data och redovisa osäkerhet) har ett avvikande värde vid 40 °C. Förklara hur du hanterar det och hur du redovisar resultatet så att läsaren kan avgöra hur säker slutsatsen är. ●●●

6 Jämför två av exemplen Pasteur, Semmelweis och Marshall och Warren. Vad är gemensamt, och vad skiljer dem åt? Resonera om varför nya idéer ibland möts av motstånd, och om motståndet alltid är oberättigat. ●●●

7 Två trovärdiga källor säger olika om ett kosttillskott: en myndighet avråder, en studie betald av tillverkaren visar effekt. Resonera om hur du väger källorna och vilken ytterligare information du skulle vilja ha. Formulera ett argument och bemöt ett motargument. ●●●

1+

Källförteckning för lärare

Siffrorna [1], [2] … i texten hänvisar hit. Varje post säger vilket påstående i häftet som avses, vilka källor som stöder det och hur långt vi har kunnat kontrollera det.

Så läser du statusen

- **Öppnad och kontrollerad** – sidan hämtades och uppgifterna jämfördes med texten (datum anges).
- **Delvis kontrollerad** – källan stöder en del; resten står i anmärkningen.
- **Uträknat** – kontrollräknat, ingen extern källa behövs.
- **Ingen källa öppnad** – allmänt läroboksfaktum som ännu inte är kontrollerat mot en källa.

Många av källorna är sekundära (uppslagsverk, undervisningssidor, Wikipedia). Använd dem som utgångspunkt och gå vidare till originalen. Granskningen är gjord av Claude och är inte en ämnesgranskning av en lärare.

[1] Randomiserade, blindade, placebokontrollerade studier.

Wikipedia: Randomized controlled trial Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Randomized_controlled_trial
Bekräftar: deltagare fördelas slumpmässigt för att minska selektionsbias och sprida både kända och okända störfaktorer jämnt; kontrollgrupp/placebo; blindning minskar psykologisk bias och observatörsbias; små studier har låg statistisk styrka, större urval gör det lättare att se effekter.
Läs mer: CONSORT-riktlinjerna beskriver hur RCT ska redovisas.

Wikipedia: Placebo-controlled study Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Placebo-controlled_study
Bekräftar att kontrollgruppen får en overksam behandling (placebo) för att visa vad som händer utan den aktiva behandlingen och att blindning minskar bias som placeboeffekten. Termerna enkel-/dubbelblind används inte på sidan.
Läs mer: Jämför med RCT-sidan nedan.

[2] Randomisering minskar selektionsbias och sprider störfaktorer.

Wikipedia: Randomized controlled trial Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [1].

[3] Större urval minskar slumpens betydelse.

Wikipedia: Randomized controlled trial Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [1].

[4] Störfaktorer och randomisering.

Wikipedia: Randomized controlled trial Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [1].

Wikipedia: Correlation does not imply causation Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_does_not_imply_causation
Bekräftar glass–drunkningsexemplet som en gemensam orsak (varmt väder ökar både glassförsäljning och bad, därmed drunkning). Definitionen av störfaktor (confounder) hämtas från samma tankemönster, men separat Wikipedia-sida om confounding kunde inte öppnas.
Läs mer: Sök efter ”Spurious correlations” för fler exempel.

[5] Falsifierbarhet.

Wikipedia: Demarcation problem (Poppers falsifierbarhetskriterium) Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Demarcation_problem
Bekräftar att Popper föreslog falsifierbarhet som kriterium (ett vetenskapligt påstående måste kunna stå i konflikt med möjliga observationer) och att astrologi är hans tydligaste exempel på pseudovetenskap; sidan nämner också kritik (t.ex. att kriteriet kan räkna prövade och vederlagda påståenden som vetenskapliga).
Läs mer: Stanford Encyclopedia of Philosophy har en längre genomgång (ej öppnad här).

[6] Carlson 1985.

Wikipedia: Shawn Carlson (dubbelblint astrologitest, Nature 1985) Delvis kontrollerad
https://en.wikipedia.org/wiki/Shawn_Carlson
Bekräftar: Carlson, Nature, 5 dec 1985; 28 astrologer nominerade av astrologorganisationen NCGR; över 100 födelsehoroskop skulle paras ihop med personlighetsprofiler (California Psychological Inventory); astrologerna presterade inte bättre än slumpen, inte heller när de var säkra. Sidan är sekundär; själva Nature-artikeln (Carlson 1985, Nature 318:419–425) öppnades inte.
Läs mer: Hitta originalet via Nature eller Google Scholar: ”A double-blind test of astrology”.

[7] Semmelweis: dödlighet före och efter handtvätt.

Wikipedia: Ignaz Semmelweis Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweis
Bekräftar siffrorna för 1846: första kliniken 459 döda av 4 010 födslar (11,4 %), andra kliniken 105 av 3 754 (2,8 %). Kolletschka skadades av en studentskalpell vid en obduktion (exakt datum anges inte på sidan).
Läs mer: Följ källorna längst ned på sidan.

James Lind Library: Ignaz Phillip Semmelweis – studies of death in childbirth Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://www.jameslindlibrary.org/illustrating/articles/ignaz-phillip-semmelweis-studies-of-death-in-childbirth
Bekräftar att dödligheten på första kliniken föll till 12,7 per 1 000 förlossningar (1,27 %) år 1848 efter handtvätt med klor, jämförbart med 13,3 per 1 000 på andra kliniken. Observera att Lind-sidan anger medelvärdet 1840–46 (9,84 % mot 3,62 %); lärobokens siffror 11,4 % mot 2,8 % gäller enbart 1846 (se Wikipedia-källan).
Läs mer: Läs Semmelweis original (1861) via biblioteket.

[8] Bara en andel av dem som bär på H. pylori får magsår.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Påståendet är ett allmänt läroboksfaktum som inte har kontrollerats mot en enskild källa i detta arbete. Kontrollera det i en källa du litar på innan du förlitar dig på det.

[9] Glass och drunkning: gemensam orsak (värme).

Wikipedia: Correlation does not imply causation Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [4].