


Fördjupning: Ekologi

Kretslopp, kurvor och klimat i norr

Varför växer klöver bra i mager jord? Hur kunde 29 renar bli 6 000 – och sedan nästan inga? Hur mycket fisk behöver en säl? Och vad händer med fjällen när klimatet blir varmare? I den här fördjupningen räknar, tolkar och resonerar du om ekosystem som en ekolog.

SÅ NÅR DU HÖGSTA NIVÅN

- Resonera i flera led: visa hur en sak leder till nästa – ”eftersom … därför … vilket leder till …”.
- Använd begreppen korrekt och förklara dem i sammanhanget.
- Väg för- och nackdelar och se frågan från flera perspektiv, till exempel miljö, hälsa, ekonomi och etik.
- Var nyanserad: visa vad som är osäkert och vad mer man skulle behöva veta.
- Ta ställning och motivera med naturvetenskapliga argument.

F4.1 Kvävets kretslopp 2

F4.2 Populationer som växer – och kraschar 3

F4.3 Räkna med energi 4

F4.4 Ett varmare norr 5

Resonera och ta ställning 6–7

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Läs först kapitel 4 i grundboken. Fördjupningen bygger på begreppen producent, konsument, nedbrytare, kretslopp, energiflöde, population och övergödning.

F4.1 Kvävets kretslopp

4+

Alla organismer behöver kväve för att bygga proteiner och DNA. Luften består till 78 procent av kvävgas – men varken växter eller djur kan använda den direkt. Kvävgasmolekylen är för stabil. Det är därför kväve ofta är det ämne som begränsar hur mycket växter kan växa.




Bild F4.1 Kvävets kretslopp, förenklat.

Kvävefixering. Vissa bakterier kan omvandla kvävgas till ämnen som växter kan ta upp. En del lever i knölar på rötterna hos baljväxter som klöver, ärter och bönor. Växten ger bakterierna socker och får kväve tillbaka – en symbios.

Näringskedjan. Djur får kväve genom att äta växter eller andra djur.

Nedbrytning. Nedbrytare frigör kväveföreningar ur döda organismer och avföring. Växterna kan ta upp dem igen.

Tillbaka till luften. Andra bakterier, särskilt i syrefattig och blöt mark, omvandlar kväveföreningar till kvävgas igen.

Människan har förändrat kretsloppet kraftigt. Med konstgödsel tillför vi stora mängder kväve till åkrarna. Det som växterna inte tar upp kan rinna ut i sjöar och hav och orsaka övergödning.

ÖSTERSJÖN

På sommaren kan man se stora gröna mattor av blågröna bakterier, cyanobakterier, i Östersjön. De kan fixera kväve från luften själva och gynnas därför när det finns mycket fosfor i vattnet.

BEGREPP

Kvävefixering
När bakterier gör om kvävgas till ämnen som växter kan använda.

F4.2 Populationer som växer – och kraschar

Om varje hare får fyra ungar som överlever och förökar sig blir det snabbt väldigt många harar. När en population kan växa fritt ökar den inte med samma antal varje år, utan med en viss andel. Ju fler individer, desto fler nya – kurvan böjer uppåt som ett J. Det kallas **exponentiell tillväxt**.

I verkligheten tar resurserna slut förr eller senare. Tillväxten bromsas och populationen planar ut kring det antal som miljön kan försörja långsiktigt. Det kallas miljöns **bärförmåga**. Kurvan får formen av ett S.

Bärförmågan är inte konstant. Den beror på födotillgång, väder, rovdjur och konkurrenter – och kan förändras om miljön förändras. Om en population växer långt över bärförmågan kan den förstöra sin egen födobas. Då kan den krascha och bärförmågan bli lägre än förut.




Bild F4.2 J-kurva och S-kurva.

Renarna på St Matthew

År 1944 släpptes 29 renar ut på den obebodda ön St Matthew i Berings hav. Där fanns tjocka mattor av lavar men inga rovdjur och ingen jakt. Renarna förökade sig snabbt. År 1963 räknade forskare till omkring 6 000 renar. Men lavarna, som växer mycket långsamt, var nästan helt uppätna.

Vintern 1963–64 var ovanligt sträng med mycket snö. Renarna svalt ihjäl i stort antal. År 1966 fanns bara 42 renar kvar, och på 1980-talet var de helt borta. Lavmattorna har fortfarande inte återhämtat sig helt.




Bild F4.3 Renpopulationen på St Matthew.

TÄNK EFTER

Varför räckte det inte att renarna hade gott om mat år 1950 för att populationen skulle förbli stabil?

F4.3 Räkna med energi

I grundboken lärde du dig tumregeln att bara omkring 10 procent av energin förs vidare från en nivå i näringskedjan till nästa. Med den kan man göra uppskattningar som visar varför ekosystem ser ut som de gör. Tumregeln kan användas för både energi och biomassa (vikten av levande material).



Bild F4.4 En näringskedja i Östersjön med tumregeln om 10 procent.

Exempel

En säl äter strömming och torsk. Om sälen växer 1 kg, hur mycket växtplankton har det krävt längre ner i kedjan?

1 kg säl ← 10 kg torsk ← 100 kg strömming ← 1 000 kg djurplankton ← 10 000 kg växtplankton

Varje steg uppåt i kedjan gör alltså att det krävs tio gånger mer föda längst ner. Det förklarar varför toppkonsumenter är få, behöver stora områden och är så känsliga för förändringar.

Anrikning i siffror

Om ett miljögift inte bryts ner och stannar i kroppen gäller det omvända: halten kan bli ungefär tio gånger högre i varje steg. Ett gift som finns i mycket låg halt i växtplankton kan alltså finnas i tusen eller tiotusen gånger högre halt i en säl eller havsörn.

RÄKNA SJÄLV

Kedjan är växtplankton → djurplankton → strömming → gädda → havsörn. Ungefär hur mycket djurplankton behövs för att havsörnen ska öka 1 kg? Hur mycket växtplankton?

VARNING

10 procent är ett grovt genomsnitt. Hos växtätande insekter kan det vara mer, hos varmblodiga däggdjur ofta mindre, eftersom de använder mycket energi för att hålla värmen.

F4.4 Ett varmare norr

4+

Arktis och de nordligaste delarna av Sverige blir varmare betydligt snabbare än jorden i genomsnitt. Det påverkar ekosystemen på många sätt, och förändringarna hänger ihop i långa kedjor.




Bild F4.5 När det blir varmare kan träd och buskar växa högre upp på fjällen.

Trädgränsen kryper uppåt

När somrarna blir varmare och längre kan fjällbjörk, tall och buskar växa högre upp. Kalfjället krymper, och arter som är anpassade till öppna fjällmiljöer – som fjällräv, fjällripa och många fjällväxter – får mindre plats. Fjällen är den landskapstyp i Sverige där andelen rödlistade arter har ökat mest.

Tajmingen går fel

Många organismer styrs av olika signaler. Växter och insekter påverkas mycket av temperaturen, medan flyttfåglar ofta startar flytten efter dagslängden. När våren kommer tidigare kan insekterna ha sin topp innan fåglarnas ungar har kläckts. Då får ungarna för lite mat. Forskare kallar det en **felmatchning i tid**.

Nya arter flyttar in

Arter som tidigare inte klarade de kalla vintrarna kan sprida sig norrut, till exempel rödräven upp på fjället. De kan konkurrera med arter som redan finns där.

POSITIV ÅTERKOPPLING

Snö och is reflekterar solljus. När snösäsongen blir kortare och mörk skog ersätter vitt fjäll tar marken upp mer värme. Då blir det ännu varmare – uppvärmningen förstärker sig själv.

FUNDERA

Lämlarna behöver ett stabilt snötäcke på vintern. Vad kan hända med fjällräven om vintrarna får fler perioder med töväder och skare?

Resonera och ta ställning

Uppgifterna motsvarar de svåraste uppgifterna på nationella prov. Svara utförligt och resonera i flera led. ● grundläggande ●● utvecklat ●●● välutvecklat

1 Använd bild F4.3 om renarna på St Matthew. a) Beskriv populationens utveckling och förklara den med begreppen exponentiell tillväxt och bärförmåga. b) Förklara varför populationen inte planade ut som i en S-kurva. c) Hur hade utvecklingen troligen sett ut om det funnits vargar på ön? ●●●

2 En ekologisk bonde gödslar inte med konstgödsel. I stället odlar hon klöver vartannat år på åkern och plöjer ner den. Förklara i flera steg hur det kan ge mer kväve till grödan nästa år. Diskutera också för- och nackdelar jämfört med konstgödsel för miljön. ●●●

3 En gråsäl äter ungefär 5 kg fisk per dag. Använd tumregeln om 10 procent och gör en uppskattning av hur mycket djurplankton som krävs för en säls mat under ett år, om fisken den äter är strömming som äter djurplankton. Redovisa dina beräkningar och kommentera hur säker uppskattningen är. ●●

Resonera och ta ställning, forts.

4+

4 Förklara i minst tre led hur ett varmare klimat kan påverka fjällrävens möjligheter att överleva i Sverige. Använd begrepp från ekologin, till exempel livsmiljö, konkurrens, näringskedja och population. ●●●

5 För att minska övergödningen i Östersjön föreslås två åtgärder: A) anlägga våtmarker där åkrarnas vatten rinner ut, eller B) förbjuda konstgödsel helt. Jämför åtgärderna utifrån effekt på övergödningen, konsekvenser för livsmedelsproduktionen och hur realistiska de är. Ta ställning. ●●●

6 Kvicksilver har hittats i gädda från en skogssjö, trots att det knappt går att mäta i sjövattnet. Förklara varför och vad det kan betyda för människor som äter mycket insjöfisk. ●●