1.

증상(F2) [한글모드]

3d
오늘부터 열,
타병원 소아과 medication 중, 천식도 있는 듯하다.

f/c +/-
c/s/r +/+/+

clear breath sound without rale, wheezing

r/o bronchiolitis

항생제 처방

특이증상(F6) [한

계란 흰자 알레르기
drug allergy -

바이탈 사인(^F7)

BT	BW	BP1	BP2	PR	RR	BST
37.8	21					

접수일:2025-08-10, 진료시간:14:00:16 <진료기록(F4,F5)>

코드	명칭	좌	우	의증	배제	특정코드	진료
j209	상세불명의 급성 기관지염	☐	☐	☐	☐		13

[외래완료 환자수 : 188명]

코드	명칭	용량	일투수	일수	용법	원외	가산	특정내역	예
augsy	아목클시럽	21	3	5		☑			
tysy	세토펜현탁액(내복)	22.5	3	5	sep	☑			
dexisy	코코페디시럽(내복)	18	3	5	sep1	☑			

Tysy, dexisy의 경우 용량은 항상 alt+D 약품정보에서 확인하시는 것을 권장드립니다

만 12세 이하의 소아: 다음 1회 권장용량을 4-6시간 마다 필요시 복용한다. 이 약은 가능한 최단기간동안 최소 유효용량으로 복용하며, 1일 5회 (75mg/kg)를 초과하여 복용하지 않는다.
몸무게를 아는 경우 몸무게에 따른 용량(10~15mg/kg)으로 복용하는 것이 더 적절하다.

연령	몸무게	아세트아미노펜으로서 1회 권장 용량	이 약 1회 권장용량
4개월~6개월	7 ~ 7.9kg	80mg	2.5mL
7개월~23개월	8 ~ 11.9kg	120mg	3.5mL
만 2세~3세	12 ~ 15.9kg	160mg	5mL
만 4세~6세	16 ~ 22.9kg	240mg	7.5mL
만 7세~8세	23 ~ 29.9kg	320mg	10mL
만 9세~10세	30 ~ 37.9kg	400mg	12.5mL
만 11세	38 ~ 42.9kg	480mg	15mL
만 12세	43kg 이상	640mg	20mL

생후 6개월 이상의 소아 : 이 약은 1회 0.4~0.6mL/kg(덱시부프로펜으로서 5~7mg/kg)의 용량을 4~6시간 간격으로 필요시에 복용하며, 1일 최대 4회(28mg/kg)를 넘지 않는다.
체중이 30kg 이하인 소아에게는 1일 최대 25mL(덱시부프로펜으로서 300mg)을 초과하지 않는다.

$$1\text{회 복용량}(mL)\text{산출식} = \frac{\text{몸무게}(kg) \times (5 \sim 7mg)/kg}{12mg/mL}$$

이 약 1회 용량은 몸무게 또는 나이에 따라 다음과 같이 투여할 수 있다.
(몸무게를 아는 경우에는 몸무게에 따른 용량으로 복용하는 것이 더 적절하다.)

연령	체중(kg)	1회 용량 (mL)	덱시부프로펜으로서의 용량 [1회 (mg)]
만12세	43 kg 이상	18~25 mL	215~300 mg
만11세	38.0-42.9 kg	16~25 mL	190~300 mg
만9-10세	30.0-37.9 kg	12.5~22 mL	150~265 mg
만6-8세	21.0-29.9 kg	9~17 mL	105~210 mg
만4-5세	16.0-20.9 kg	7~12 mL	80~145 mg
만2-3세	12.0-15.9 kg	5~9 mL	60~110 mg
12-23개월	10.0-11.9 kg	4~7 mL	50~80 mg
6-11개월	7.9-9.9 kg	3~6 mL	40~70 mg

대략 1회 9ml씩 총량 27로 통일해서 내주시면 될 것 같습니다.

2.

이상진	2025-08-10				
	증상				
	7주일 왔다갔다. 지난 주 일요일, 화, 목, 토, 일 열 - 해열제 먹으면 괜찮다. headache +				
	clear breathing sound r/o URI r/o bronchiolitis				
	병명				
j209	상세불명의 급성 기관지염				
m5456	아래허리통증, 요추부				
	처방				
d	제일제약디클로페낙나트	1,0	1	1	
aug	아목클정375mg	3,0	3	3	
erdo	에스텐캡슐300mg	3,0	3	3	
ac	뮤시딘캡슐200mg	3,0	3	3	
loxo	록스파인정	3,0	3	3	
ty	세토펜이알서방정(내복)	3,0	3	3	sep

Erdo+ac는 삭감됩니다. 그리고 약 순서도 같이 맞춰주시면 감사하겠습니다

코드	명칭	용량	일투수	일수	용법
d	제일제약디클로페낙나트륨주사액(주사)	1	1	1	
aug	아목클정375mg	3	3	3	
loxo	록스파인정	3	3	3	
erdo	에스텐캡슐300mg	3	3	3	
ac	뮤시딘캡슐200mg	3	3	3	
ty	세토펜이알서방정(내복)	3	3	3	sep

3.

이상진	2025-08-10			
	증상			
	1 year both year swelling, redness +/+ lt buttock 에도 skin lesion			
	현재 임신 가능성 -, 준비중 r/o urticaria			
	병명			
l239	상세불명 원인의 알레르기성 접촉피부염			
k297	상세불명의 위염			
j303	기타 알레르기비염			
	처방			
pheni	휴온스클로르페니라민말	1,0	1	1
bepo	알리온정10mg	1,5	3	3
pd	메프솔정4mg	3,0	3	3
reba	무코란정	3,0	3	3

L309 상세불명의 피부염, L500 알레르기 피부염, L239 알레르기성 접촉피부염 상병에 스테로이드, 항히스타민제, 항생제 다 사용 가능합니다. Bepo 때문에 같이 입력된 j303 비염 상병은 불필요해서 지워주시면 감사하겠습니다!(제가 청구할 때 보통 수정해놓긴 합니다)

4.

이상진	2025-08-10				
	증상				
	1d 아이 물놀이 후 집에 있던 항생제 하나 먹고 옴 f/c +/+ sore throat + ->- c/s/r -/+/- PI +- no tonsilar hypertrophy clear breath sound r/o APT, r/o bronchiolitis				
	병명				
j0390	상세불명의 급성편도염, 재발의 언급이 없음				
m5456	아래허리통증, 요추부				
	처방				
ns	NS250kit	1,0	1	1	
mc	마이어스칵테일	1,0	1	1	
tyiv	지씨웰빙아세트아미노펜	1,0	1	1	
aug	아목클정375mg	3,0	3	5	
erdo	에스텐캡슐300mg	3,0	3	5	
loxo	록스파인정	3,0	3	5	
ty	세토펜이알서방정(내복)	3,0	3	5	prn

질환에 대한 치료 목적으로 수액 사용 시 가급적이면 주사제도 믹스해주시는게 차후 실비로 인한 분쟁을 막을 수 있어 권장드립니다. URI의 경우 금기가 아니면 tra 트라덱사 반반으로 보통 믹스하곤 합니다. 참고로 tyiv는 따로 100ml 정도 NS에 paracetamol 믹스된 수액입니다. 그리고 약 순서도 조금 신경써주시면 감사하겠습니다!

5.

이상진	2025-08-10				
	증상				
	1d 1-2주 전에 냉방병처럼 감기증상 있었다가 약먹고 호전 f/c +/+ sore throat + c/s/r +-/+/+ PI + tonsilar hypertrophy with slight exudate clear breath sound APT 타이레놀, NSAID 는 집에 있다.				
	병명				
j0390	상세불명의 급성편도염, 재발의 언급이 없음				
	처방				
tyiv	지씨쉘빙아세트아미노펜	1.0	1	1	
ns	NS250kit	1.0	1	1	
trab	도란찐주50mg(주사)	1.0	1	1	
aug	아목클정375mg	3.0	3	3	
co	코데날정(내복)	4.5	3	3	
erdo	에스텐캡슐300mg	3.0	3	3	
suda	슈다펜정(내복)	1.5	3	3	
tan	삼아탄툼액(외용)	1.0	1	1	

Tyiv는 따로 나오는 수액제제이기도 하고 비급여라 trab -> tra로 해주시면 됩니다.

6.

이상진	2025-08-10			
	증상			
	오후부터 dizziness + n/v/d +/+/- tinnitus -/-, whirling sense + (누웠다가 일어날 때) nytagmus - ataxia - r/o pph vertigo ENT/Neuro f/u 필요함 설명			
	병명			
r42	어지러움			
r111	구역			
k297	상세불명의 위염			
	처방			
bona	보나링에이정(내복)	3,0	3	3
trime	트리멘정	3,0	3	3
reba	무코란정	3,0	3	3

Reba는 반드시 위염 상병이 필요하고 trime는 위염, 장염, r11구역구토, k30소화불량, k58 IBS 상병에 사용 가능합니다. 위염 상병만 있어도 두 약이 다 커버가 되어서 r111 구역이 불필요합니다.

7.

이상진	2025-08-10			
	증상			
	1d f/c +/- headache +, sore throat - c/s/r +/-/+ PI + tonsliar hypertrophy + clear breath sound r/o APT ENT exudate 치료필요할 수 있음 설명			
	병명			
j060	급성 후두인두염			
	처방			
tra	타마돌주사	1.0	1	1
aug2	아목클정625mg	3.0	3	3
co	코데날정(내복)	4.5	3	3
suda	슈다펜정(내복)	1.5	3	3
ty325	세토펜정325mg	6.0	3	3
tan	삼아탄툼액(외용)	1.0	1	1

Ty325 2T씩이면 ty 코드의 세토펜이알서방정(AAP 650mg)로 대체 가능합니다. 더 적은 용량의 약을 여러 개로 나눠서 내면 배수 처방이 되어 삭감됩니다. 나누어 내면 더 비싸서 심평원에서 삭감을 합니다. 그리고 NSAIDs나 AAP 처방 시 위장장애 말씀하시는 경우가 워낙 많아서 루틴하게 reba 와 같은 위장 보호제를 하나씩은 넣고 있어 참고해주시면 감사하겠습니다!

8.

이상진	2025-08-10				
	증상				
	1d 특별한 음식 먹은 것은 없다 f/c -/+ n/v/c +/-/- normoactive bowel sound epigastric DT +/ RT - r/o gastritis early appe 가능성 early AGE 가능성 warning				
	병명				
a090	감염성 기원의 기타 및 상세불명의 위장염 및 결장염				
r111	구역				
k297	상세불명의 위염				
	처방				
tyiv	지씨웰빙아세트아미노펜	1.0	1	1	
ns	NS250kit	1.0	1	1	
macb	맥페란주사액2mL(주사)	1.0	1	1	
tirop	티파론정	3.0	3	3	
trime	트리멘정	3.0	3	3	
reba	무코란정	3.0	3	3	
ty	세토펜이알서방정(내복)	3.0	3	3	

이전 사례와 마찬가지로 macb -> mac으로 보험으로 내시면 됩니다. 맥페란 제제는 반드시 r11구역구토가 필요한데 위의 경우에는 비급여로 나와서 추가할 필요는 없습니다.

코드	명칭	좌
a090	감염성 기원의 기타 및 상세불명의 위장염 및 결장염	☐
k297	상세불명의 위염	☐
r111	구역	☐

[재완료 환자수 : 188명]

코드	명칭	용량	일투수	일수	
tyiv	지씨웰빙아세트아미노펜주_(1g/100mL)(	1	1	1	
ns	NS250kit	1	1	1	
mac	멕쿨주	1	1	1	
ty	세토펜이알서방정(내복)	3	3	3	
tirop	티파론정	3	3	3	
trime	트리멘정	3	3	3	
reba	무코란정	3	3	3	
#A154050	초진진찰료-의원(공휴일)	1	1	1	

수정하면 이렇게 됩니다.

9.

이상진	2025-08-10			
	증상			
	1d 2주 전 토닝을 받고 모낭염이 올라왔다. 약간의 itching r/o dermatitis 증상 지속시 derma 다니시던 곳 f/u			
	병명			
l309	상세불명의 피부염			
j303	기타 알레르기비염			
k297	상세불명의 위염			
	처방			
bepo	알리온정10mg	1.5	3	3
reba	무코란정	3.0	3	3
cefa	세플러캡슐	3.0	3	3

L309 피부염에 anti, NSAIDs, AAP, antihistamine 사용 가능해서 cefa, bepo 커버되어 j303 비염이 불필요하게 됩니다. 약 순서도 항상 고려해주세요!

10.

증상(F2) [한글모드] F B

1d

입술 뜯는 버릇이 있다.
lower lip reddness/swelling

lip inflammation

infection 가능성 설명, 증상 지속/악화시 derma/ped 내원 rec

특이증상(F6)

med. hx.(-)
drug allergy(-)
편도비대

바이탈 사인(^F7)

BT	BW	BP1	BP2	PR	RR	BS
37	25					

접수일:2025-08-10, 진료시간:20:02:59 <진료기록(F4,F5)>

코드	명칭	조
I309	상세불명의 피부염	

[외래완료 환자수 : 188명]

코드	명칭	용량	일투수	일수
cefasy	시클러건조시럽125mg/5ml(내복)	15	3	2
dexisy	코코페디시럽(내복)	30	3	2

Cefasy 용량이 몸무게에 비해 너무 적습니다. 보통 몸무게와 비슷한 정도로 처방하고 있고 최대 30까지 내고 있습니다.

성분 / 함량

5ml중
Cefaclor 125mg

용법용량

○ 성인 : 세파클러로서 1회 250mg(역가)을 8시간마다 경구 투여한다. 중증감염증(폐렴 등)과 감수성이 낮은 감염증의 경우 2배로 증량 투여할 수 있다. 급성 임균성 요도염의 경우 이 약 3g과 프로베네시드 1g을 단회 병용 투약한다.
○ 소아 : 1일 체중 Kg당 20mg(역가)을 8시간마다 분할 투여한다. 중증감염증, 중이염 및 감수성이 낮은 감염의 경우에는 1일 체중 Kg당 40mg(역가)을 투여할 수 있으며 최대용량은 1일 1g(역가)이다.

25Kg 소아라 하루 총량 500mg이고 1회 167mg 정도 되어 약 6.68ml씩 총량 20~21ml

정도 복용하면 됩니다. 다만 중증감염증, 중이염 및 감수성이 낮은 감염의 경우에는 2배까지 투여할 수 있는데, URI로 오는 아이들이 중이염이나 기타 중증감염증으로 차후에 이행되는 경우도 많은 부분도 고려해야 합니다. 그리고 약 복용하면서 소실되는 용량이나 타 소아과 처방 용량 등을 고려해서 루틴하게는 대략 몸무게와 비슷하게 내면서 간편하게 처방하고 있습니다.