levosurpiride, mosapride, metoclopramide 사용

정성묵 + 구독 1:1 채팅
2017.01.14. 16:37 조회 278

댓글 3 URL 복사

첨부파일 2

우리 회사에서 사용하는 약중 **levosurpiride, mosapride, metoclopramide**가 있습니다.(주로 앞에것 두개위주) 이 셋은 prokinetics로써 위장의 운동능력을 촉진시켜 음식물의 이동 및 배출을 원활히 함으로써 음식물의 배출 장애로 생기는 증상을 개선하기 위해 사용됩니다. **(속이 답답한 환자들 걱걱 거리는 사람들)**

Table 1. Pharmacodynamic properties, gastrointestinal motor effects and side effects of gastrointestinal modulating drugs

Classification and name of drugs	Target receptors and actions	Gastrointestinal motor effects			Side effects
		Esophagus	Stomach	Colon	
Dopamine D_2 R AT					
Metoclopramide	Dopamine D_2 R AT, $5HT_4$ AG, $5HT_3$ AT	contraction ↑	GET ↑		extrapyramidal Sx hyperprolactemia associated Sx
Domperidone	Dopamine D_2 R AT	LES pr ↑	GET ↑		hyperprolactemia associated Sx
Itopride	Dopamine D_2 R AT, inhibition of acethylcholinesterase	?	GET ↑	?	rash, diarrhea, gliddiness, galactorrhea
Levosulpiride	Dopamine D_2 R AT, $5HT_4$ AG, weak $5HT_3$ AT	?	GET ↑		hyperprolactemia associated Sx
$5HT_4$ R AG					
Cisapride	$5HT_4$ R AG, weak $5HT_3$ R AT	contraction ↑, LES pr ↑	GET ↑	CTT ↑	QT prolongation
Mosapride	$5HT_4$ R AG, metabolite: weak $5HT_3$ R AT	?	GET ↑	?	
Tegaserod	$5HT_4$ R AG	?	GET ↑, GA ↑	CTT ↑	abdominal pain, headache, heart attack
Prucalopride	$5HT_4$ R AG	?	?	CTT ↑	abdominal pain
Renzapride	$5HT_4$ R AG, $5HT_1$, $5HT_3$ R AT	?	GET ↑	CTT ↑	abdominal pain, headache
Motilin R AG					
Erythromycin	Motilin R AG	LES pr ↑	GET ↑, GA ↓		arrythmia, reversible deafness, abdominal pain, diarrhea
$5HT_{1A}$ R AG					
Buspirone	$5HT_1$A R AG		GET ↓, GA ↑		vertigo, headache, agitation
$5HT_{1B/D}$ R AG					
Sumatriptan	$5HT_{1B/D}$ R AG		GET ↓, GA ↑		palpitation, syncope, anemia, myalgia
$5HT_3$ R AT					
Alosetron	$5HT_3$ R AT			CTT ↓	ischemic colitis
Cilansetron	$5HT_3$ R AT			CTT ↓	ischemic colitis
Ondansetron	$5HT_3$ R AT			CTT ↓	dizziness, headache
SSRI					
Citalopram				contractility ↑	fatigue, drowsiness, dry mouth, headache
Paroxetine			GA ↑		nausea, somnolence, dizziness, dry mouth
$GABA_B$ receptor AG					
Baclofen	$GABA_B$ R AG	TLESR ↓			headache, dizziness, insomnia, nausea, constipation

작용기전은 다르지만 비슷한 용도로 사용하게 되는데 이들을 사용하는데는 몇몇 코드가 있어야 보험급여가 인정이 됩니다.

1. levo나 mosa의 경우 다음 세가지 중 한가지가 있어야 됩니다. **(r11 or k30 or k58 중 1개 필요, 위염이나 장염으로 안됨)**
2. 맥페란의 경우 구역코드가 필요합니다.

3. prokinetics는 1개만 보험이 됩니다. 여러종류를 내시면 안됩니다.

코드	명칭	좌	우	수술	진료과	특정코드
r11	구역 및 구토	☐	☐	☐	01	
k30	소화불량	☐	☐	☐	01	
k58	자극성 장증후군	☐	☐	☐	01	

지금은 levo나 mosa는 k30 소화불량 코드가 연결로 잡혀있으니 굳이 지우지 말고 그대로 처방을 내시면 될것 같습니다.

아래는 처방코드를 빠뜨린 예입니다. 이렇게 나가면 mosapride는 삭감을 당하게 됩니다.

코드	명칭	좌	우	수술	진료과	특정코드
j111-1	인플루엔자NOS	☐	☐	☐	13	
k297	상세불명의 위염	☐	☐	☐	01	

[외래완료 환자수 : 143명]

코드	명칭	용량	일투수	일수	용법	원외	예외	가산	특정내역
flu	인플루엔자간이검사	1	1	1		☐			
64500046	타미플루캅셀75mg(내복)	2	2	5		☑			
dexi	덱시핀정	3	3	3		☑			
dige	라비수정	3	3	3		☑			
suda	슈다펜정(내복)	3	3	3		☑			
kina	사라나제정	3	3	3		☑			
mosa	모사틴정	3	3	3		☑			
#A154000	초진진찰료-의원,보건의료원 내 의과	1	1	1		☐			

약물 사용응용 팁을 드리면 dopamine antagonist levo vs serotonergics mosa
약물효과는 levo > mosa
S/E많은 정도 levo > mosa
colon쪽에도 효과작용추정 mosa
또한 prokinetics는 식전에 먹는 것이 효과적입니다.

처방시 주의점은 위에 나와 있는데로 levo의 경우 손떨림이나 hyperprolactinemia ass Sx (amenorrhea, galactorrhea등)이 있을수 있어 여성에게나 장기 처방시 주의
맥페란은 extrapyramidal Sx조심 (iv mix시 천천히 주기)

등록순 최신순 클린봇 댓글알림

천대표
macpo,trime,dom,levo,mosa 중 1가지만 내셔야합니다~
dom2,trimesy 도 둘 중 1개~

macpo,dom - r11(구역/구토)만 가능
trime - r11,위염,장염,k58(IBS)에 가능
levo,mosa - r11,k30(소화불량),k58에 가능
모두 다 위의 상병코드중 1개만 써주시구요,즉, k30+r111 이나 r111+k58 하지마세요.

2017.01.26. 12:26 답글쓰기

조성태

2017.01.16. 09:31 답글쓰기

JuNO

네 잘알겠습니다 감사합니다

2017.01.16. 19:40 답글쓰기

유성우

댓글을 남겨보세요

등록