공지사항 >

소아 주사 및 약 용량

천대표 ✓ 구독 중 1:1 채팅
2017.01.17. 17:18 조회 1,003

댓글 6 URL 복사

소아는 성인의 축소판이 아니다.
소아과 교과서에 나오는 말인데요,뭐 축소판도 됩니다 ㅋㅋㅋ
소아들 용량은 저도 alt+D 아직도 엄청 하는데요,뭐 제가 쓰고있는 방법? 좀 나열해볼까 합니다.
대전제는 우선은 kg기준으로 하고 월령과 증상 정도에 따라 반~한단계씩 조절합니다.

1. 디클로페낙 주사
디클로는 근육통,관절통,요통,경추통,통풍,신우염,담낭염에만 보험이 가능합니다.
그런데 애들이 근육통,관절통을 호소한다...이게 좀 웃겨서요,근통 잡지 않고 코드 없이 비급여로 냅니다.
d는 보험(연결코드-근통),di는 비보험(6060원)이지요.
6060원인 이유는 용량 1/3 즉,0.33 냈을때 2000원이 딱 나오거든요.0.3 내면 1800원이니 1/3 쓸땐 0.33으로~
성인의 경우 디클로를 di로 내면 초진진찰료 5500원+6000원=11500원 나와서 1차 저항선인 1만원을 돌파하므로 디클로는 꼭 보험으로 내셔야합니다.
소아의 경우 0.5를 써도 3000원이라 진찰료 포함해도 8500원으로 저항선인 1만원 아래이므로 괜찮습니다.
보통 5세 이상,즉 "몸이 아파요"라고 말할 수 있는 애들은 그냥 보험인 d로 내시면 되구요.
그이하 어린애들은 di(비급여)로 내세요.
용량은 50kg를 1로 하시면 됩니다.좀 적게 줘도 됩니다.
즉, 10kg - 0.2, 13kg~15kg - 0.25, 16~24kg - 0.33 25~35kg - 0.5

2. suda2,co2 등 tid 감기약 (1세=10kg=9, 3세=15kg=15 라 생각하면 편함)
애들 약은 1회 용량이 0.5cc단위(물약만,가루약 제외)가 최소가 되게 해주세요.1회 투약량이 3.1477cc 이러면...음...
그나마 20kg 넘는 애들은 자연수단위가 되게 해주세요.8cc나 7.5cc나 차이 없으니까요.2cc와 2.5cc는 크지요.
대표적인 물약은 suda2,co2가 있는데,얘들은 몸무게보다 하루 총량이 같거나 조금 적게 나가면 됩니다.
예를 들어, 14kg 13개월이면 12cc, 14kg 20개월이면 13.5, 14kg 3세1개월이면 15cc로
같은 몸무게이지만 월령에 따라서 조금씩 차이를 둡니다.
또한 co2보다 suda2를 좀 줄여 내시는 게 좋습니다.특히 20kg 이상에서.
예를 들어, 25kg - co2 24,suda2 21 이렇게.

3. dexisy,tysy
얘들은 alt+D 후 상세정보보기하면 kg,월령별 표가 나와있는데요.
각 kg와 용량의 앞쪽을 맞추시면 됩니다.

연령	체중(kg)	1회 용량 (mL)	덱시부프로펜으로서의 용량 [1회 (mg)]
만12세	43 kg 이상	18~25 mL	215~300 mg
만11세	38.0-42.9 kg	16~25 mL	190~300 mg
만9-10세	30.0-37.9 kg	12.5~22 mL	150~265 mg
만6-8세	21.0-29.9 kg	9~17 mL	105~210 mg
만4-5세	16.0-20.9 kg	7~12 mL	80~145 mg
만2-3세	12.0-15.9 kg	5~9 mL	60~110 mg
12-23개월	10.0-11.9 kg	4~7 mL	50~80 mg
6-11개월	7.9-9.9 kg	3~6 mL	40~70 mg

14kg다 그럼 체중 12-15.9 사이인 7로 나가지 말고,세로로 12-16이 5-7이니 사이값인 6을 내시면 됩니다.
그렇게 나가도 다른데보다 높다고 뭐라 하는 경우 있거든요.

4. anti
anti는 저희 기본 셋팅이 10kg로 되어있는데 모든 제제가 최대 기본세팅 2배까지 가능합니다.

즉 augsy 입력하면 9cc 뜨는데 18cc로 내셔도 괜찮습니다.
anti는 좀 더 내셔야하므로 2번의 제제들과는 다르게 반~한칸정도 올려서 처방합니다.
즉 14kg가 오면 13.5가 아니라 15를 냅니다.lacto2는 anti 용량을 따라가시면 됩니다.이경우 1.5
어린이집,유치원 다니는 애들은 약을 해당기관에 싸보내는데 항생제가 augsy,cefasy는 냉장보관이라 엄마,기관 모두 난감해하는 경우가 있습니다.그래서 bid로 내셔도 됩니다.이때 용량은 tid때와 같고 용법만 바뀌는 겁니다.

5. cetisy,keto2와 같은 bid 시럽제
~9 kg는 4, 10~14는 5, 15~19는 6, 20~24는 8, 25~30은 10 내시면 됩니다.

6. 비례해서 올리되 한도는 있다.
ac2,atock2,trimesy,dom2,lacto2 등 kg별로 내는 약을 45kg 소아가 왔다고 45로 내시면 안됩니다.
성인이 30 먹거든요.

7. 스테로이드
안쓰는 게 좋지만 어차피 쓸거라면 확실하게.
30kg를 기준으로 잡고 내시면 됩니다.즉,30키로면 성인용량.

8. suda
요건 거의 저만 쓰긴 하는데...
물약 가루약 1:1 비율과 가루약의 절대 용량을 맞추기 위해,증상이 너무 심하다 해서...등의 이유로 씁니다.
*가루약 절대용량이란 - 제형이 과립이냐 등등에 따라 다르지만 보통 1개의 가루약만을 20kg 안되는 애들에게 처방시엔 약봉투에 묻는 거랑 먹는 거랑 차이가 안날 정도로 양이 작은 문제가 발생.따라서 짝은 애들은 2개 이상의 가루약을 내기 위해 노력함.
suda 단독 처방시에 기준은 40kg를 기준으로 합니다.용법에 pow(갈아서)라고 표시해주고요.
suda와 suda2 함께 처방시엔 60kg를 기준으로 내고 suda2 또한 한단계 정도 줄여 냅니다.
ex) 20kg suda 단독 처방 suda 1.5#3 pow
ex) 20kg suda+suda2 처방시 suda 1#3 pow + suda2 18#3

dexisy+suda2+co2+tysy(prn)
suda2+typow+suda(pow)+co2+dexisy(prn)
다를게 없는 처방이죠?
그런데 물약+가루약낸 두번째 처방은 명의고,물약 4개 낸 위 처방은 이상한 처방이라고 합니다.
물약 가루약 비율 맞춰주시고(항생제에 lacto2,tysy->typow,trimesy->dom2 등을 적절히 이용)
만약 물약만을 낼 경우엔 환자에게 어떤어떤 약을 쓰는지 이해시켜야합니다.
이해 안가는 부분이지만,받아들여야 편하게 갈 수 있습니다.

등록순 최신순 클린봇 댓글알림

정성묵
국과 반찬이라고 생각하시면 편합니다. 국물 대 가루비율 1:1. 꼭 지켜지지 않는 경우도 있지만요. 비율을 맞추는 건 보여주기 위함이지만 그 이면에 소아 환자의 내복성 고려가 숨어있습니다. 마음대로 애가 약을 잘 먹지 않는 경우가 있습니다. 먹고 토하는 경우도 종종 있구요
2017.01.17. 22:05 답글쓰기

정성묵
적당히 반반섞어서 어느 한쪽의 쏠림을 막는게 먹이기도 편합니다. 간혹 시럽제제를 통 못먹는 아이, 가루약을 통 못먹는 아이등은 거기에 맞춰서 처방을 날리면 됩니다. 또 물약만 낸것(가루약없이) 약을 한번 타보면 알게됩니다. 약봉투가 굉장히 배부릅니다. 유치원에 약봉지 보낼때도 어렵구요.
2017.01.17. 22:08 답글쓰기

조성태

해열제 한통 : dexisyp 코키즈펜시럽
바쁠테 찾아보려니 잘 안보여서 적어놓을게요

2017.02.06. 21:55 답글쓰기

천대표 작성자

바탕화면 소아 약 용량보다 이 글이 우선입니다~

2017.05.08. 20:10 답글쓰기

전태식

넵

2017.05.08. 20:57 답글쓰기

천대표 작성자

코데날은 12세 미만 사용금지가 되어 co2는 삭제했습니다.
알약먹는 애들중 11세까지는 co도 내지 마세요.

2018.04.01. 21:25 답글쓰기

유성우

댓글을 남겨보세요

등록