최근 유행하는 백일해 요약

유성우
2024.10.01. 13:09 조회 96

댓글 1 URL 복사

우리는 확진검사 안하니 a379 상세불명의 백일해, j170-8 백일해 폐렴 같은 상병 대신 일반적인 호흡기 질환 상병을 씀
백일해 상병 넣으면 2급 전염병이라 신고해야 함.

치료는 clarisy 7일 (성인은 clari2 500mg짜리로)

격리는 anti 복용 시작일부터 5일 간, 치료 안했으면 3주

예방요법은 치료와 동일

예방접종 영유아 접촉하는 사람들(27~36주 임산부와 가족, 의료기관 종사자 등) : 접촉 2주 전 Tdap 접종

<기타 내용들>

1. 최근 10년 간 환자보다 2024년이 더 많음 (평균 70 vs 9월까지 22000명대)

2. 예접 6세까지 DTaP 5회, 12세 Tdap으로 마무리, 10년마다 Td or Tdap
영유아 접촉하는 사람들(27~36주 임산부와 가족, 의료기관 종사자 등) : 2주 전 Tdap 접종

3. 카타르기 - 1-2주 전염성 높고 약한 상기도 증상
발작기 - 발작성 기침, whooping cough, 기침 후 구토, 최근 확진 환자는 가벼운 기침도 많음
회복기 - 2-3주 후 기침 소실

백일해 기침 소리 #백일해 #백일해기침소리 #백일해기침 #pertussis #whoopingcough (youtube.com)

백일해 기침 소리 #백일해 #백일해기침소리 #백일해기침 #pertussis #whoopingco
몸편맘편 황닥 DoctorH

다음에서 보기:

4. 치료

○ 백일해 치료 항생제 요법(노출 후 예방적 요법도 동일)

연령	권장 항생제		대체 항생제*
	Azithromycin	Clarithromycin	TMP-SMX
1개월미만	1일 10mg/kg 1회 용량으로 **5일 간 투여**	-	2개월까지 사용불가
1~5개월		1일 15mg/kg 용량을 2회 분할하여 **7일 간 투여**	2개월 이상 연령에서 1일 TMP는 8mg/kg, SMX는 40mg/kg 용량을 2회 분할하여 **14일 간 투여**
6개월 이상 소아	첫날 10mg/kg 용량을 1회 투여(1일 최대 용량; 500mg)후 2일부터 5mg/kg 용량을 1회 용량(1일 최대 용량; 250mg)으로 **5일 간 투여**	1일 15mg/kg 용량 (1일 최대 용량; 1g)을 2회 분할하여 **7일 간 투여**	
청소년 및 성인	첫 날 500mg 투여 후 2일부터 1일 250mg을 **5일 간 투여**	1일 1g 용량을 2회 분할하여 **7일 간 투여**	1일 TMP는 200mg, SMX는 1,600mg 용량을 2회 분할하여 **14일 간 투여**

5. 예방요법

대상 : 백일해 환자와 3주 이내 접촉 + 12개월 미만 or 영유아 지속적으로 접촉해야 하는 사람

용량, 기간은 치료와 동일

erythromycin은 14일

등록순 최신순

클린봇

주현우

감사합니다

2024.10.01. 15:44 답글쓰기

유성우

댓글을 남겨보세요

등록