Example 1

$p = a \leftrightarrow (b \wedge c)$

	a	b	c	p	p_a	p_b	p_c
1	T	T	T	T	T	T	T
2	T	T	F	F	T	F	T
3	T	F	T	F	T	T	F
4	T	F	F	F	T	F	F
5	F	T	T	F	T	T	T
6	F	T	F	T	T	F	T
7	F	F	T	T	T	T	F
8	F	F	F	T	T	F	F

- Conditions under which each of the clauses determines p
  - p_a:
  - p_b:
  - p_c:

- All pairs of rows satisfying CACC
  - a:
  - b:
  - c:
- All pairs of rows satisfying RACC
  - a:
  - b:
  - c:
- GICC
  - a:
  - b:
  - c:
- RICC
  - a:
  - b:
  - c:

KAIST

Example 2

$p = a \vee (b \wedge c)$

	a	b	c	p	p_a	p_b	p_c
1	T	T	T	T	F	F	F
2	T	T	F	T	T	F	F
3	T	F	T	T	T	F	F
4	T	F	F	T	T	F	F
5	F	T	T	T	F	T	T
6	F	T	F	F	T	F	T
7	F	F	T	F	T	T	F
8	F	F	F	F	T	F	F

- Conditions under which each of the clauses determines p
  - p_a:
  - p_b:
  - p_c:

- All pairs of rows satisfying CACC
  - a:
  - b:
  - c:
- All pairs of rows satisfying RACC
  - a:
  - b:
  - c:
- GICC
  - a:
  - b:
  - c:
- RICC
  - a:
  - b:
  - c:

KAIST