

I. Multiples et diviseurs

Définition: si a, b, c sont trois nombres entiers tels que $a=b\times c$ alors
on dit que a est un de b et de c
et
on dit que b et c sont des de a

Exemples :
> Liste des diviseurs de 12 :

> Liste des multiples de 12 :

Remarque : chaque entier non nul a une infinité de
et un nombre fini de

>Liste des multiples de 7 compris entre 75 et 100 :

Exercice 1

- 1) Donner la liste des multiples de 13 compris entre 700 et 800
- 2) 65 est-il multiple de 13 ? Justifier !
- 3) Donner la liste des diviseurs de 13 :

Définition : un nombre *premier* est un entier qui a exactement deux diviseurs.
Par exemple : 2,3, 5, 7, 11... sont des nombres premiers

Vocabulaire : un nombre **composé** est un entier qui n'est pas premier.
On peut donc le « décomposer » en produit de deux entiers inférieurs.

Ex : $15=... \times ...$

Liste des nombres premiers inférieurs à 100

On utilise la méthode du « crible d'Eratostène » :
Parmi tous les entiers de 2 à 100, on élimine tous ceux qui sont composés :
il ne reste donc que les nombres premiers.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Exercice 2

- 1) Décomposer au maximum les nombres entiers suivants :

 $7000=... \times ...$

 $297=... \times ...$

2) En déduire la liste de TOUS les diviseurs de 297

3) Déterminer la liste de tous les diviseurs de 7000

Méthode pour tester si un nombre est premier

Exemple : Tester si le nombre 397 est premier
> on teste si 397 admet un diviseur autre que 1 et 397

Puisque $\sqrt{397} \approx 19,9$ il suffit de tester les diviseurs inférieurs à . . .

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Plus généralement, pour tester si un entier N est premier :

- calculer \sqrt{N}
- pour chaque nombre premier p entre 2 et \sqrt{N} : diviser N par p
 - si le résultat est entier \rightarrow N est composé : il est multiple de p !
- si N n'est multiple d'aucun des entiers p , alors il est premier.

Exercice 3: les entiers suivants sont premiers ?
- si oui : justifier
- sinon : les décomposer « au maximum »
a = 999 b = 733 c = 1492

Propriété : tout nombre entier $n \geq 2$ s'écrit comme produit de nombres premiers $n = p_1^{n_1} \times p_2^{n_2} \times \dots \times p_k^{n_k}$
avec p_1, p_2, \dots, p_k premiers et n_1, n_2, \dots, n_k entiers

Exercice 4
1) Décomposer en produit de facteurs premiers le nombre N = 350
2) En déduire la liste des diviseurs de 350.

Exercice 5
1) Donner la liste des diviseurs de 60
2) Donner la liste des diviseurs de 150
3) Déterminer le plus grand diviseur commun de 60 et 150

II. Plus grand diviseur commun

1. Définition

On note $\text{PGCD}(a; b)$ le Plus Grand Commun Diviseur de deux entiers a et b .

Exemple :

Les diviseurs de 60 sont : 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60

Les diviseurs de 150 sont : 1 2 3 5 6 10 15 25 30 50 75 150

Les diviseurs communs à 60 et 150 sont donc : 1 2 3 5 6

donc : $\text{PGCD}(60; 150) = \dots$

2. Recherche du pgcd avec les diviseurs premiers

si on connaît la décomposition en produit de facteurs premiers de deux entiers a et b , il est facile de trouver celle de leur pgcd.

Exemple : $a = 294\,000 = 2^4 \times 3^1 \times 5^3 \times 7^2$

et $b = 118\,300 = 2^2 \times 5^5 \times 7^1 \times 13^2$

Un diviseur d commun à a et b aura une décomposition de la forme
 $d = 2^{n_1} \times 5^{n_2} \times 7^{n_3}$

→ calcul de n_1 : pour que 2^{n_1} divise a et b , on doit avoir :

$n_1 = \dots$ ou $n_1 = \dots$ ou $n_1 = \dots$

Pour que d soit le plus grand possible, il faut que $n_1 = \dots$.

→ pour chaque diviseur premier commun à a et b , on conserve **le plus petit des deux exposants** correspondant à ce nombre premier dans la décomposition de a et dans celle de b .

On a donc dans cet exemple :

$$d = \text{pgcd}(2^4 \times 3^1 \times 5^3 \times 7^2; 2^2 \times 5^5 \times 7^1 \times 13^2) = 2^{\dots} \times 3^{\dots} \times 5^{\dots} \times 7^{\dots} \times 13^{\dots} = 3500$$

Exercice 6

1) Décomposer chaque entier en produit de facteurs premiers

$a = 13000$

$b = 2100$

$c = 2015$

$d = 2016$

2) En déduire :

a) $\text{PGCD}(13000; 2015)$

b) $\text{PGCD}(2100; 2016)$

3. Division euclidienne

Propriété et définition :

soit a et b deux entiers naturels.

Il existe un unique entier q et un unique entier r tels que :

$$a = b \times q + r \text{ et } 0 \leq r < b$$

On dit alors que : q est le et r le de la **division euclidienne** de a par b

Remarque 1 : à la calculatrice, $99/5 = 19,8$

donc le quotient entier de 99 par 5 est

Pour calculer le reste, il suffit d'effectuer

$$99 - 5 \times 19 = 4 \text{ ou } 0,8 \times 5 = 4$$

Remarque 2 : en python, on peut calculer

le quotient entier de 99 par 5 :

le reste de 99 dans la division par 5 :

Exercice 7

Dans chaque cas, poser la division euclidienne de a par b , puis l'écrire « en ligne » sous forme $a = b \times q + r$.

1) $a = 2000$ et $b = 3$

2) $a = 2000$ et $b = 5$

3) $a = 78$ et $b = 83$

4. Calcul du pgcd de deux entiers : algorithme d'Euclide

Cet algorithme repose sur le fait qu'un diviseur d commun à a et b divise aussi le reste r de la division euclidienne de a par b .

On a donc : $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(b; r)$

On itère le procédé jusqu'à ce que le reste r soit nul.

Le dernier reste non nul est le pgcd de a et b .

Exemple : cherchons pgcd (492 ; 42)

On calcule les restes successifs des divisions euclidiennes :

a	b	r
492	42	

Le dernier reste non nul est le pgcd de a et b donc **pgcd(492 ; 42)=...**

Exercice 8

Calculer les pgcd suivants avec l'algorithme d'euclide :

a) pgcd(1234 ; 21)

b) pgcd(156 ; 516)

c) pgcd(1365 ; 858)

Exercice 9 : algorithmique.

Écrire un algorithme qui lit deux entiers a et b, puis calcule leur pgcd avec l'algorithme d'Euclide.

Coder cet algorithme en python.

Algorithme

Variables

a, b, r de type entier

début

fin

programme en python

```
# pgcd avec l'algorithme d'Euclide

a = . . .
b = . . .

while . . .
```

un premier exemple de fonction en python

```
def pgcd(a, b) :
```

III. Nombre premiers entre eux

Définition : deux entiers naturels a et b sont *premiers entre eux* si $PGCD(a,b)=1$.

Cela signifie que deux nombre premiers entre eux n'ont aucun diviseur commun (sauf ...)

Exemple :
 $pgcd(1234 ; 21)=1$ donc ...

$pgcd(516 ; 156) = 12$ donc ...

Remarque : ne pas confondre « premier » (au singulier) avec « premiers entre eux » ou « premier avec... » (au pluriel)

Exercice 10 VRAI ou FAUX ?

- a) 7 est premier
- b) 21 est premier
- c) 21 et 25 sont premiers entre eux
- d) 21 et 25 sont premiers
- e) 7 est premier avec 21

Exercice 11

Les entiers suivants sont-ils premiers entre eux ?

- a) 123456 et 122
- b) 111 et 370
- c) 17 et 2000

IV. Congruences

Quelques calculs pour commencer

0	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62
63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76
77	78	79	80	81	82	83
84	85	86	87	88	89	90

Si on poursuit le tableau , dans quelle colonne seront rangés les nombres suivants ?

$$A=85+ 67$$

$$B=79\times 73$$

$$C=15^8$$

$$D=2^{10}$$

IV. Congruences

1. Définition

Déf : Soit n un entier naturel non nul. On dit que deux entiers a et b sont **congrus modulo n** et on note $a \equiv b[n]$ si a et b ont même reste dans la division euclidienne par n .

Exemple 1 : congruences modulo 7

$$\begin{array}{r|l} 15 & 7 \\ & 2 \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{r|l} 365 & 7 \\ & 52 \end{array}$$

15 et 365 ont même reste : 1, dans la division euclidienne par 7 donc $365 \equiv 15[7]$

Remarque : travailler avec des congruences modulo 7 revient à ranger tous les entiers en 7 colonnes (numérotées de ... à ...)

Deux nombres sont congrus modulo 7 s'ils sont situés dans la même colonne !

Exemple 2 : $\begin{array}{r|l} 63 & 7 \\ 0 & 9 \end{array}$ donc $63 = 7 \times \dots + \dots$ et donc $63 \equiv \dots[\dots]$
autrement dit « 63 est multiple de 7 »

A retenir:

→ si $a = n \times k + r$ (avec k et r entiers) alors : $a \equiv r[n]$

→ $a \equiv 0[n]$ signifie que ...

2. Propriétés

Les congruences modulo n sont compatibles avec l'addition et la multiplication.

Théorème (admis) les congruences sont compatibles avec l'addition et la multiplication.

Si a, a', b, b' sont des entiers tels que $a \equiv a'[n]$ et $b \equiv b'[n]$ alors

$$a + b \equiv a' + b'[n]$$

$$a \times b \equiv a' \times b'[n]$$

$$a^k \equiv a'^k[n].$$

Exemple 3 : $365 \equiv 1[7]$ donc $366 \equiv \dots[7]$

application : quel jour de la semaine serons-nous dans 4 ans ?

Nombre de jours dans une durée de 4 ans :

Exemple 4 : $10 = 7 \times 1 + 3$ donc $10 \equiv 3[7]$

en élevant au carré : $10^2 \equiv \dots[7]$ donc $100 \equiv \dots[7]$

et puisque $9 \equiv \dots[7]$ on a donc aussi $100 \equiv \dots[7]$

$1000 = 10 \times 100 \equiv \dots \times \dots[7]$ donc $1000 \equiv 6[7]$

Application : réduire 1789 modulo 7

$$1789 = 1 \times 1000 + 7 \times 100 + 8 \times 10 + 9 \text{ donc}$$

$$1789 \equiv 1 \times \dots + \dots \times \dots + \dots \times \dots + \dots[7]$$

$1789 \equiv \dots[7]$ ce qui signifie que 1789 et ... ont le même reste dans la division euclidienne par 7 : ce reste vaut ...

3. Utilisation : critère de divisibilité par 9

Soit N un nombre de quatre chiffres en base 10 : $N = abcd_{(10)}$

$$N = a \times \dots + b \times \dots + c \times \dots + d = \dots \times 10^3 + \dots \times 10^2 + \dots \times 10^1 + \dots$$

Réduire modulo 9 : $10 \equiv \dots[9]$

$$10^2 \equiv \dots[9]$$

$$10^3 \equiv \dots[9]$$

donc $N \equiv \dots[9]$

Conclusion : N et ... ont le même reste dans la division euclidienne par 9.

Pour tester si N est multiple de 9, il suffit donc d'ajouter tous ses chiffres, et de tester si la somme est multiple de 9.

Remarque : le même principe fonctionne aussi pour les multiples de 3.

Exercice 12

Si, aujourd'hui, nous sommes vendredi, quel jour de la semaine serons-nous dans 100 jours ? Et dans 1000 jours ?

Exercice 13 Vrai ou Faux ? Justifier.

a) $57 \equiv 30 [8]$ b) $111 \equiv 36 [5]$

c) $2014 \equiv 75 [7]$

d) $2014 \equiv 5 [7]$

Exercice 14

Compléter avec un entier convenable les congruences suivantes :

$8 \equiv \dots [10] \quad 122 \equiv \dots [10] \quad 453 \equiv \dots [10] \quad 1400 \equiv \dots [10]$

$17 \equiv \dots [7] \quad 28 \equiv \dots [7] \quad 155 \equiv \dots [7] \quad 852 \equiv \dots [7]$

Exercice 15

1) Trouver quatre entiers **différents** pour compléter

$87 \equiv \dots [5] \quad 87 \equiv \dots [5]$

$87 \equiv \dots [5] \quad 87 \equiv \dots [5]$

2) Comment peut-on décrire tous les entiers b tels que $87 \equiv b [5]$?

Exercice 16

1) Établir que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $10^n \equiv 1 [3]$

2) Soit $N = 4 \times 10^4 + 7 \times 10^3 + 2 \times 10^2 + 1 \times 10^1 + 5 \times 10^0$

a) Donner l'écriture décimale de N

b) Quel est le reste de la division euclidienne de N par 3 ?

Exercice 17

Donner les restes de la division euclidienne des nombres suivants par 7 :

$a = 50$

$b = 50^{100}$

$c = 100$

$d = 100^2$

$e = 50^{100} + 100 + 100^2$

Exercice 18

quel est le reste de la division par 17 des nombres suivants : (justifier !)

200

200^2

200^3

200^4

Suivant les valeurs de $n \in \mathbb{N}$, quel est le reste de la division de 200^n par 17 ?

En déduire le reste la division de 200^{2013} par 17.

Exercice 19

Sachant que $n \equiv 3 [5]$, montrer que $2n^2 - n$ est un multiple de 5.

Exercice 20 : Application aux billets de banque

Sur les billets de banque en euros figure un nombre de 11 chiffres décimaux précédé d'une lettre. En remplaçant cette lettre par son rang dans l'alphabet (de 1 à 26), on obtient ainsi un nombre de 12 ou 13 chiffres.

Le billet ne peut être authentique que si le reste de ce nombre dans la division par 9 vaut 8.

1. Les billets portant les numéros U57794585675 et S00212913867 peuvent-ils être authentiques ?
2. Un billet authentique porte le numéro T2303557409x (il y a une tache sur le dernier chiffre). Que vaut x ?
3. Le nombre figurant sur un billet authentique est 16122340243 mais la lettre est effacée. Quelle peut-être cette lettre ?