

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»**

Кафедра информационных систем и программирования

## **ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА**

Методические указания по выполнению лабораторных работ  
для студентов всех форм обучения  
направления 09.03.03 Прикладная информатика

Краснодар  
2019

Составитель: д.ф.-м.н., проф. В.М. Трофимов

**Дискретная математика:** методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов всех форм обучения направления 09.03.03 Прикладная информатика / Сост.: В.М. Трофимов; Кубан. гос. технол. ун-т. Каф. информационных систем и программирования.– Краснодар, 2019 – 33 с.

Составлены в соответствии с рабочей программой курса «Дискретная математика» для студентов всех форм обучения направления 09.03.03 Прикладная информатика.

Содержат описание лабораторных работ, методические указания к их выполнению и требования к оформлению отчёта.

Табл.2, Ил.18, Библиогр.: 5 назв.

Рецензенты: д-р техн. наук, проф. каф. ИСП В.Н. Марков  
канд. техн. наук, доц каф. ИСП А.Г. Мурлин

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1 Лабораторные работы.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Список литературы.....</b>	<b>32</b>
<b>3 Перечень программного обеспечения.....</b>	<b>33</b>
<b>4 Приложение 1 (оформление титульной страницы).....</b>	<b>34</b>

Таблица 1

№ разде	Наименование лабораторной работы и её содержание	Кол-во часов	Заочная форма
1	<i>ЛР №1. Множества и доказательства</i>	6	
1	<b><i>ЛР №2. Подсчёты мощности множеств</i></b>	<b>4</b>	
2	<i>ЛР №3. Отношения и функции</i>	4	
2	<i>ЛР №4. Транзитивные замыкания</i>	4	
3	<i>ЛР №5. Комбинации без повторений</i>	4	
3	<i>ЛР №6. Комбинации с повторениями</i>	4	
4	<i>ЛР №7. Представление графов</i>	4	
4	<i>ЛР №8. Обход графов в глубину и в ширину</i>	4	
4	<i>ЛР №9. Связность в графах</i>	4	
4	<i>ЛР №10. Циклы и контуры в графах</i>	4	
4	<i>ЛР №11. Ориентированные графы</i>	4	
4	<i>ЛР №12. Взвешенные графы</i>	2	
4	<i>ЛР №13. Потoki в сетях</i>	2	
5	<i>ЛР №14. Математическая логика.</i>	4	
	Итого:	54	

# 1 Лабораторные работы (отчёты могут приниматься в электронном виде)

## 1.1 Лабораторная работа №1 – Множества и доказательства Цель работы

Научиться работать с множествами, осуществлять операции над ними.

Задания:

1. Пусть  $X$  — множество всех студентов университета. Пусть  $A$  — множество студентов первого года обучения,  $B$  — множество студентов второго года обучения,  $C$  — множество студентов, изучающих дискретную математику,  $D$  — множество студентов, специализирующихся в международных отношениях,  $E$  — множество студентов, побывавших на концерте в понедельник вечером, а  $F$  — множество студентов, которые во вторник занимались до двух часов дня. Используя обозначения теории множеств, опишите следующие множества студентов.

(a) Все студенты второго года обучения, изучающие дискретную математику.

**Пример решения.**  $\{x \in X : x \in B \text{ и } x \in C\}$ .

(b) Все студенты первого года обучения, которые во вторник занимались до двух часов дня.

(c) Все студенты, специализирующиеся в международных отношениях, которые в понедельник вечером побывали на концерте.

(d) Все студенты второго года обучения, которые во вторник занимались до двух часов дня и не специализируются в международных отношениях.

(e) Все студенты первого и второго годов обучения, которые не ходили в понедельник вечером на концерт, но которые специализируются в международных отношениях.

(f) Все студенты, которые обучаются первый год и специализируются в международных отношениях, или которые во вторник занимались до двух часов дня.

2. Найдите, по крайней мере, два способа заменить многоточия в данных описаниях множеств.

**Пример решения:**  $\{2, 4, \dots, 12\}$  можно записать как  $\{2n: 1 \leq n \leq 6 \text{ и } n \in \mathbb{N}\}$  или  $\{n + 1: n \in \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}\}$ .

(a)  $\{1, 3, \dots, 31\}$ . (b)  $\{1, 2, \dots, 26\}$ . (c)  $\{2, 5, \dots, 32\}$ .

3. Приведите три описания элементов множества  $\{2, 5, 8, 11, 14\}$ .

4. Сколько элементов содержит каждое из следующих множеств?

(a)  $A = \emptyset$ .

(b)  $B = \{\emptyset\}$ . **Пример решения:** множество  $B$  содержит один элемент.

(c)  $C = \{\{0, 1\}, \{1, 2\}\}$ .

(d)  $D = \{0, 1, 2, \{0, 1\}, \{1, 2\}, \{0, 1, 2\}, A\}$ .

(e)  $E = \{0, \{\{1, \{3, 5\}, \{4, 5, 7\}, 8\}\}\}$ .

5. Какие из следующих пар множеств равны? Для каждой пары неравных множеств найдите элемент, который входит в одно множество, и не входит в другое.

(a)  $\{0, 1, 2\}$  и  $\{0, 0, 1, 2, 2, 1\}$ .

(b)  $\{0, 1, 3, \{1, 2\}\}$  и  $\{0, 1, 2, \{2, 3\}\}$ .

(c)  $\{\{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}, \{5, 5, 1, 3\}\}$  и  $\{\{3, 5, 1\}, \{6, 4, 4, 4, 2\}, \{2, 4, 4, 2, 6\}\}$ .

(d)  $\{\{5, 3, 5, 1, 5\}, \{2, 4, 6\}, \{5, 1, 3, 3\}\}$  и  $\{\{1, 3, 5, 1\}, \{6, 4, 2\}, \{6, 6, 4, 4, 6\}\}$ .  
**Пример решения:** эти множества равны, так как содержат одинаковые элементы

(e)  $\emptyset$  и  $\{x \in \mathbb{N}: x > 1 \text{ и } x^2 = x\}$ .

(f)  $\emptyset$  и  $\{\emptyset\}$ .

6. В этой задаче речь идет о следующих множествах:

$A = \{0, 2, 4, 6\}$      $B = \{1, 3, 5\}$      $C = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ ,

$D = \emptyset$      $E = \mathbb{N}$      $F = \{\{0, 2, 4, 6\}\}$ .

(a) Перечислите подмножества множества  $A$ .

(b) Перечислите подмножества множества  $B$ .  
**Пример решения:** подмножествами множества  $B$  будут  $\{1\}$ ,  $\{2\}$ ,  $\{3\}$ ,  $\{1, 2\}$ ,  $\{1, 3\}$ ,  $\{2, 3\}$ ,  $\{1, 2, 3\}$ ,  $\{\emptyset\}$ .

(c) Перечислите подмножества множества  $C$ .

(d) Перечислите подмножества множества  $D$ .

(e) Перечислите подмножества множества E.

(f) Перечислите подмножества множества F.

7. Пусть  $A = \{n: n \in \mathbb{N} \text{ и } n = 2k + 1 \text{ для некоторого } k \in \mathbb{N}\}$ ,  $B = \{n: n \in \mathbb{N} \text{ и } n = 4k + 1 \text{ для некоторого } k \in \mathbb{N}\}$  и  $C = \{m \in \mathbb{N}: m = 2k - 1 \text{ и } k \in \mathbb{N} \text{ и } k \geq 1\}$ . Докажите следующие утверждения.

(a)  $35 \in A$ .

(b)  $35 \in C$ .

(c)  $35 \notin B$ .

**Пример решения:** число 35 не принадлежит множеству B, потому что для равенства  $35 = 4k + 1$  нельзя найти натуральное число  $k$ .

(d)  $A = C$ . (e)  $B \subseteq A$ . (f)  $B \subseteq C$ . (g)  $B \subset A$ . (h)  $B \subset C$ .

8. Пусть  $A = \{n: n \in \mathbb{N} \text{ и } n = 3k + 2 \text{ для некоторого } k \in \mathbb{N}\}$ ,  $B = \{n: n \in \mathbb{N} \text{ и } n = 5k - 1 \text{ для некоторого } k \in \mathbb{N} \text{ такого, что } k \geq 5\}$  и  $C = \{m \in \mathbb{N}: m = 6k - 4 \text{ и } k \in \mathbb{N} \text{ и } k \geq 1\}$ . Докажите следующие утверждения.

(a)  $C \subseteq A$ .

(b)  $A \neq B$ .

(c)  $B \neq C$ .

(d)  $A \neq C$ .

(e)  $C \subset A$ .

9. Расскажите, чем отличаются множества  $\emptyset$  и  $\{\emptyset\}$ .

10. Пусть A, B и C — некоторые множества.

(a) Докажите, что если  $A \subset B$  и  $B \subseteq C$ , то  $A \subset C$ .

(b) Докажите, что если  $A \subseteq B$  и  $B \subset C$ , то  $A \subset C$ .

(c) Докажите, что если  $A \subseteq B$  и  $A \subsetneq C$ , то  $B \subsetneq C$ .

### Задания: Множества, шаблоны доказательств.

1. Пусть  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ,  $B = \{2, 3, 6, 8\}$  и  $C = \{3, 5, 4, 8, 2\}$ .

Найдите выписанные множества:

(a)  $B \cup C$ .

(b)  $B \cap C$ .

**Пример решения:**

$B \cap C = \{2, 8\}$

(c)  $B - C$ .

(d)  $A - B$ .

(e)  $A - C$ .

**Пример решения:**  $A - C = \{1, 6, 7, 9, 10\}$

2. Пусть  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ,  $A = \{0, 1, 2, 3\}$ ,  $B = \{0, 2, 4\}$  и  $C = \{0, 3, 6, 9\}$ .

(a) Найдите  $A \cup B$ ,  $A \cap B$ ,  $\overline{A}$ ,  $\overline{(A \cap B)}$  и  $(B \cup C) - A$ .

(b) Найдите  $P(A)$ ,  $P(B)$ ,  $P(A \cap B)$ ,  $P(A) \cap P(B)$ .

(c) Верно ли, что  $P(A \cup B) = P(A) \cup P(B)$ ? Объясните ваш ответ.

(d) Почему не имеет смысла запись  $\overline{P(A)}$ ?

3. Пусть  $A = \{0, 3\}$ ,  $B = \{x, y, z\}$ . Найдите выписанные множества:

- (a)  $A \times B$  (b)  $A \times A \times B$ . (c)  $B \times A$ . (d)  $B \times A \times B$ . (e)  $B \times B \times A$ .
- Пример решения:**  $\{(0,x), (0,y), (0,z), (3,x), (3,y), (3,z)\}$

4. Пусть  $X = \{2, 4\}$ ,  $Y = \{1, 4\}$  и  $Z = \{0, 4, 8\}$ . Постройте следующие множества:

- (a)  $X \times Y$ . (b)  $X \times Y \times Z$ . (c)  $Y \times Z$ . (d)  $Z \times Y \times X$ . (e)  $Z \times X \times Y$ .

5. Найдите три множества  $A$ ,  $B$ , и  $C$  такие, что  $A \subseteq B \cup C$ , но  $A \not\subseteq B$  и  $A \not\subseteq C$ .

6. Пусть  $A = \{1, 2, \{\{1, 2\}\}\}$ .

- (a) Сколько элементов входит в  $A$ ? Сколько элементов входит в  $P(A)$ ?  
Сколько элементов входит в  $P(P(A))$ ?

В пунктах (b)–(m) выясните, верно ли каждое из утверждений, и, если оно не верно, объясните почему.

- (b)  $1 \in A$ . (c)  $\{1, 2\} \in A$ . (d)  $\{\{1, 2\}\} \in A$ .  
(e)  $\emptyset \in A$ . (f)  $1 \in P(A)$ . (g)  $\{1, 2\} \in P(A)$ .  
(h)  $\{\{1, 2\}\} \in P(A)$ . (i)  $\emptyset \in P(A)$ . (j)  $1 \in P(P(A))$ .  
(k)  $\{1, 2\} \in P(P(A))$ . (l)  $\{\{1, 2\}\} \in P(P(A))$ . (m)  $\emptyset \in P(P(A))$ .

7. Какие из следующих утверждений верны? Докажите каждое из верных утверждений. Опровергните каждое неверное утверждение, подобрав контрпример.

- (a) Множества  $A$  и  $B$  не пересекаются тогда и только тогда, когда не пересекаются множества  $B$  и  $A$ . (Будьте внимательны, читая утверждение, –порядок, в котором перечислены множества, может играть роль! )  
(b) Множества  $A \cup B$  и  $C$  не пересекаются тогда и только тогда, когда верны оба следующих утверждения: (i)  $A$  и  $C$  не пересекаются, и (ii)  $B$  и  $C$  не пересекаются.  
(c) Множества  $A \cap B$  и  $C$  не пересекаются тогда и только тогда, когда верны оба следующих утверждения: (i)  $A$  и  $C$  не пересекаются, и (ii)  $B$  и  $C$  не пересекаются.  
(d) Множества  $A \cup B$  и  $C$  не пересекаются тогда и только тогда, когда хотя бы одно из следующих утверждения: (i)  $A$  и  $C$  не пересекаются, и (ii)  $B$  и  $C$  не пересекаются.

- (e) Множества  $A \cap B$  и  $C$  не пересекаются тогда и только тогда, когда хотя бы одно из следующих утверждений: (i)  $A$  и  $C$  не пересекаются, и (ii)  $B$  и  $C$  не пересекаются.
- (f) Пусть  $U$  – универсальное множество,  $A, B \subseteq U$ . Множества  $A$  и  $B$  не пересекаются тогда и только тогда, когда  $\bar{A}$  и  $\bar{B}$  не пересекаются.
8. В пунктах (a) и (b) докажите сформулированные утверждения. В пунктах (c) и (d) приведите контрпримеры, опровергающие эти утверждения.
- (a)  $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$ . (b)  $A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$ .
- (c)  $(A \cap B) \oplus (C \cap D) \subseteq (A \oplus C) \cap (B \oplus D)$ . (d)  $(A \cup B) \oplus (C \cup D) \subseteq (A \cup C) \oplus (B \cup D)$
9. Даны четыре произвольных целых числа  $x_1, x_2, x_3$  и  $x_4$ , ни одно из которых не четно и не кратно пяти. Докажите, что некоторое последовательное произведение этих целых чисел оканчивается цифрой 1. В последовательное произведение входит один, или два, или три, или все четыре множителя подряд, причем в том порядке, в котором они перечислены в списке  $x_1, x_2, x_3, x_4$ .

(Указание: Воспользуйтесь разбором случаев).

#### Контрольные вопросы

- Какие существуют способы описания множеств?
- Как можно определить понятие множества и подмножества?
- Что такое пустое множество?



## 1.2 Лабораторная работа №2 – Подсчеты мощности множеств

Цель работы:

Научиться подсчитывать мощность множеств, опираясь на основную теорему подсчёта мощности и принцип включения - исключения.

### Задания

1. В группе из 35 студентов все биологи или блондины, и других нет. Биологов среди них 27, а блондинов 21. Сколько биологов – блондины?  
**Пример решения:** воспользуемся правилом включения- исключения; пусть  $A$  – множество биологов, а  $B$  – множество блондинов. Тогда  $35 = |A| + |B| - |A \cap B|$ . Подставляя в формулу  $|A|=27$  и  $|B| = 21$ , получаем: число биологов-блондинов равно  $|A \cap B| = 27 + 21 - 35 = 13$ .
2. В группе режиссуры 33 студента любят фильмы Хичкока, 21 студент любит фильмы Спилберга и 17 студентов любят фильмы обоих режиссеров. Сколько студентов в этой группе, если каждый из них попал в какую-нибудь категорию?
3. В теннисном лагере 39 игроков. Из них 25 человек левши, 22 человека бьют с задней линии двумя руками, и других нет. Сколько левшей бьют с задней линии двумя руками?
4. Руководству факультета иностранных языков нужно было узнать, сколько из 2000 студентов университета не изучают ни одного иностранного языка. Объединив данные по классам, выяснили, сколько студентов изучают французский, немецкий и испанский языки в том или ином сочетании. Эти данные отражены в следующей таблице 2:

Таблица 2

Языки	Число студентов
Французский	75
Немецкий	68
Испанский	199
Французский и немецкий	32
Французский и испанский	41
Немецкий и испанский	11
Французский, немецкий и испанский	7

Сколько студентов не изучают ни одного иностранного языка?

5. Сколько целых чисел от 500 и 10 000 делятся на 5 или на 7?  
**Пример решения:** пусть множество  $A$  – делящиеся на 5 числа, видно

что их  $10\,000/5 - 500/5 = 2000 - 100 = 1900$ . Пусть  $B$  – множество делящихся на 7 : возьмём целую часть от делений  $10\,000/7 - 500/7 = 1428 - 71 = 1357$ . Из суммы мощностей этих множеств вычтем количество чисел, делящихся на 35. Найдём количество чисел, делящихся на 35:  $10\,000/35 - 500/35 = 285 - 14 = 271$ . Значит ответ будет:  $1900 + 1357 - 271 = 2986$ .

6. (a) Сколько чисел от 1 до 70 000 000, включая эти два числа, делятся на 2, 5 или 7?  
 (b) Сколько чисел от 1 до 6 000 000, включая оба эти числа, делятся на 4, 5 или 6?
7. Выясните, сколько чисел от 1 до 21 000 000 000, включая оба этих числа, делятся на 2, 3, 5 или 7.
8. Сколько чисел от 1 до 21 000 000 000, включая оба этих числа, не делятся на 2, 3 или 5, но *не делятся* на 7?
9. Выясните, сколько целых чисел от 1 до 1000, включая оба этих числа, не делятся хотя бы на одно из чисел 5, 6 или 8.

#### Контрольные вопросы

- В чем заключён смысл теоремы основной теоремы о подсчете мощности множества?
- Сформулируйте принцип включения – исключения для двух, трёх и  $n$  множеств?
- Как связаны теоремы о подсчёте с диаграммами Венна?

### 1.3 Лабораторная работа №3 – Отношения и функции

#### Цель работы

На основе использования понятия бинарного отношения научиться использовать методы анализа отношений и функций, овладеть навыками нахождения обратных отношений и композиции отношений, сюръекции и инъекции, анализа функций, различных способов описания функций.

#### Задание:

1. Для людей из генеалогического дерева (по предложенной схеме), построить таблицы из следующих отношений:

- (a) IsAncestorOf
- (b) IsDescendentOf
- (c) IsSiblingOf
- (d) IsCousinOf

#### Примеры решений:

1.

Mary = John

Peter=Elaine Maude=Harold

George Elizabeth

1. (a)

IsAncestorOf Elaine George Mary George John George Peter George  
Harold Elizabeth Maude Elizabeth Mary Elizabeth John Elizabeth Mary Elaine  
John Elaine Mary Maude John Maude

1. (b)

IsDescendentOf George Mary George John George Peter George Elaine  
Maude Mary Maude John Elizabeth Maude Elizabeth Harold Elizabeth Mary  
Elizabeth John Elaine Mary Elaine John

1. (c)

IsSiblingOf Elaine Maude Maude Elaine

1. (d)

IsCousinOf George Elizabeth Elizabeth George

Задание:

2. Определите элементы в каждом из следующих отношений определённых на множестве  $R$ :

- (a)  $(x,y) \in R$  если и только если  $x + 1 < y$ ;
- (b)  $(x,y) \in R$  если и только если  $y < 0$  or  $2x \leq 3$ ;
- (c)  $(x,y,z) \in R$  если и только если  $x^2 + y = z$ .

#### Задание с решениями (для англоязычных студентов):

3. Let  $A = \{1,2,3,...,10\}$ . Let  $R = \{(1, 2), (1, 4), (1, 6), (1, 8), (1, 10), (3, 5), (3, 7), (4, 6), (6, 8), (7, 10)\}$  be a relation on  $A$ . Let  $S = \{(2,4),(3,6),(5,7), (7,9),(8,10),(8,9),(8,8),(9,9),(3,8),(4,9)\}$  be a second relation on  $A$ . Find:

- (a)  $R \circ S$ ;
- (b)  $S \circ R$ .

3. (a)  $\{(2,6),(3,8),(5,10)\}$   
 3. (b)  $\{(1,4),(1,9),(1,10),(1,8),(3,7),(3,9),(6,10),(6,9),(6,8)\}$

**Задание с решениями** (для англоязычных студентов):

4. Let  $R, S$  and  $T$  be binary relations on a set  $X$ .

(a) Prove that  $R \subseteq S$  if and only if  $R^{-1} \subseteq S^{-1}$ .

(b) Prove that if  $R \subseteq S$ , then  $R \circ T \subseteq S \circ T$  and  $T \circ R \subseteq T \circ S$ .

(c) If  $R \circ T \subseteq S \circ T$  and  $T \circ R \subseteq T \circ S$  for some relation  $T$ , does it follow that  $R \subseteq S$ ?

(d) If  $R \circ T \subseteq S \circ T$  and  $T \circ R \subseteq T \circ S$  for every relation  $T$ , does it follow that  $R \subseteq S$ ? Prove that your answers to (c) and (d) are correct.

4. (a) Assume that  $R \subseteq S$ . ( $\Rightarrow$ ) Let  $(x,y) \in R^{-1}$ .  $(x,y) \in R^{-1} \Rightarrow (y,x) \in R \Rightarrow (y,x) \in S \Rightarrow (x,y) \in S^{-1}$  Therefore,  $R^{-1} \subseteq S^{-1}$ . ( $\Leftarrow$ ) Now assume that  $R^{-1} \subseteq S^{-1}$ . Then, by the result above,  $(R^{-1})^{-1} \subseteq (S^{-1})^{-1}$  Thus, by Theorem 2,  $R \subseteq S$ .

4. (b)

$(x,y) \in R \circ T \Rightarrow$  there is a  $z$  such that  $(z,y) \in R$  and  $(x,z) \in T \Rightarrow (z,y) \in S$  and  $(x,z) \in T$  (since  $R \subseteq S$ )  $\Rightarrow (x,y) \in S \circ T$

Therefore, if  $R \subseteq S$ , then  $R \circ T \subseteq S \circ T$ .  $(x,y) \in T \circ R \Rightarrow$  there is a  $x$  such that  $(z,y) \in T$  and  $(x,z) \in R \Rightarrow (z,y) \in T$  and  $(x,z) \in S$  (since  $R \subseteq S$ )  $\Rightarrow (x,y) \in T \circ S$

Therefore, if  $R \subseteq S$ , then  $T \circ R \subseteq T \circ S$ .

4. (c) No. Note that for any relations  $R, S$  on any set  $X$ ,  $R \circ \emptyset = \emptyset = S \circ \emptyset$ . But it does not follow that  $R \subseteq S$ , for example, let  $X = \mathbb{N}, R = \mathbb{N} \times \mathbb{N}, S = \emptyset$ . 13. (d) Yes. Take  $T = \text{Id}_X$ . By hypothesis,  $R \circ \text{Id}_X \subseteq S \circ \text{Id}_X$ —that is,  $R \subseteq S$ .

**Задания:**

1. Какие из следующих отношений на множестве всех людей рефлексивны? Антисимметричны? Транзитивны? Докажите ваши выводы.

Which of the following relation on the set of all people are reflexive? Symmetric? Antisymmetric? Transitive? Prove your assertions.

- (a)  $R(x,y)$  if  $y$  makes more money than  $x$ .  
 (b)  $R(x,y)$  if  $x$  and  $y$  are about the same height.  
 (c)  $R(x,y)$  if  $x$  and  $y$  have an ancestor in common.  
 (d)  $R(x,y)$  if  $x$  and  $y$  are the same sex.  
 (e)  $R(x,y)$  if  $x$  and  $y$  both collect stamps.  
 (f)  $R(x,y)$  if  $x$  and  $y$  like some of the same music.

**Решение:**

Reflexive Symmetric Antisymmetric Transitive

- |         |     |     |     |
|---------|-----|-----|-----|
| (a) No  | No  | Yes | Yes |
| (b) Yes | Yes | No  | Yes |
| (c) Yes | Yes | No  | No  |
| (d) Yes | Yes | No  | Yes |
| (e) Yes | Yes | No  | Yes |
| (f) Yes | Yes | No  | No  |

2. Какие из следующих отношений на множестве всех людей рефлексивны? Симметричны? Антисимметричны? Транзитивны? Объясните ваши выводы. (Which of the following relations on the set of all people are reflexive? Symmetric? Antisymmetric? Transitive? Explain why your assertions are true).

(a)  $R(x,y)$  if  $x$  and  $y$  either both like German food or both dislike German food.

(b)  $R(x,y)$  if (i)  $x$  and  $y$  either both like Italian food or both dislike it, or (ii)  $x$  and  $y$  either both like Chinese food or both dislike it.

(c)  $R(x,y)$  if  $y$  is at least two feet taller than  $x$ .

**Решение:**

Reflexive Symmetric Antisymmetric Transitive

(a) Yes Yes No Yes

(b) Yes Yes No No

(c) No No Yes Yes

3. Какие из следующих отношений на некотором множестве людей рефлексивны? Анtireфлексивны? Симметричны? Антисимметричны? Транзитивны? (Which of the following relations on the set of people indicated are reflexive? Irreflexive? Symmetric? Antisymmetric? Transitive?)

(a) IsSisterOf on the set of all females

(b) IsBrotherOfOrEquals on the set of all males

(c) IsSiblingOf on the set of all people

(d) IsSiblingOfOrEquals on the set of all people

(e) IsCousinOfOrEquals on the set of all people

Докажите ваши выводы. (Prove your assertions).

**Решение:**

	Reflex.	Irreflex.	Symm.	Antisymm.	Trans.
(a) IsSisterOf	N	Y	Y	N	N
(b) IsBrotherOfOrEquals	Y	N	Y	N	Y
(c) IsSiblingOf	N	Y	Y	N	N
(d) IsSiblingOfOrEquals	Y	N	Y	N	Y
(e) IsCousinOfOrEquals	Y	N	Y	N	N

4. Пусть  $A = \{a,b,c,d\}$ . Отношения  $R_1$  и  $R_2$  определены на  $A$  как  $R_1 = \{(a,a),(a,b),(b,d)\}$  и  $R_2 = \{(a,d),(b,c),(b,d),(c,b)\}$

Найдите:

(a)  $R_1 \circ R_2$ ; (b)  $R_2 \circ R_1$ ; (c)  $R_1^2$ ; (d)  $R_2^2$ .

Решение:

(a) (c, d)

(b) (a, d), (a, c)

(c) (a, a), (a, b), (a, d)

(d)  $\{(b, b), (c, d), (c, c)\}$

Контрольные вопросы

- В чем отличие отношений от обычных множеств?
- Объясните основные свойства бинарных отношений.
- Чем одинаковы и чем отличаются функции от отношений?

### **Задания на тему функции:**

1. Какие из следующих отношений являются функциями? Если да, то почему? (Which of the following are functions? If not, why not? )

(a)  $X$  is the set of students in a discrete mathematics class. For  $x \in X$ , define  $g(x)$  to be the youngest cousin of  $x$ .

(b)  $X$  is the set of senators serving in 1998. For  $x \in X$ , define  $g(x)$  to be the number of terms a senator has held.

(c) For  $x \in \mathbb{R}$ , define  $g(x) = |x|/|x|$ .

#### **Решение:**

(a) Not a function. Not everyone has a cousin, let alone a youngest one.

(b) A function since the number of terms is clearly associated with each senator.

(c) Not a function since  $g(0)$  is not defined.

2. What are the domain and range of the addition function on the real numbers? Multiplication? Subtraction? Division?

#### **Решение:**

Addition : domain is  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ : range is  $\mathbb{R}$

Multiplication : domain is  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ : range is  $\mathbb{R}$

Subtraction : domain is  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ : range is  $\mathbb{R}$

Division : domain is  $\mathbb{R} \times \mathbb{R} - \{0\}$ : range is  $\mathbb{R}$

3. Найдите первые шесть чисел последовательности определённой как (Find the first six terms of the sequence with the elements defined as):

$F(0) = 1$ ,  $F(1) = 3$ ,  $F(2) = 5$ , and  $F(n) = 3F(n-1) + 2F(n-2) - 3F(n-3)$  for  $n \geq 3$ .

#### **Решение:**

$F(0) = 1; F(1) = 3; F(2) = 5; F(3) = 18; F(4) = 55; F(5) = 186$

4. Пусть  $X = \{-1, 0, 1, 2\}$  и  $Y = \{-4, -2, 0, 2\}$ . Найдите функцию  $F : X \rightarrow Y$  как  $F(x) = x^2 - x$ . Докажите что  $F$  не является ни инъективной ни сюръективной (is neither 1-1 nor onto).

#### **Решение:**

$F(1) = F(0)$  так что  $F$  не инъективная функция.  $F$  – не сюръективная, так как  $-4$  не является образом ни одного элемента.

## 1.4 Лабораторная работа №4 – Транзитивные замыкания

### Цель работы

На основе решения упражнений и задач изучить смысл и освоить специфику транзитивных замыканий.

### Задание:

1. Пусть  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ , и определено отношение на  $X$  как  $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$

- (a) Найдите рефлексивное замыкание  $R$ .
- (b) Найдите симметричное замыкание  $R$ .
- (c) Найдите транзитивное замыкание  $R$ .
- (d) Найдите рефлексивное и транзитивное замыкание  $R$ .

### Решение:

- (a)  $R \cup \text{Id}_X = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$
- (b)  $R \cup R^{-1} = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 1), (3, 2), (4, 3)\}$
- (c)  $R^+ = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (1, 3), (2, 4), (1, 4)\}$  11. (d)  $R^* = R^+ \cup \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$

2. Пусть  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ . Найдите транзитивное замыкание отношения  $R$ , определённого на  $A$  как  $R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 4)\}$

### Решение:

$\{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 4), (1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (1, 4)\}$

### Контрольные вопросы

- В чём состоит понятие транзитивности?
- Какие приложения свойства транзитивности в медицине и технике вы можете назвать?

## 1.5 Лабораторная работа №5 – Комбинации без повторений

### Цель работы

На основе выполнения заданий по комбинаторике овладеть методами подсчёта комбинаций без повторений и уметь применять их на практике.

### Задания на применение принципа умножения:

1. Сколько номеров авто может быть выдано, если номер состоит из двух букв латиницы и трёх цифр? (How many license plates can be made using two uppercase letters followed by a 3-digit number?)

#### Решение:

Используем принцип умножения (Use the Multiplication Principle).  
 $26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 676,000$

2. Сколькими способами может быть выбрана одна правая перчатка и одна левая перчатка из шести пар разных перчаток без получения пары? (How many ways can one choose one right glove and one left glove from six pairs of different gloves without obtaining a pair?)

#### Решение:

Выберем правую перчатку шестью способами. После выбора правой перчатки левая перчатка не может быть выбрана как левая перчатка так как левая перчатка должна быть выбрана из другой пары. Следовательно, существует пять способов выбора левой перчатки. Принцип умножения даёт ответ 30. (Choose the right glove in one of 6 ways. After choosing the right glove, the left glove of that pair cannot be chosen as the left glove since the left glove must come from a different pair. Therefore, there are 5 choices for the left glove. By the Multiplication Principle the answer is 30).

3. Сколько натуральных чисел больших или равных 1000 и меньших 5400 имеют свойства: (How many natural numbers greater than or equal to 1000 and less than 5400 have the properties):

(a) Ни одно число не повторяется (No digit is repeated).

(b) Цифры 2 и 7 отсутствуют (The digits 2 and 7 do not occur).

#### Решение:

(a) There are two cases: (i) the first digit is 5 and (ii) the first digit is one of 1, 2, 3, 4. The count for these two cases is:  $1 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 7 + 4 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 7$ .

(b) There are two cases: (i) the first digit is 5 and (ii) the first digit is one of 1, 3, 4. The count for these two cases is:  $1 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 5 + 3 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5$ .

4. Сколько 6-значных чисел может быть получено использованием  $\{1, 2, \dots, 9\}$  без повторений таких, что 1 и 2 отсутствуют в последовательном соседстве? (How many 6-digit numbers can be formed using  $\{1, 2, \dots, 9\}$  with no repetitions such that 1 and 2 do not occur in consecutive positions?)

#### Решение:



Count the total number of numbers that can be formed and then subtract the number of numbers that have 1 and 2 in consecutive positions. Consider  $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ . The number of ways to choose four elements other than  $\{1, 2\}$  is  $7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4$ . Now the pair  $\{1, 2\}$  can be inserted in any of five locations. At each location  $\{1, 2\}$  is inserted, the values can appear as 12 or 21. Thus the total number with 1 and 2 appearing consecutively is  $7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 2$ . Subtract this number from the total number of ways a six digit number can be formed:  $9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4$ .

11. Сколько положительных целых чисел меньших, чем 1000000 может быть получено использованием только 7, 8 и 9? Сколько использованием только цифр 0, 8 и 9? (How many positive integers less than 1,000,000 can be written using only the digits 7, 8, and 9? How many using only the digits 0, 8, and 9?)

**Решение:**

36; 36 – 1 as the only choice eliminated is all 0's.

Контрольные вопросы

- Объясните вывод формулы для размещений без повторений.
- Объясните вывод формулы для сочетаний без повторений.

## 1.6 Лабораторная работа №6 – Комбинации с повторениями

### Цель работы

На основе выполнения заданий по комбинаторике овладеть методами подсчёта комбинаций с повторениями и уметь применять их на практике.

### Задания:

1. Сколько перестановок существует для слов Bathesheba? Solomon? Ahab? Вашего собственного имени?

#### Решение:

Используем теорему о перестановках с повторениями.  
 $9!/(2!2!2!2!); 7!/3!; 4!/2!$

2. Сколько слов из 12 букв можно сформировать, используя символы

a,a,a,a,b,b,b,b,b,b,b

и при этом никакие слова не должны содержать два символа a рядом?

#### Решение:

Запишем в строку символы b, оставляя пространство перед первым символом, между ними и в конце строки. Получается девять мест. Выберем четыре места из девяти мест и подсчитаем количество способов выбора. Это будет равно  $C(9,4)$  способов.

3. Сколькими способами можно разместить пять идентичных объявлений в трех почтовых ящиках, если каждый почтовый ящик получает по крайней мере одно объявление? Сколько способов, если каждый почтовый ящик может не получить ни одного? (Порядок, в котором почтальон доставляет сообщения, несуществен.)

#### Решение:

Количество решений системы  $x_1 + x_2 + x_3 = 2$  с  $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$  дает ответ на первый вопрос. Количество решений уравнения  $x_1 + x_2 + x_3 = 5$  дает ответ на второй вопрос.

4. Как много способов существует, чтобы выбрать восемь букв из aaaaaa bbbbbbb cccccccc таким образом, чтобы, по крайней мере, была одна a, одна b и две c?

#### Решение:

После удаления букв, которые должны быть выбраны, пусть  $x_a$  будет число выбранных букв a,  $x_b$  будет число выбранных букв b и пусть  $x_c$  будет числом избранных букв c. Мы должны решить уравнение  $x_a + x_b + x_c = 4$ , где  $x_a \geq 0, x_b \geq 0$  и  $x_c \geq 0$ . Ответ  $C(6,2)$ .

5. Сколькими способами два книготорговца могут разделить между собой 300 экземпляров одной книги, 200 экземпляров другой, и 100 экземпляров третьей, если ни один книготорговец не может получить все экземпляры любой из книг?

**Решение:**

Каждый книготорговец получает от 1 до 299 копий первой книги, от 1 до 199 копий второй книги и от 1 до 99 копий третьей. Ответ  $299 \cdot 199 \cdot 99$ .

6. Как много способов распределения шести конфеты среди трех детей, если каждый ребенок должен получить по меньшей мере, один шоколадный батончик?

7. Three first-year, three second-year, and three third-year students are to be seated in a row. The students in each class are indistinguishable. How many ways can they be seated so that no three students of the same class sit together.

**Solution:**

The total number of permutations of the three classes of students is  $9! 3!3!3!$

Let  $A_1$  be the number of permutations with three first-year students in a row;  $A_2$  be the number of permutations with three second-year students in a row; and  $A_3$  be the number of permutations with three third-year students in a row. The answer is

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = \text{Total} - |A_1| - |A_2| - |A_3| + |A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3| - |A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 1680 - 3 \cdot (140) + 3 \cdot (20) - 6 = 1314$$

8. A shop sells six flavors of ice cream. Each ice cream cone holds one, two, or three scoops of ice cream. How many ways can four ice cream cones be made such that: (a) All the cones have a different flavor, and each cone has a single flavor for each of its scoops. (b) Not necessarily all the cones have a different flavor. (c) The cones contain only two or three flavors of ice cream. (d) The cones contain three different flavors.

**Solution:**

(a)  $C(6,4) 17$ . (b)  $C(9,3) 17$ . (c)  $C(9,3) - C(6,4) - C(6,1) 17$ . (d)  $C(6,3)C(3,1)$

## 1.7 Лабораторная работа №7 – Представление графов в компьютере

### Цель работы

Освоить приёмы работы с графами: представления графов, поиску подграфов, путей и циклов, исследование на изоморфизм.

### Задания:

1. Найдите граф с 12 ребрами, в котором шесть вершин степени три, а у остальных вершин степени меньше.
2. Приведите пример графа, в котором по крайней мере четыре вершины, или докажите, что такого графа не существует, если
  - a) в графе нет ни одной вершины нечетной степени;
  - b) в графе нет ни одной вершины четной степени;
  - c) в графе ровно одна вершина нечетной степени;
  - d) в графе ровно одна вершина четной степени;
  - e) в графе ровно две вершины нечетной степени.
3.
  - a) Постройте граф с шестью вершинами и последовательностью степеней 1, 1, 2, 2, 3, 3.
  - b) Постройте граф с шестью вершинами и последовательностью степеней 1, 1, 3, 3, 3, 3.
  - c) Можете ли вы найти по крайней мере два графа с каждой из этих последовательностей степеней?
4. Постройте все последовательности степеней для графов с четырьмя вершинами, среди которых нет ни одной изолированной.
5. Перечислите все возможные последовательности степеней для графов с шестью ребрами и пятью вершинами, среди которых нет ни одной изолированной.
6. Перечислите все возможные последовательности степеней для графов с восемью ребрами и пятью вершинами, среди которых нет ни одной изолированной.
7. Пусть  $d_1, d_2, \dots, d_n$  — неубывающая последовательность неотрицательных чисел, выражающих степени вершин некоторого графа. Докажите, что сумма  $\sum_{i=1}^n d_i$  четна. Верно ли обратное утверждение?
8. Покажите, что последовательность 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6 соответствует некоторому графу. При построении ответа исходите из графа с последовательностью степеней 1, 1, 1, 1, 1, 1.
9. Для  $n = 2, 3, 4, 5$  получите соотношение между числом ребер и числом вершин  $n$ -регулярного графа с  $p$  вершинами, где  $p = 1, 2, 3, \dots$ . Постройте все 3-регулярные графы с четырьмя и шестью вершинами.
10. Пусть  $G$ —граф. Докажите, что он двудольный тогда и только тогда, когда в графе  $G$  нет ни одного нечетного цикла.
11. Постройте граф с 16 вершинами, пронумерованными элементами множества  $\{0,1\} \times \{0,1\} \times \{0,1\} \times \{0,1\}$  и ребрами, соответствующими ребрам графа  $Q_4$
12. Докажите, что в графе  $Q_n$ , где  $n$  — степень двойки,  $2n$  вершин и  $n \cdot 2^{n-1}$  ребер.
13. Докажите, что граф  $Q_n$  двудольный при  $n = 2, 3, 4, \dots$ .

### 1.8. - Лабораторная работа №8 – Обход графов в глубину и в ширину

Цель работы: освоить приёмы работы с графами, известными как обход графа в глубину и обход графа в ширину. Эти методы широко используются в программировании.

Задания выдаются на занятии индивидуально каждому студенту.

### 1.9. - Лабораторная работа №9 – Связность в графах

Цель работы: освоить приёмы построения связных графов с заданными свойствами.

#### Задания:

1. Постройте такие связные графы:
  - (a) все графы с пятью вершинами и по крайней мере с семью рёбрами;
  - (b) все кубические графы в которых не более восьми рёбер;
  - (c) один 4-регулярный граф с шестью вершинами;
  - (d) три 5-регулярных графа с восемью вершинами.

#### Решение:

(a) The table indicates the number of graphs on five vertices with 0, 1, 2, ..., 10 edges. You can check your construction against these values to see if you have constructed all the graphs.

#edges #graphs 0 1 1 1 2 2 3 4 4 6 5 6 6 6 7 4 8 2 9 1 10 1

You really need only construct the graphs on zero through four edges and take complements to get the graphs on six through ten edges. A separate case for five edges also must be dealt with. In the case of five edges, some of the graphs can be isomorphic to their complement so it will not suffice to find three graphs with five edges.

(b) All cubic graphs with fewer than ten vertices:

SIX VERTICES: (1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,5),(3,6),(4,5),(4,6),(5,6)

(1,2),(1,3),(1,4),(2,5),(2,6),(3,5),(3,6),(4,5),(4,6)

EIGHT VERTICES:

(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,5),(4,6),(5,7),(5,8),(6,7),(6,8),(7,8)

(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,5),(3,6),(4,5),(4,7),(5,8),(6,7),(6,8),(7,8)

(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,5),(3,6),(4,7),(4,8),(5,7),(5,8),(6,7),(6,8)

(1,2),(1,3),(1,4),(2,5),(2,6),(3,5),(3,7),(4,6),(4,7),(5,8),(6,8),(7,8)

(1,2),(1,3),(1,4),(2,5),(2,6),(3,5),(3,7),(4,6),(4,8),(5,8),(6,7),(7,8)

(c) A 4-regular graphs on 6 vertices:  $K_6 - \{(1,4),(2,5),(3,6)\}$

(d) Three 5-regular graphs on 8 vertices:

$K_8 - \{(1,2), (2,3), (3,4), (4,5), (5,6), (6,7), (7,8), (8,1)\}$

$K_8 - \{(1,2), (2,3), (3,4), (4,1), (5,6), (6,7), (7,8), (8,5)\}$

$K_8 - \{(1,2), (2,3), (3,1), (4,5), (5,6), (6,7), (7,8), (8,4)\}$

2. Найдите граф  $G$  такой, что граф  $\bar{G}$  несвязный.

**Решение:**

$V(G) = \{1, 2, 3, 4\}; E(G) = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4)\}$

5. Пусть  $G = (V, E)$  связный граф, в котором по крайней мере две вершины. Докажите, что если  $|V| > |E|$ , то в графе  $G$  есть вершина степени один.

Решение:

Предположим  $\deg(v) \geq 2$  для всех  $v \in V$ .

$$2|V| \leq \sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$


Следовательно,  $|E| \geq |V|$ , что является противоречием. Следовательно, по крайней мере одна вершина должна быть степени один.

### 1.10. - Лабораторная работа №10 – Циклы и контуры в графах

Цель работы: освоить приёмы нахождения контуров и циклов в графах. Изучить гамильтоновы циклы. Исследовать графы на изоморфизм.


#### Задания:

1. Докажите, что для любого графа  $G$  с шестью вершинами либо  $G$ , либо  $\bar{G}$  содержит треугольник,  
Постройте  $\bar{C}_5$ ,  $\bar{K}_{3,3}$  и  $\bar{K}_{2,4}$ .
2. Для графов



найдите

- а) степень каждой вершины;
  - б) путь длины больше четырех, если такой существует;
  - с) цикл длины больше четырех, если такой существует;
  - д) маршрут длины шесть, если такой существует;
  - е) контур, в котором ребер больше, чем вершин в графе, если такой существует.
3. Для графа





найдите

- а)  $n$ —регулярные подграфы без изолированных вершин для  $n = 2, 3, 4, 5$ ;
- б) по одному пути длины три, четыре, пять и шесть;
- с) по одному циклу длины три, четыре, пять и шесть;
- д) по одному маршруту длины 6, 8, 10 и 12;
- е) индуцированные подграфы, определяемые множествами вершин


$\{1,3,4\}$ ,  $\{2,3,5,6\}$ ,  $\{2,4,6\}$  и  $\{1,3,4,5,6\}$ .

Решение пунктов а), b), с) и е) нужно изобразить графически, обозначив вершины так же, как на рисунке. Для пункта d) перечислите вершины в том порядке, в котором они встречаются в маршруте.

4. Докажите, что если для нечетного  $n$ ,  $n > 3$ , в графе  $G$  есть  $n$ -контур, то в  $G$  есть нечетный цикл.
5. Покажите, что последовательность 1, 2, 2, 3, 4 графическая, а последовательность 1, 3, 3, 3 — нет. Докажите теорему Гавела—Хакими о том, что при  $n \geq 1$  последовательность  $d_1, d_2, \dots, d_n$  графическая тогда и только тогда, когда последовательность  $d_1, d_2, \dots, d_{n-d_n-1}, \dots, d_{n-1}-1$  — графическая.
6. Пусть  $d_1, d_2, \dots, d_n$  — последовательность различных целых чисел, где  $n \geq 1$  и  $0 \leq d_i < n - 1$  при  $1 \leq i \leq n$ . Докажите, что эта последовательность не соответствует графу.
7. Пусть  $G = (V, E)$  — двудольный граф с биразбиением  $V = A \cup B$ . Докажите, что если  $|A| \neq |B|$  то граф  $G$  не гамильтонов.
8. Найдите гамильтонов цикл в  $Q_3$ .
9. Найдите гамильтоновы циклы в следующих графах:





10. Найдите гамильтонов цикл в следующем графе  $G_2$









11. Завершите доказательство из примера 5 раз. 6.3.1.
12. Завершите доказательство случая и из примера 6 разд. 6.3.1.
13. Покажите, что функция  $F(a)=3$ ,  $F(b)=1$ ,  $F(c)=4$  и  $F(d)=2$  осуществляет изоморфизм между следующими графами  $G$  и  $H$ :





14. Докажите, что два графа  $G$  и  $H$  изоморфны друг другу тогда и только тогда, когда граф  $\bar{G}$  изоморфен  $\bar{H}$ .
15. Пусть  $G = (V, E)$  и  $H = (V_1, E_1)$  — изоморфные графы. Докажите, что степени вершин графа  $G$  равны степеням вершин  $H$ . Покажите, что из одних только условий  $|V| = |V_1|$  и  $|E| = |E_1|$  не следует, что графы  $G$  и  $H$  изоморфны.
16. Докажите, что изображенные ниже графы  $G$  и  $H$  изоморфны:






17. Докажите, что изображенные ниже графы  $G$  и  $H$  не изоморфны:





18. Докажите, что изображенные ниже графы  $G$  и  $H$  изоморфны:



19. Докажите, что никакие два из изображенных ниже графов  $G_1$ ,  $G_2$  и  $G_3$  не изоморфны:



20. Докажите, что изображенные ниже графы  $G$  и  $H$  изоморфны:



### 1.11. - Лабораторная работа №11 – Ориентированные графы

Цель работы: освоить приёмы работы с ориентированными графами, циклическими и ациклическими; исследовать отношения частичного порядка, задаваемые орграфами.

#### Задания:

1. Пусть  $D$  – направленный граф, степень исхода каждой вершины которого не меньше единицы. Докажите, что  $D$  содержит направленный цикл. Покажите, что результат остается в силе, если степень захода каждой вершины не меньше единицы.
2. Докажите, что любой направленный ациклический граф содержит по крайней мере одну вершину с нулевой степенью захода. Воспользуйтесь этим результатом, чтобы построить другой алгоритм, осуществляющий топологическую сортировку. ( Prove that any directed acyclic graph contains at least one vertex with indegree of zero. Use this result to devise a different algorithm to do a topological sort).

#### Решение:

Предположим, что это не так. Затем выберем вершину  $x$ . Так как  $\text{indeg}(x) \neq 0$  существует вершина  $y_1$  такая, что  $(y_1, x)$  принадлежит графу. Так как  $\text{indeg}(y_1) \neq 0$  существует  $y_2$  такая, что  $(y_2, y_1)$  принадлежит графу. Так как  $G$  ациклический, то  $y_2 \neq x$ . Действуя таким образом, чтобы построим бесконечный ориентированный путь. Поскольку граф конечен, это противоречие.

For a topological sort, find a vertex of indegree zero, list it, and then delete its edges from the graph. The resulting graph is still acyclic and so a new vertex of indegree zero can be found. List this vertex second, delete its edges from the graph. Proceed in this way until all the vertices have been listed.

3. Докажите, что если в графе  $G$  содержится эйлеров контур, то граф  $G$  ориентируем. (Prove that if a graph  $G$  contains an Eulerian circuit, then  $G$  is orientable).

#### Решение:

For an Eulerian path, direct the edges in the direction of the path as you traverse the Eulerian circuit.

4. Докажите, что связный ненаправленный граф ориентируем тогда и только тогда, когда каждое его ребро содержится в цикле. (Prove that a connected undirected graph is orientable if and only if each edge is contained in a cycle).

**Решение:**

Necessity clear. Sufficiency: Choose any circuit  $C$  and orient its edges cyclically. If every edge of  $G$  is contained in  $C$ , proof complete. If not, choose any edge  $e$  which is not in  $C$  but which is adjacent to an edge of  $C$ . By hypothesis,  $e$  is contained in a circuit  $C_0$  whose edges we may direct cyclically (with the exception of those already directed). Proceed at each stage directing at least one new edge. At each stage  $G$  is strongly connected, so at the end it is.

5. Докажите, что если направленный граф эйлеров, то он сильно связан. (Prove that if a directed graph is Eulerian, then it is strongly connected).

**Решение:**

List the edges of an Eulerian circuit  $C$ . Pick any two vertices,  $x$  and  $y$ . Find an occurrence of  $x$  in  $C$  and an occurrence of  $y$  in  $C$ . Then,

$$C = A_1 x A_2 y A_3$$

Now the directed trail  $x A_2 y$  can be refined to become a directed path from  $x$  to  $y$ . Similarly,  $y A_3 A_1 x$  can be refined to become a directed path from  $y$  to  $x$ .

6. Найдите направленный граф, который не является эйлеровым, но для которого основной граф эйлеров. (Find a directed graph that is not Eulerian but for which the underlying graph is Eulerian).

**Решение:**

$(1, 2), (3, 2), (3, 4), (1, 4)$

7\*. Challenge: A complete directed graph is a directed graph whose underlying graph is a complete graph. Show that the sum of the squares of the indegrees over all vertices is equal to the sum of the squares of the outdegrees over all vertices in any directed complete graph.

**Определение 1. Турниром**  $T_n$  называется ориентированный граф с  $n$  вершинами такой, что каждая пара вершин  $v, w$  соединена с одним и только одним из ориентированных ребер  $(v, w)$  или  $(w, v)$ . Каждой вершине турнира засчитывается число очков, равное её степени исхода. **Последовательность очков**, или **ранкинг** турнира – это последовательность очков вершин, расположенных в неубывающем порядке. Турнир является **транзитивным**, если из существования ребер  $(a, b)$  и  $(b, c)$  следует существование ребра  $(a, c)$ . **Дополнение** турнира образуется обращением всех направлений ребер турнира.

8. Докажите, что если  $D$  – турнир, то в нем есть направленный гамильтонов путь.

**Решение:**

The proof is by induction on the number of vertices  $p$  in the tournament. Check all tournaments on 1, 2, 3, or 4 vertices and verify that each contains a Hamiltonian path. So assume that each tournament of order  $n$  where  $n \geq 4$  contains a Hamiltonian path and consider a tournament  $T$  of order  $n + 1$ . Let  $v \in V(T)$ .  $V(T) - \{v\}$  is a tournament of order  $n$ . By the induction hypothesis,  $V(T) - \{v\}$  contains a Hamiltonian path, say  $P : v_1, v_2, \dots, v_n$ . Now if  $(v, v_1)$  is an edge of  $T$ , then  $T$  contains a Hamiltonian path  $v, v_1, v_2, \dots, v_n$ . If  $(v_n, v)$  is an edge of  $T$ , then  $T$  contains a Hamiltonian path. So suppose  $(v_1, v)$  is an edge of  $T$ . If all the vertices  $v_1, v_2, \dots, v_n$  are adjacent to  $v$ , then  $T$  contains a Hamiltonian path because  $(v_n, v)$  is an edge of  $T$ . If not all the vertices  $v_1, v_2, \dots, v_n$  are adjacent to  $v$ , then there must be a vertex  $v_i$  where  $1 \leq i \leq n-1$  such that  $(v_i, v)$  and  $(v, v_{i+1})$  are edges of  $T$ . Then,  $v_1, v_2, \dots, v_i, v, v_{i+1}, \dots, v_n$  is a Hamiltonian path.

### *1.12. - Лабораторная работа №12 – Взвешенные графы*

Цель работы: освоить приёмы работы с графами, известными как обход графа в глубину и обход графа в ширину. Эти методы широко используются в программировании.

### *1.13. - Лабораторная работа №13 – Поток в сетях*

Цель работы: освоить приёмы работы с потоками в сетях, задачи на поиск кратчайшего пути и сетевой график работ.

Задания выдаются на занятии индивидуально каждому студенту.

### 1.14. - Лабораторная работа №14 – Математическая логика

Цель работы: освоить и научиться применять законы формальной логики.

1. Переведите следующие выражения в формулы логики высказываний.

Используйте такие пропозициональные буквы (Translate the following expressions into propositional logic. Use the following proposition letters):

$p$  = “Jones told the truth”;

$q$  = “The butler did it”;

$r$  = “I’ll eat my hat”;

$s$  = “The moon is made of green cheese”;

$t$  = “If water is heated to 100° C, it turns to vapor”.

(a) If Jones told the truth, then if the butler did it, I’ll eat my hat.

(b) If the butler did it, then either Jones told the truth or the moon is made of green cheese, but not both.

(c) It is not the case that both Jones told the truth and the moon is made of green cheese.

(d) Jones did not tell the truth, and the moon is not made of green cheese, and I’ll not eat my hat.

(e) If Jones told the truth implies I’ll eat my hat, then if the butler did it, the moon is made of green cheese.

(f) Jones told the truth, and if water is heated to 100° C, it turns to vapor.

**Решение:**

(a)  $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ ;

(b)  $q \rightarrow ((p \vee s) \wedge \neg(p \wedge s))$ ;

(c)  $\neg(p \wedge s)$  1. (d)  $\neg p \wedge \neg s \wedge \neg r$  ;

(e)  $(p \rightarrow r) \rightarrow (q \rightarrow s)$ ;

(f)  $p \wedge t$  ;

2. Пусть  $p$  обозначает высказывание «Джилли играет в баскетбол», а  $q$  обозначает высказывание «Джим играет в футбол». Как можно яснее объясните, что означают следующие высказывания (Let  $p$  denote the proposition “Jill plays basketball” and  $q$  denote the proposition “Jim plays soccer.” Write out—in the clearest way you can— what the following propositions mean):

(a)  $\neg p$ ; (b)  $p \wedge q$ ; (c)  $p \vee q$ ; (d)  $\neg p \wedge q$ ; (e)  $p \rightarrow q$ ; (f)  $p \leftrightarrow q$ ; (g)  $\neg q \rightarrow p$ .

**Решение:**

(a) Jill does not play basketball.

(b) Jill plays basketball and Jim plays soccer.

(c) Jill plays basketball or Jim plays soccer.

(d) Jill does not play basketball and Jim plays soccer.

(e) If Jill plays basketball then Jim plays soccer.

- (f) Jill plays basketball if and only if Jim plays soccer.  
 (g) If Jim does not play soccer then Jill plays basketball.

3. Jim, George, and Sue belong to an outdoor club. Every club member is either a skier or a mountain climber, but no member is both. No mountain climber likes rain, and all skiers like snow. George dislikes whatever Jim likes and likes whatever Sue dislikes. Jim and Sue both like rain and snow. Is there a member of the outdoor club who is a mountain climber? (Есть ли среди этих троих альпинист?)

**Решение:**

Member	Mt. Climber	Skier	Like rain	Like snow
Jim	No	Yes	Yes	Yes
George	Yes	No	No	No
Sue	No	Yes	Yes	Yes

Yes, by George! We do not assume here that a club member dislikes a sport if he or she does not participate in that sport.

4. Пусть значение  $p$  равно T, а значение  $q$  равно F, а значение  $r$  равно T. Найдите истинностные значения следующих формул ( Let proposition  $p$  be T, proposition  $q$  be F, and proposition  $r$  be T. Find the truth values for the following):

- (a)  $p \vee q \vee r$ ; (b)  $p \vee (\neg q \wedge \neg r)$ ; (c)  $p \rightarrow (q \vee r)$ ; (d)  $(q \wedge \neg p) \leftrightarrow r$ ; (e)  $\neg r \rightarrow (p \wedge q)$ ;  
 (f)  $(p \rightarrow q) \rightarrow \neg r$ ; (g)  $((p \wedge r) \rightarrow (\neg q \vee p)) \rightarrow (q \vee r)$ .

**Решение:**

- (a) T  
 (b) T  
 (c) T  
 (d) F  
 (e) T  
 (f) T  
 (g) T

5. Постройте деревья следующих формул ( Find the expression tree for the following formulas): (a)  $\neg p \wedge (\neg q \vee r)$ ; (b)  $p \vee (\neg q \wedge \neg r)$ ; (c)  $((p \vee q) \leftrightarrow r) \leftrightarrow p$ ;  
 (d)  $(\neg q \wedge \neg r) \leftrightarrow (p \rightarrow (q \vee r))$ .

## **2 Основная, дополнительная и нормативная литература**

1. Лекции по дискретной математике : учеб. пособие / В.Б. Алексеев. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 90 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/952158>
2. Дискретная математика. Углубленный курс: Учебник / Соболева Т.С.; Под ред. Чечкина А.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 278 с.: - (Бакалавриат) - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/851215>
3. Дискретная математика. Задачи и упражнения с решениями: Учебно-методическое пособие / А.А. Вороненко, В.С. Федорова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 104 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-006601-1 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/424101>
4. Дискретная математика: Учебное пособие / Васильева А.В., Шевелева И.В. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 128 с.: ISBN 978-5-7638-3511-3 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/967274>
5. Дискретная математика. Теория и практика решения задач по информатике / Окулов С.М., - 3-е изд. - М.:БИНОМ. ЛЗ, 2015. - 425 с.: ISBN 978-5-9963-2541-2 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/366843>.

## **3 Программное обеспечение**

### **3.1 Лицензионное программное обеспечение**

Не предусмотрено

### **3.2 Свободно распространяемое программное обеспечение**

- Microsoft Visual Studio Community;  
LibreOffice



### 3 Приложение 1

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»

Кафедра информационных систем и программирования

**ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № \_\_\_\_\_**

На тему: « \_\_\_\_\_ »

по дисциплине «Дискретная математика»

Выполнил(а):

Студент(ка). \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Проверил:

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Краснодар  
2019