REPRENDRE EN DOUCEUR

Après bébé : reprendre le sport pas à pas, en commençant par le périnée

Après un accouchement, l'envie de retrouver son corps et son énergie est souvent forte. Mais la reprise suit un ordre précis, et le périnée passe en premier. Voici les étapes recommandées par la Haute Autorité de santé.



SANTÉ AU FÉMININ

POUR NOS CLIENTS ACTIFS · 4 MIN DE LECTURE

Cet article donne des repères généraux. Chaque accouchement et chaque récupération sont différents : ton médecin ou ta sage-femme reste ton premier interlocuteur.

01

Le post-partum, une période à part

La grossesse et l'accouchement transforment le corps en profondeur. Les muscles abdominaux se sont étirés, parfois écartés. Le périnée, cet ensemble de muscles qui ferme le bas du bassin et soutient la vessie, l'utérus et le rectum, a été fortement sollicité. Les ligaments restent plus souples pendant un certain temps. Sans parler de la fatigue, des nuits courtes, de l'allaitement éventuel et du bouleversement émotionnel.

Reprendre une activité physique est très bénéfique : pour l'énergie, le moral, le dos, la silhouette et la santé à long terme. Mais il faut le faire dans le bon ordre.

02

Étape 1 : la consultation postnatale

La Haute Autorité de santé, dans sa synthèse de 2022 sur l'activité physique pendant la grossesse et le post-partum, indique qu'avant la reprise du sport, une consultation postnatale réalisée par le médecin ou la sage-femme est nécessaire. Elle a généralement lieu dans les semaines qui suivent l'accouchement.

C'est le moment de faire le point sur la cicatrisation, le périnée, les abdominaux, la tension, le moral, et de poser toutes tes questions sur la reprise.

> **Avant de reprendre le sport, une consultation postnatale avec le médecin ou la sage-femme est l'étape incontournable.**

03

Étape 2 : le périnée d'abord

La HAS recommande qu'une rééducation du périnée, prescrite lors de cette consultation et réalisée par une sage-femme ou un kinésithérapeute, soit effectuée lorsqu'elle est nécessaire, afin de limiter les risques de fuites urinaires ou de descente d'organes.

Les fuites urinaires après l'accouchement sont fréquentes, mais elles ne sont pas une fatalité, et il ne faut pas les banaliser. Une grande revue Cochrane publiée en 2018 a montré que l'entraînement des muscles du plancher pelvien améliorait nettement les symptômes d'incontinence urinaire chez les femmes.

04

Étape 3 : une reprise progressive et douce

Selon la HAS, la reprise de l'activité physique en post-partum doit être progressive et, au départ, d'intensité légère à modérée. Quelques idées pour les premières semaines, une fois le feu vert obtenu :



Une reprise progressive, à ton rythme

- La marche, avec ou sans poussette, en augmentant progressivement la durée.
- La respiration et le travail des abdominaux profonds, comme le transverse, en coordination avec le périnée.
- La mobilité douce du dos, des hanches et des épaules, souvent sollicitées par le portage et l'allaitement.
- Le renforcement léger des fessiers, des jambes et du haut du dos.

05

Étape 4 : les activités à impact, plus tard

La HAS précise que les activités avec des impacts au sol, comme la course à pied, le tennis, le trampoline ou les sports avec sauts, ne sont reprises qu'après la rééducation du périnée et le constat d'une fonction périnéale normale.

Même chose pour les exercices qui augmentent fortement la pression dans l'abdomen, comme les crunchs classiques ou le port de charges lourdes : on les réintroduit progressivement, quand le périnée et la sangle abdominale ont retrouvé leur fonction.

> **La course et les sauts attendent que le périnée ait retrouvé sa fonction. C'est la meilleure façon de protéger ton corps pour longtemps.**

06

Les signaux à surveiller

Pendant ou après l'effort, ralentis et parles-en à ton médecin, ta sage-femme ou ton kiné en cas de :

- Fuites urinaires, de gaz ou de selles.
- Sensation de pesanteur ou de boule dans le vagin.
- Douleurs pelviennes, au niveau de la cicatrice ou du bas du dos.
- Saignements qui reprennent ou augmentent.
- Bombement au milieu du ventre lors des efforts, qui peut signaler un écart des abdominaux.

07

Et l'allaitement ?

L'activité physique modérée est compatible avec l'allaitement. Pense à bien t'hydrater, à manger suffisamment, et à porter une brassière confortable. Allaiter ou tirer son lait avant la séance peut améliorer le confort.

08

Le moral compte aussi

Le post-partum peut être une période de fatigue intense, de doutes et parfois de tristesse. L'activité physique aide souvent à se sentir mieux, mais elle ne remplace pas un accompagnement. Si tu te sens triste, anxieuse ou dépassée de façon persistante, parles-en rapidement à ton médecin ou à ta sage-femme. La dépression du post-partum est fréquente et se soigne.

09

Comment je t'accompagne

- Je commence par te demander le feu vert de ton médecin ou de ta sage-femme, et l'avancée de ta rééducation.
- On construit une reprise en plusieurs phases, de la respiration au renforcement complet, puis aux impacts si tu le souhaites.
- On s'adapte à ton rythme de vie avec bébé : séances plus courtes, à la maison, ou avec la poussette.
- On avance sans pression : ton corps a fait un travail immense.

À RETENIR

- Avant toute reprise, une consultation postnatale est nécessaire.
- La rééducation du périnée passe en premier quand elle est indiquée.
- La reprise est progressive, d'abord légère à modérée.
- La course et les sauts reviennent après la rééducation et une fonction périnéale normale.
- Fuites, pesanteur ou douleurs : on ralentit et on en parle à un professionnel.

SOURCES

- Haute Autorité de santé, Activité physique et sportive pendant la grossesse et le post-partum, synthèse (2022) : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-08/synthese_aps_grossesse_post_partum_vf.pdf
- Dumoulin C., Cacciari L.P., Hay-Smith E.J.C., Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women, Cochrane Database of Systematic Reviews (2018) : https://doi.org/10.1002/14651858.CD005654.pub4
- Organisation mondiale de la santé, Lignes directrices de l'OMS sur l'activité physique et la sédentarité, en un coup d'œil (2020) : https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240014886