LE CONSEIL DU MOIS

# Le périnée, chez les femmes comme chez les hommes : le muscle dont on ne parle pas assez

*Le périnée est un muscle que tout le monde possède, mais dont on parle rarement. Pourtant, il joue un rôle clé dans la continence, la posture et la vie intime. Et le sport peut le solliciter, en bien comme en moins bien. Faisons le point, sans tabou.*



**1re**
intention : la rééducation contre les fuites à l'effort

SANTÉ AU FÉMININ

POUR NOS CLIENTS ACTIFS · 5 MIN DE LECTURE

01

## Le périnée, c'est quoi ?

Le périnée, ou plancher pelvien, est un ensemble de muscles et de tissus qui ferment le bas du bassin, comme un hamac tendu entre l'os du pubis à l'avant, le coccyx à l'arrière et les deux ischions sur les côtés, ces os sur lesquels on s'assoit.

Il a plusieurs rôles essentiels :

- Il soutient les organes du bas-ventre : la vessie, l'intestin, et l'utérus chez la femme.
- Il participe à la continence, en contrôlant l'ouverture et la fermeture de l'urètre et de l'anus.
- Il contribue à la stabilité du tronc, en équipe avec le diaphragme, le transverse de l'abdomen et les muscles profonds du dos.
- Il joue un rôle dans la sexualité, chez les femmes comme chez les hommes.

> **Le périnée n'est pas qu'une affaire de femmes : tout le monde en a un, et tout le monde a intérêt à en prendre soin.**

02

## Quand le périnée se fragilise

Plusieurs situations peuvent affaiblir le périnée ou le mettre sous pression :

- La grossesse et l'accouchement, en particulier par voie basse.
- La ménopause, avec la baisse des œstrogènes qui modifie les tissus.
- Le surpoids, la toux chronique, la constipation, qui augmentent la pression sur le plancher pelvien.
- Chez l'homme, la chirurgie de la prostate.

- Certains sports à fort impact répétés, comme la course, les sauts, le trampoline, chez des personnes dont le périnée est déjà fragilisé.

Le signe le plus fréquent est la fuite urinaire à l'effort : en toussant, en éternuant, en riant, en sautant ou en soulevant une charge. C'est très fréquent, y compris chez des sportives jeunes qui n'ont jamais eu d'enfant. Ce n'est pas une fatalité, et cela se traite.

03

## Chez les femmes : ce que dit la science

En 2018, une revue Cochrane, qui fait référence dans le domaine médical, a rassemblé 31 essais sur la rééducation des muscles du plancher pelvien chez des femmes souffrant d'incontinence urinaire.

Ses conclusions :

- Les femmes qui suivaient un programme d'entraînement du périnée avaient beaucoup plus de chances de voir leurs fuites guérir ou s'améliorer que celles qui ne recevaient aucun traitement.
- C'était particulièrement net pour l'incontinence d'effort, la plus fréquente chez les sportives.
- Elles rapportaient aussi une meilleure qualité de vie.

Les auteurs recommandent cette rééducation comme traitement de première intention. En France, elle est généralement réalisée par une sage-femme ou un kinésithérapeute, sur prescription médicale.

Pendant la grossesse et après l'accouchement, la Haute Autorité de santé recommande aussi le renforcement des muscles du plancher pelvien, et conseille d'attendre que le périnée soit rééduqué avant de reprendre les activités à fort impact.

04

## Chez les hommes : ce que dit la science

Chez les hommes, la question se pose surtout après une chirurgie de la prostate, qui peut entraîner des fuites urinaires. Une revue Cochrane de 2015 a étudié la rééducation du périnée dans cette situation.

Ses conclusions sont plus prudentes : les bénéfices de la rééducation du plancher pelvien étaient incertains, et les études disponibles de qualité variable. Beaucoup d'hommes récupèrent spontanément une bonne continence dans l'année qui suit l'opération. La rééducation reste néanmoins souvent proposée par les urologues, et il est important de suivre leurs conseils.

En dehors de la chirurgie, prendre conscience de son périnée est utile pour tout le monde : pour mieux gérer les efforts de poussée, de port de charges, et pour la stabilité du tronc.

> **Une fuite urinaire à l'effort n'est pas une fatalité : chez la femme, la rééducation du périnée est le traitement de première intention.**

05

## Apprendre à le sentir

Voici un exercice simple, à faire en position assise ou allongée, au calme.



Le plancher pelvien, un hamac musculaire

- Inspire tranquillement, en laissant le ventre et le bas du bassin se relâcher.
- En expirant, imagine que tu retiens une envie d'uriner et un gaz en même temps, et que tu remontes doucement ces muscles vers l'intérieur, comme un ascenseur qui monte d'un étage.
- Les fesses, les cuisses et le ventre restent le plus relâchés possible.
- Tiens 3 à 5 secondes en continuant de respirer, puis relâche complètement pendant le même temps.
- Répète 8 à 10 fois.

Le relâchement est aussi important que la contraction. Attention, il ne faut pas s'entraîner en arrêtant le jet d'urine aux toilettes : cela peut perturber le fonctionnement normal de la vessie.

06

## Protéger son périnée pendant le sport

- Expire pendant l'effort : en soulevant une charge, en te relevant d'un squat, souffle plutôt que de bloquer ta respiration.
- Évite de pousser vers le bas en bloquant la respiration lors des efforts intenses.
- Intègre le périnée dans le gainage : une légère remontée du périnée à l'expiration accompagne bien le travail du transverse.
- Adapte les impacts si tu as des fuites : remplace temporairement les sauts par des exercices sans impact, et parles-en.

07

## Quand consulter

Fuites urinaires, sensation de pesanteur dans le bas-ventre, douleurs pendant les rapports, difficulté à retenir les gaz : ces signes méritent une consultation chez ton médecin, ta sage-femme ou un urologue. Ce sont des problèmes très courants et qui se soignent bien. Il n'y a aucune gêne à avoir, et tu peux aussi m'en parler en toute confidentialité pour que j'adapte ton programme.

### À RETENIR

- Le périnée soutient les organes, assure la continence et stabilise le tronc.
- Chez la femme, la rééducation est le traitement de première intention des fuites à l'effort.
- Chez l'homme après une chirurgie de la prostate, les bénéfices sont plus incertains.
- Expirer pendant l'effort et ne pas bloquer sa respiration protège le périnée.
- Fuites ou pesanteur : consulte, ça se traite bien.

SOURCES


- Dumoulin C., Cacciari L.P., Hay-Smith E.J.C., Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women, Cochrane Database of Systematic Reviews (2018) : https://doi.org/10.1002/14651858.CD005654.pub4
- Anderson C.A. et al., Conservative management for postprostatectomy urinary incontinence, Cochrane Database of Systematic Reviews (2015) : https://www.cochrane.org/CD001843
- Haute Autorité de santé, Activité physique et sportive : grossesse et post-partum, synthèse (2022) : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-08/synthese_aps_grossesse_post_partum_vf.pdf