SANTÉ

Diabète de type 2 : l'activité physique, un traitement à part entière

En France, la Haute Autorité de santé considère l'activité physique comme une véritable thérapeutique du diabète de type 2. Comment le mouvement agit sur la glycémie, quelles précautions prendre, et comment bien s'y mettre.



SANTÉ

POUR NOS CLIENTS ACTIFS · 4 MIN DE LECTURE

Cet article donne des informations générales. Si tu as un diabète, ton médecin reste le pilote de ton traitement : parle-lui de ton projet d'activité physique, surtout si tu prends de l'insuline ou certains médicaments.

01

Le diabète en deux mots


Le diabète de type 2 est une maladie dans laquelle le sucre du sang, le glucose, reste trop élevé. En cause, une résistance des cellules à l'action de l'insuline, l'hormone qui fait entrer le glucose dans les cellules, et une production d'insuline qui devient insuffisante avec le temps. Le surpoids, la sédentarité, l'alimentation, l'âge et l'hérédité en sont les principaux facteurs de risque.

Le diabète de type 1, lui, est une maladie auto-immune où le pancréas ne produit plus d'insuline. L'activité physique y est aussi bénéfique, mais elle demande une gestion particulière de l'insuline et de l'alimentation, à voir avec l'équipe médicale.

02

Pourquoi le mouvement agit sur le sucre

Quand tu bouges, tes muscles consomment du glucose. Et l'exercice a une particularité remarquable : il permet aux muscles de capter le glucose même quand l'insuline fonctionne mal. Après la séance, la sensibilité à l'insuline reste améliorée pendant plusieurs heures.



Le muscle capte le sucre

À plus long terme, l'activité régulière augmente la masse musculaire, qui est le principal réservoir de glucose du corps, aide à réduire la graisse abdominale et améliore la santé du cœur et des vaisseaux, souvent fragilisés par le diabète.

> **Pendant et après l'effort, les muscles captent le sucre même quand l'insuline fonctionne mal.**

03

Ce que disent les recommandations

En France, la Haute Autorité de santé a publié en 2018 un référentiel spécifique pour la prescription d'activité physique dans le diabète de type 2, dans le cadre du sport sur ordonnance. L'activité physique y est présentée comme une thérapeutique à part entière, seule ou associée aux médicaments.

L'Association américaine du diabète, dans sa prise de position de 2016, recommande notamment pour les adultes avec un diabète de type 2 :

- Au moins 150 minutes par semaine d'activité d'endurance d'intensité modérée à soutenue, réparties sur au moins trois jours, sans rester plus de deux jours consécutifs sans activité.
- Deux à trois séances de renforcement musculaire par semaine, sur des jours non consécutifs.
- Des exercices de souplesse et d'équilibre, en particulier pour les personnes plus âgées.
- Interrompre régulièrement le temps assis, en se levant pour bouger quelques minutes au moins toutes les 30 minutes.

04

L'astuce de la marche après le repas

Une courte marche de 10 à 15 minutes après les repas est une habitude simple et intéressante, car c'est souvent après le repas que la glycémie monte le plus. Beaucoup de personnes avec un diabète l'adoptent avec plaisir, et c'est facile à faire en famille.

05

Les précautions importantes

- Avant de commencer : parles-en à ton médecin. Selon ton âge, l'ancienneté du diabète et tes complications éventuelles, il pourra proposer un bilan, notamment cardiaque.
- Le risque d'hypoglycémie : il concerne surtout les personnes traitées par insuline ou par certains médicaments qui font baisser la glycémie. Ton médecin t'expliquera comment adapter ton traitement et ton alimentation. Garde toujours une source de sucre rapide sur toi pendant l'effort, et préviens-moi de ta situation.
- Les pieds : en cas de neuropathie, inspecte tes pieds après chaque séance et porte des chaussures adaptées.
- Les yeux et le cœur : certaines complications du diabète nécessitent d'éviter les efforts très intenses ou les blocages respiratoires. Ton médecin te le dira.
- L'hydratation : bois régulièrement.

> **Une source de sucre rapide toujours à portée de main, et ton médecin informé : les deux réflexes de base.**

06

Les signes d'hypoglycémie à connaître

Tremblements, sueurs, palpitations, faim soudaine, vertiges, troubles de la vision, difficulté à se concentrer. En cas de doute, on arrête l'effort, on mesure la glycémie si possible, et on prend du sucre rapide. Je garde un œil sur toi pendant les séances, mais c'est toi qui connais le mieux tes signaux : n'hésite jamais à me prévenir.

07

L'alimentation, partenaire de l'activité

- Des repas réguliers, avec des légumes, des légumes secs, des céréales complètes et une source de protéines.
- Moins de boissons sucrées et de produits sucrés.
- Les recommandations du programme Manger Bouger s'appliquent pleinement.
- Un accompagnement par un diététicien peut être très utile.

08

Comment je t'accompagne

- J'adapte le programme à ta situation médicale et aux consignes de ton médecin.
- On combine endurance et renforcement, avec une progression adaptée.
- On planifie les séances en tenant compte de tes repas et de ton traitement.
- On peut suivre ensemble ta régularité dans l'appli.

À RETENIR

- La HAS considère l'activité physique comme une thérapeutique du diabète de type 2.
- L'exercice améliore la sensibilité à l'insuline pendant plusieurs heures.
- Repères : 150 minutes d'endurance par semaine et 2 à 3 séances de renforcement.
- Une courte marche après les repas est une excellente habitude.
- Avis médical avant de commencer, et vigilance sur l'hypoglycémie si tu prends certains traitements.

SOURCES

- Haute Autorité de santé, Prescription d'activité physique et sportive : diabète de type 2 (2018) : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-10/ref_aps_dt2_vf.pdf
- Colberg S.R. et al., Physical Activity/Exercise and Diabetes: A Position Statement of the American Diabetes Association, Diabetes Care (2016) : https://doi.org/10.2337/dc16-1728
- Programme national nutrition santé, Manger Bouger, recommandations pour les adultes : https://www.mangerbouger.fr/