

## 6.S088 Problem Set 2

Suyeol Yun  
syyun@mit.edu

January 20, 2023

### Problem 3

$$K(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = e^{-L\|\mathbf{x}-\mathbf{x}'\|^2} = e^{-L\|\mathbf{x}\|^2} e^{-L\|\mathbf{x}'\|^2} e^{2L\langle \mathbf{x}, \mathbf{x}' \rangle} \quad (1)$$

For the term  $e^{2L\langle \mathbf{x}, \mathbf{x}' \rangle}$ , we use Taylor expansion of  $e^z$  around  $z = 0$  and geometry

$$e^{2L\langle \mathbf{x}, \mathbf{x}' \rangle} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (2L\langle \mathbf{x}, \mathbf{x}' \rangle)^k \quad (2)$$

Then we have

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x}' \rangle^k = \left( \sum_{i=1}^d \mathbf{x}_i \mathbf{x}'_i \right)^k = \sum_{j \in [d]^k} \left( \prod_{i=1}^k \mathbf{x}_{j_i} \right) \left( \prod_{i=1}^k \mathbf{x}'_{j_i} \right) \quad (3)$$

where  $j$  enumerates over all selections of  $k$  coordinates of  $\mathbf{x}$ . Then by plugging in (2), (3) to (1) results in

$$K(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \langle \phi(\mathbf{x}), \phi(\mathbf{x}') \rangle = \prod_{k=0}^{\infty} \prod_{j \in [d]^k} \phi_{k,j}(\mathbf{x}) \phi_{k,j}(\mathbf{x}')$$

$$\text{where } \phi_{k,j}(\mathbf{x}) = e^{-L\|\mathbf{x}\|^2} \frac{2L^{\frac{k}{2}}}{\sqrt{k!}} \prod_{i=1}^k \mathbf{x}_{j_i}$$