### Docteur Lassaad KALLEL

Psychiatre - Psychothérapeute

Thérapies Comportementales et Cognitives Mastère en Neurosciences Ancien Assistant des Hôpitaux de Lyon الحكيم نسعد القالال

اختصاصي في الأمراض النفسية و العلاج النفسي

ماجستير في العلوم العصبية

mercredi 1 juin 2022

المعرف التعاقدي: 1/11938/7 : Code conventionnel


## Mme Leila Memni

1. LAMICTAL 25mg: 1 - 0 - 1 pendant quinze jours ensuite LAMICTAL 50mg: 1 - 0 - 1.

2. RETABLISS 20mg: 1 - 0 - 0.

N° 716 402 N° 716 402

Traitement pour un mois.



61، شارع المغرب العربي الكبير - إقامة النسرين - مدرج 1 - الطليق الثانلي - عيادة ج 12 - 2036 سكرة - تونس

# DER ET HELALI PH WAHAT

Av Khaled Ibn Walid Ain Zaghouan nord - TUN Tél:

1437969HBM000 Fisc.: Matricule Exécution d'une ordonnance

Identité du malade : ID Bénéficiaire :

Code du prescripteur :

Date de la prescription :

Régime: Remboursement Date

de dispensation :

CHAIMA 2

Exécuteur:

CNSS/CNRPS du malade:

01/06/2022

01/06/2022

MAF: 1437969 H/B/B/000/


pharmacien: 2/2200/66 Référence CNAM du

Code PCT	Produit	Forme	Ote	PUV	Mt. Percu	N.I.O	PR/Lot
103171	LAMICTAL 25MG COMP DISPER BT/30	COMPRI	-	6,695	6,695		>
103392	LAMICTAL 50 MG COMP DISPER B/30	COMPRI	-	8,436	8,436		>
301870	RETABLISS 20 BTE 30 - COMPRIME	COMPRI	1	42,556	42,556		>
Tatal - 57 697							

à la somme de : Arrétée

Cinquante sept dinars six cent quatre-vingt sept millimes


et bon rétablissement >> << Merci



STE KHEDER ET HELALI PH WAHAT

9/

Tél: Av Khaled Ibn Walid Ain Zaghouan nord - TUN Matricule Fisc.: 1437969HBM000



# Lamictal Lamotrigine

LAMICTAL 2 mg, comprimé dispersible ou à croquer LAMICTAL 5 mg, comprimé dispersible ou à croquer LAMICTAL 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer LAMICTAL 50 mg, comprimé dispersible ou à croquer LAMICTAL 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer LAMICTAL 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous à été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice?

Qu'est-ce que LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer et dans quels cas est-il utilisé ?

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ?

Comment prendre LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ?

Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comment conserver LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ?

Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC: N03AX09

LAMICTAL appartient au groupe de médicaments appelés anti-épileptiques. Il est utilisé pour traiter 2 maladies - l'épilepsie et les troubles bipolaires.

LAMICTAL traite l'épilepsie en bloquant les signaux du cerveau qui déclenchent les crises d'épilepsie (convulsions).

Chez les adultes et les enfants âgés de 13 ans et plus, LAMICTAL peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments, pour traiter l'épilepsie. LAMICTAL peut également être utilisé avec d'autres médicaments pour traiter les crises survenant dans une maladie appelée syndrome de Lennox-Gastaut.

Chez les enfants âgés de 2 à 12 ans, LAMICTAL peut être utilisé avec d'autres médicaments, pour traiter ces maladies. Il peut être

utilisé seul pour traiter un type d'épilepsie appelé crises d'absences typiques.

LAMICTAL traite également les troubles bipolaires.

Les personnes ayant des troubles bipolaires (parfois appelés maniaco-dépression) ont des variations d'humeur extrêmes, avec des périodes maniaques (excitation ou euphorie) alternant avec des périodes de dépression (profonde tristesse ou désespoir). Chez les adultes âgés de 18 ans et plus, LAMICTAL peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments, pour prévenir les périodes de dépression qui surviennent dans les troubles bipolaires. On ne sait pas encore comment LAMICTAL agit dans le cerveau pour avoir cet effet.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ? Ne prenez jamais LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer :

si vous êtes allergique (hypersensible) à la lamotrigine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Si vous êtes concerné:

→ Parlez-en à votre médecin et ne prenez pas LAMICTAL.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre LAMICTAL :

si vous avez des problèmes de reins

si vous avez déjà développé une éruption cutanée après avoir pris de la lamotrigine ou tout autre médicament pour les troubles bipolaires ou l'épilepsie

si vous avez déjà développé une méningite après avoir pris de la lamotrigine (lisez le descriptif des symptômes dans la rubrique 4 de cette notice : effets indésirables rares)

si vous prenez déjà un médicament contenant de la lamotrigine

si vous souffrez du syndrome de Brugada. Le syndrome de Brugada est une maladie génétique entraînant une activité électrique anormale du cœur. Ces anomalies de l'électrocardiogramme (ECG), pouvant entraîner des arythmies (rythme cardiaque anormal), peuvent être déclenchées par la lamotrigine. Parlez-en à votre médecin si vous pensez avoir cette maladie.

Si vous êtes concerné:

→ Parlez-en à votre médecin, il pourrait décider de diminuer la dose ou que LAMICTAL ne vous convienne pas. Informations importantes concernant des réactions pouvant potentiellement mettre en jeu le pronostic vital





N°61-: 212V

LAMICTAL 2 mg, comprimé dispersible ou à croquer LAMICTAL 5 mg, comprimé dispersible ou à croquer LAMICTAL 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer LAMICTAL 50 mg, comprimé dispersible ou à croquer LAMICTAL 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer LAMICTAL 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rabrique 4.

Que contient cette notice?

Qu'est-ce que LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ?

Comment prendre LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer?

Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comment conserver LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer?

Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC: N03AX09

LAMICTAL appartient au groupe de médicaments appelés anti-épileptiques. Il est utilisé pour traiter 2 maladies - l'épilepsie et les troubles bipolaires.

LAMICTAL traite l'épilepsie en bloquant les signaux du cerveau qui déclenchent les crises d'épilepsie (convulsions).

• Chez les adultes et les enfants âgés de 13 ans et plus, LAMICTAL peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments, pour traiter l'épilepsie. LAMICTAL peut également être utilisé avec d'autres médicaments pour traiter les crises survenant dans une maladie appelée syndrome de Lennox-Gastaut.

Chez les enfants âgés de 2 à 12 ans, LAMICTAL peut être utilisé avec d'autres médicaments, pour traiter ces maladies. Il peut être utilisé seul pour traiter un type d'épilepsie appelé crises d'absences typiques.

LAMICTAL traite également les troubles bipolaires.

Les personnes ayant des troubles bipolaires (parfois appelés maniaco-dépression) ont des variations d'humeur extrêmes, avec des périodes maniaques (excitation ou euphorie) alternant avec des périodes de dépression (profonde tristesse ou désespoir). Chez les adultes âgés de 18 ans et plus, LAMICTAL peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments, pour prévenir les périodes de dépression qui surviennent dans les troubles bipolaires. On ne sait pas encore comment LAMICTAL agit dans le cerveau pour avoir cet effet.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ? Ne prenez jamais LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer :

si vous êtes allergique (hypersensible) à la lamotrigine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Si vous êtes concerné:

→ Parlez-en à votre médecin et ne prenez pas LAMICTAL.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre LAMICTAL :

si vous avez des problèmes de reins

si vous avez déjà développé une éruption cutanée après avoir pris de la lamotrigine ou tout autre médicament pour les

troubles bipolaires ou l'épilepsie si vous avez présenté une éruption cutanée ou un coup de soleil après avoir pris de la lamotrigine et après vous être exposé au soleil ou à une lumière artificielle (par exemple, un solarium). Votre médecin vérifiera votre traitement et pourra vous conseiller d'éviter toute exposition au soleil ou de vous protéger contre le soleil (par exemple, utilisation d'un écran solaire et/ou port de vêtements de protection)

• si vous avez déjà développé une méningite après avoir pris de la lamotrigine (lisez le descriptif des symptômes dans la

rubrique 4 de cette notice : effets indésirables rares)

si vous prenez déjà un médicament contenant de la lamotrigine si vous souffrez du syndrome de Brugada. Le syndrome de Brugada est une maladie génétique entraînant une activité électrique apormale de Brugada. Le syndrome de Brugada est une maladie génétique entraîner des anythmies (nythme c électrique anormale du cœur. Ces anomalies de l'électrocardiogramme (ECG), pouvant entraîner des arythmies (rythme cardiaque anormal), peuvent être déclenchées par la lamotrigine. Parlez-en à votre médecin si vous pensez avoir cette maladie. Si vous êtes concerné:

→ Parlez-en à votre médecin, il pourrait décider de diminuer la dose ou que LAMICTAL ne vous convienne pas. Informations importantes concernant des réactions pouvant notentiellement mettre en ieu le pronostic vital



الشركة التونسية الأوروبية للتأمين و إعادة التأمين Compagnie d'Assurances et de Réassurances Iuniso-Européenne

S.A au capital de 25.000,000 Dinars - R.C : B 18794 1997 Immeuble Carte, Lot BC4 - Centre Urbain Nord, 1082 Tunis Tel : +216 71 184 000 - Fax : +216 71 184 184

### Bulletin de soins

N°

Partie à remplir par l'Adhérent
N° CNAM
Adhésion N° 21079458
Employeur: FIS Adhérent: Nom: ZAIRI
Adhérent: Nom:
Prénoms: SOFIANE
Adresse:
Emploi Senior Manager
Qui est malade : l'Adhérent - Le Conjoint ) - l'Enfant -
Nature de la maladie :
Visa de l'Employeur, Visa de l'Adhérent,
M-

### N'OUBLIEZ RIEN

Vous éliminez toute correspondance inutile.

Nos règlements seront alors rapides

	A	REMPLIR PAR L	ES PROF	ESSI O	NELS DE SANT	TÉ	
					dans le cadre de :		
APCI		MO		Hospitalisation Suivi de Grossesse			sesse
co	de APCI		,	0	Date pr	évue d'accouchement	
NOM I	ET PRENOM DU MA	LADE:	Lei	LC.	1 em	mi	
	DATE	DESIGNATION	HINDINABEL		CODE. CNAM	MATRICULE	& SIGNATURE
ions	01/01		709		E CHAMIT	12.00° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00°	1 750 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ultat Visit	1/06/22 psy		10		OP 11938	9 3 6 5 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	85000
Sons	5				7	6 6 6 6 6 6	500000000000000000000000000000000000000
					3,3	15 10 0 0 1 5 TO	16.02 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
		Joindre obligatoires	ment la pres	cription i	nédicale précisant l'a	cte effectué	800 TO 1/2
aux aux	DATE	CODE ACTE	HONORA	ONORAIRES CO!		MATRICULE FISCAL	CACHET & SIGNATURE
Médic					Cryon	FISCAL	a signatural circ
t Para							
70		Joindre obligatoire	ement les co	des des au	tes et la prescription	médicale	
				CODE		ATRICULE FISCAL	CACHET & SIGNATURE
	DATE MONŢANT			CNAM		FISCAL	a Signature
logie				3			
Biole et Radi							
STATE OF STATE OF						1	
	*En	cas d'accouchement jo	oindre oblige	atolremer	t l'extrait de naissan	ce du nouveau-né	
tion	DATE *En	cas d'accouchement jo	oindre obliga	tolremer (OD	E M	ce du nouveau-né ATRICULE FISCAL	CACHET & SIGNATURE
uchement			oindre oblige	COD	E M	ATRICULE	
Accouchement			oindre obliga	COD	E M	ATRICULE	
Accouchement			oindre obliga	COD	E M. E M.	ATRICULE	
Accoud	DATE	MONTANT  MONTANT	oindre obliga	COD	E M. E M.	ATRICULE	& SIGNATURE  CACHET
Accoud	DATE	MONTANT  MONTANT	oindre obliga	COD	E M. E M.	ATRICULE	& SIGNATURE  CACHET
harmacie	DATE	MONTANT  MONTANT	oindre obliga	COD	E M. E M.	ATRICULE	& SIGNATURE  CACHET
Accou	DATE	MONTANT  MONTANT	oindre oblige	COD	E M. E M.	ATRICULE	& SIGNATURE  CACHET
harmacie	DATE	MONTANT  MONTANT	oindre oblige	COD	E M. E M.	ATRICULE	& SIGNATURE  CACHET
harmacie	DATE	MONTANT  MONTANT	oindre oblige	COD	E M. E M.	ATRICULE	& SIGNATURE  CACHET
harmacie	DATE	MONTANT  MONTANT		COD	E M. E M.	ATRICULE	& SIGNATURE  CACHET
harmacie	DATE	MONTANT  SA, (8A)  VIGNETTE RETABLISS 20 MG	1/2//	COD	E M. E M.	ATRICULE	& SIGNATURE  CACHET
harmacie	DATE	MONTANT  MONTANT		COD	E M. E M.	ATRICULE	& SIGNATURE  CACHET
harmacie	DATE	MONTANT  MONTANT  SA, (1)  VIGNETTE RETABLISS 20 Mc Comp pelliculés BT/		COD	E M. E M.	ATRICULE	& SIGNATURE  CACHET
harmacie	DATE	MONTANT  MONTANT  SA, (1)  VIGNETTE RETABLISS 20 Mc Comp pelliculés BT/		COD	E M. E M.	ATRICULE	& SIGNATURE  CACHET
harmacie	DATE	MONTANT  MONTANT  SA, (1)  VIGNETTE RETABLISS 20 Mc Comp pelliculés BT/		2/2/200 COD COD COD	DE MARIA  DOMA  DO	ATRICULE FISCAL  ATRICULE FISCAL  ATRICULE FISCAL	& SIGNATURE  CACHET & SIGNATURE
harmacie	DATE	MONTANT  MONTANT  SA, (8)  VIGNETTE RETABLISS 20 MC Comp pelliculés BT/Prix: 42,400+0,240 D	Avis impo	COD CINIC	E M. DE M. DO/66	ATRICULE FISCAL  ATRICULE FISCAL  ATRICULE  AT	CACHET & SIGNATURE
Pharmacie Hospit	DATE  DATE  OA(061202)  Continue soins doit êten de	MONTANT  MONTANT  SA, (8)  VIGNETTE RETABLISS 20 MC Comp pelliculés BT/Prix: 42,400+0,240 D	Avis impo	COD CINK	ولا الا المريف واحد. المنصوص عليها الا المريف واحد. عفويات المنصوص عليها الا المريف واحد.	ATRICULE FISCAL  ATRICULE FISCAL  3/969 HIBMON  ALL  ALL  ALL  ALL  ALL  ALL  ALL  A	CACHET & SIGNATURE

- BURLLLEL