



الشركة التونسية الأوروبية للتأمين و إعادة التأمين  
Compagnie d'Assurances et de Réassurances Tuniso-Européenne

S.A au capital de 25.000.000 Dinars - R.C : B 18794 1997  
Immeuble Carte, Lot BC4, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis, Tunisie  
Tél.: +216 71 184 000 - Fax : +216 71 184 184  
contact@carte.com.tn www.carte.tn

## BULLETIN DE SOINS

N° CNAM :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Adhésion N° : 01079458 Employeur : FIS

### PARTIE A REMPLIR PAR L'ADHERENT

#### ADHERENT

Nom : ZAIRI  
Prénom : SOFIANE  
Adresse : /  
Emploi : Senior Manager

#### MALADE

Adhérent ☐ Conjoint ☐ ☒ X Enfant

Nature de la maladie : .....

Visa de l'Employeur

Visa de l'Adhérent

#### N'OUBLIEZ RIEN

Vous éliminez toute correspondance inutile.  
Nos règlements seront alors rapides







Docteur Slim Kallala

Ophtalmologiste  
Maladie et chirurgie des yeux

الحكيم سليم قلالة

إختصاصي في أمراض وجراحة العيون

12 JUL. 2022

Asan Zen

- (1) Augflosh 10 24/10/20
- (2) Tobinor 10 3
- (3) Follis 10 6 6/10/20

Dr KALLALA SLIM  
OPHTALMOLOGISTE  
5, Rue Naceur Bey - La Marsa  
Tél: 71.749.809

5, rue Naceur Bey, La Marsa

kallalaslim@dr.com  
الهاتف 71 749 809 (00 216) Tél.  
الجوال 54 649 809 (00 216) GSM

5 نهج الناصر بي، المرسى



**PHARMACIE**

Bousnina Maha

Res. Diar Soukra Ain Zaghuan. 2045

Tél : 70727260 / Fax : 70727261

Code TVA : 928492P/D/C/000

FACTURE N° 61186

Date : 12/07/2022

Code PCT	Articles	Qté	Prix Ht	Tva	Total
105116	ALLERGIFLASH COLLYRE B/10 /	2	18.153	0.00	36.306
302240	TOBRACORT 5ML COLLYRE /	1	4.271	0.00	4.271
101922	FRAKIDEX PD / PDE OPH	1	1.993	0.00	1.993

Taux TVA    Base

Total HT	42.570
Total TVA	0.000
Total TTC	42.570

Arrêtée la présente facture à la somme de :  
quarante deux Dinars 570 millimes.

Pharmacie Maha Bousnina  
Rés. Diar Soukra Ain Zaghoun  
Tél: 70 727 260 - 70 727 261



# FRAKIDEX®

Pommade ophtalmique  
Phosphate sodique de dexaméthasone - Sulfate de framycétine

**Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.**

Elle contient des informations importantes sur votre traitement et sur votre maladie.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Les substances actives sont : pour ..... 100 g  
Dexaméthasone (phosphate sodique de) ..... 0,1 g  
Framycétine (sulfate de) ..... 315 000 UI  
Les autres composants sont : vaseline et paraffine liquide.

**DÉTENTEUR DE LA D.E./AMM:**

**LABORATOIRE CHAUVIN**

416, rue Samuel Morse - CS 99535  
34961 Montpellier Cedex 2, France

**Nom et adresse du fabricant / conditionneur:**

**Dr. Gerhard Mann**

Chem.-pharm. Fabrik GmbH  
Brunsbütteler Damm 165/173  
13581 Berlin, Allemagne

**Distribué au Maroc par:**

**Zenith pharma**

96, Zone Industrielle. Tassila Inezgane.  
Agadir Maroc

AMM France n° 326 452 1 3  
CLV Algérie n° 096/17D125/01  
AMM Tunisie n° 5283073  
Médicament liste I

## 1. QU'EST-CE QUE FRAKIDEX®, Pommade ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Tube de 5 g.

Ce médicament est une pommade ophtalmique contenant :

- un antibiotique de la famille des aminosides : la framycétine,
- et un corticoïde : la dexaméthasone.

Ce médicament est indiqué dans le traitement local de certaines inflammations et infections de l'oeil et des paupières :

- après chirurgie de l'oeil,
- dans des infections avec inflammation, dues à des bactéries pouvant être combattues par l'antibiotique contenu dans ce médicament.

## 2. INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT D'UTILISER FRAKIDEX®, Pommade

Ne pas utiliser FRAKIDEX®, Pommade dans les cas suivants :

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de la pommade, notamment à la framycétine (antibiotique de la famille des aminosides),

- Infection débutante de l'oeil d'origine virale,
- Affection mycosique.

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ, sauf avis contraire de votre médecin :

- pendant la grossesse et l'allaitement

particulier s'il s'agit d'un collyre et même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Notamment des médicaments pouvant donner certains troubles du rythme cardiaque (astémizole, bédridil, érythromycine en injection intra-veineuse, halofantine, pentamidine, sparfloxacine, terfenadine, sultopride, vincamine).

Informez votre médecin si vous utilisez du ritonavir ou du cobicistat, car cela peut augmenter la quantité de dexaméthasone dans votre sang.

### **Surdosage:**

Aucun surdosage n'a été rapporté. Cependant, des applications répétées de façon prolongée peuvent entraîner un passage systémique non négligeable des principes actifs, une hypertension oculaire, opacification du cristallin, kératite superficielle et retard de cicatrisation. De ce fait, une surveillance ophtalmique particulièrement attentive est nécessaire.

## 3. COMMENT UTILISER FRAKIDEX®, Pommade ?

Voie locale. En application oculaire. Se laver soigneusement les mains. Eviter de toucher l'oeil et les paupières avec l'embout du tube. Reboucher le tube après utilisation. 1 à 3 applications par jour.

Appliquer une quantité équivalente à un grain de blé dans le cul de sac conjonctival inférieur de l'oeil malade ou des yeux malades et éventuellement sur le bord de la paupière.

Pour ce faire, tirer la paupière vers la bas tout en regardant vers le haut et déposer la pommade entre la paupière et le globe oculaire. Ne pas toucher l'oeil et les paupières avec l'extrémité du tube.

Reboucher le tube de pommade après utilisation.

La durée du traitement est en moyenne de 7 jours.

Conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin. Ne prolongez pas le traitement sans avis médical.

Un traitement plus long ou des applications plus fréquentes peuvent vous être prescrits.

Si vous avez l'impression que l'effet de FRAKIDEX®, Pommade est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez utilisé FRAKIDEX®, Pommade plus de fois que vous n'auriez dû : consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre FRAKIDEX®, Pommade : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre. Appliquez la dose oubliée dès que possible. Toutefois, si le moment est presque venu de prendre la dose suivante, omettez la dose oubliée. En cas de doute, n'hésitez pas à prendre l'avis de votre médecin.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, FRAKIDEX®, Pommade, est susceptible d'avoir des effets indésirables Possibilité :

- d'irritation locale transitoire : prurit, gonflement des paupières et rougeur de l'oeil,
- de sensation de brûlure, larmolement, gêne.

Risque :

- de réaction d'hypersensibilité,
- en usage prolongé, d'augmentation de la pression oculaire, d'opacification du cristallin, de kératite superficielle,
- de retard de cicatrisation, de surinfection
- Fréquence indéterminée : vision floue.
- Problèmes hormonaux : croissance de poils sur le corps (en particulier chez les femmes), faiblesse et