			1000				-				1	0								
	Date						Date			-	/22	100/	Date		Z	C	A			
	Montant	Joindre o					Code Acte	Joind			0 1	Com	Désignation		NOM & PRENOM DU MALADE	Code APCI	APCI		AF	
	itant	bligatoirement les	BIOLO				Honoraires	lre obligatoiremer	AC	6100	psy	70%	Honoraires	CONSU	DU MALADE	Date	8	Soins effectu	REMPLIR PAR	
Avis important	Code CNAM et MF du professionnel de santé	Joindre obligatoirement les codes des actes et la prescription médicale	BIOLOGIE & RADIOLOGIE				Code CNAM et MF du professionnel de santé	Joindre obligatoirement la prescription précisant l'acte effectué	ACTES MEDICAUX	Mall drive	02.000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	Lassopsylet G. 69,000 m	du protessionnal de santé	CONSULTATIONS ET VISITES	Mor Laila	Date prévue d'accouchement	Hospitalisation Suit	Soins effectués ou Prescrits dans le cadre de	A REMPLIR PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTE	
	Cachet & Signature	n médicale					Cachet & Signature	ffectué	em V	O CO		Sapsyot To Sale	Cachet Signatur	South South	Memoni	- I management l'accommendation	Suivi de grossesse		SANTE	
						The second second	1					71	1/0	, Da			Dai	,		1

PHARM

Res. Diar So Tél:707272 Code TVA:

Code PCT

103174 301870

Taux TVA

*En cas d'accouchement joindre obligatoirement l'extrait de naissance du nouveau-né

ACCOUCHEMENT* - HOSPIII

Montant

Code clinique

Matricule Fiscal

Cachet & Signature

Montant

PHARMACIE

Code CNAM et MF

RIC Sall Sall Signature

JANG DAGE

Sausavina Sousavina Tori 261

- Ce bulletin doit être rempli soigneusement et avec la plus grande précision.
- Ce bulletin ne peut servir que pour un seul malade.
 Toute fraude ou fausse déclaration est passible des poursuites judiciaires et des sanctions prévues par la

VIGNETTE
RETABLISS 20 MG
Comp pelloules BT/30
Prix 42,400+0,240 DT « كل تديس أو تزوير بعرض صاحبه التنبعات العدلية والعقوبات النصوص عليها في القانون الجاري به العمل.

· يجب تحرير هذه العقبوعة بكل دقة وعناية.

· لا يمكن استعمال هذه البطاقة الا لريض واحد.

Docteur Lassaad KALLEL

Psychiatre - Psychothérapeute

Thérapies Comportementales et Cognitives Mastère en Neurosciences Ancien Assistant des Hôpitaux de Lyon الحكيم لسعد القلال

اختصاصي في الأمراض النفسية و العلاج النفسي

ماجستير في العلوم العصبية

S. Dia Bousninjeudi 1 septembre 2022

المعرف التعاقدي: 11938/7 /261 /Code conventionnel

Mme Leila Memmi

1. LAMICTAL 200mg: 1 - 0 - 0.

2. RETABLISS 20mg: 1 - 0 - 0.

Traitement pour un mois.

601 مشارع المغرب العربي الكبير – إقامة النسرين – مدرج 1 / الطبق الثاني – عيادة ج 2 م 2036 مسكرة – تونس 61, Boulerand de l'UMA - Résidence ENNESRINE - 2ème étage, Cabinet G12 - 2036 La Soukra - Tunis Tél : +216 70 696 052 / +216 71 691 048 / +216 29 196 052 - E-mail : Dr.Kallel@gmail.com

PHARMACIE

Bousnina Maha

Tél: 70727260 / Fax: 70727261 Res. Diar Soukra Ain Zaghouan. 2045

Code TVA: 928492P/D/C/000


FACTURE Nº 61754

Date : 01/09/2022

Code PCT	Artides	8	Oté Prix Ht	Tva Total
103174	LAMICTAL 200MG CP DISP B/30 /		1 18.044	0.00
301870	RETABLISS 20 B/30 / COMPRIMES		1 42.476 0.00	0.00
			Total HT	
AVI XDE	Hase		Total TVA	
			Total TTC	

Arrêtée la présente facture à la somme de :

cinquante huit Dinars 520 millimes



ouveau-né

het & Signature

Lamictal Lamotrigine

LAMICTAL 2 mg, comprimé dispersible ou à croquer LAMICTAL 5 mg, comprimé dispersible ou à croquer LAMICTAL 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer LAMICTAL 50 mg, comprimé dispersible ou à croquer

LAMICTAL 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer LAMICTAL 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

lls affectent plus d'1 personne sur 10 :

> Demandez conseil à votre en élecin sur comment Si vous arrêtez de prendre LAMICIAL, combrime d'a

N'àrrêtez pas LAMICTAL sans un avis :

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Céci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

- Qu'est-ce que LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer et dans quels cas est-il utilisé ? 19 29 L et pond un elegant membersible ou à croquer et dans quels cas est-il utilisé ? 19 29 L et pond un elegant membersible ou à croquer et dans quels cas est-il utilisé ? 19 29 L et pond un elegant membersible ou à croquer et dans quels cas est-il utilisé ? 19 29 L et pond un elegant membersible ou à croquer et dans quels cas est-il utilisé ? 19 29 L et pond un elegant membersible ou à croquer et dans quels cas est-il utilisé ? 19 29 L et pond un elegant membersible ou à croquer et dans quels cas est-il utilisé ? 19 29 L et pond un elegant membersible ou de croquer et dans quels cas est-il utilisé ? 19 29 L et pond un elegant membersible ou de croquer et dans quels cas est-il utilisé ? 19 29 L et pond un elegant membersible ou de croquer et dans quels cas est-il utilisé ? 19 29 L et pond un elegant membersible et de croquer et dans quels cas est-il utilisé et de croquer et dans quels cas est elemps de croquer et dans quels et dans quels et dans et de croquer et dans et dans et de croquer et dans et de croquer et dans et de croquer et dans et dans et dans et de croquer et dans et da
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ? Le prendre prendre l'AMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ?
- Comment prendre LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ? 3.
- Quels sont les effets indésirables éventuels?
- 5. Comment conserver LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

QU'EST-CE QUE LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC: N03AX09

d'hypersensibilité médicamen euse avec ensironale LAMICTAL appartient au groupe de médicaments appelés anti-épileptiques. Il est utilisé pour traiter 2 maladies - l'épilepsie et les

LAMICTAL traite l'épilepsie en bloquant les signaux du cerveau qui déclenchent les crises d'épilepsie (convulsions).

- Chez les adultes et les enfants âgés de 13 ans et plus, LAMICTAL peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments, pour traiter Chez les aduites et les enfants ages de 13 ans et plus, d'uniter peut de de la différence de la différence de l'épilepsie. LAMICTAL peut également être utilisé avec d'autres médicaments pour traiter les crises survenant dans une maladie
- appelée syndrome de Lennox-Dastaut.
 Chez les enfants âgés de 2 à 12 ans, LAMICTAL peut être utilisé avec d'autres médicaments, pour traiter ces maladies. Il peut être un gonstement des ganquons lymphatiques

LAMICTAL traite également les troubles bipolaires.

Les personnes ayant des troubles bipolaires (parfois appelés maniaco-dépression) ont des variations d'humeur extrêmes, avec des périodes maniaques (excitation ou euphorie) alternant avec des périodes de dépression (profonde tristesse ou désespoir). Chez les adultes âgés de 18 ans et plus, LAMICTAL peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments, pour prévenir les périodes de dépression qui surviennent dans les troubles bipolaires. On ne sait pas encore comment LAMICTAL agit dans le cerveau pour avoir cet effet.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer ? Ne prenez jamais LAMICTAL, comprimé dispersible ou à croquer : necrolyse épidermique toxique, votre médicrin vous aré-

si vous êtes allergique (hypersensible) à la lamotrigine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, ordany. Si vous êtes concerné: Effets indésirables très fréquents

→ Parlez-en à votre médecin et ne prenez pas LAMICTAL.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre LAMICTAL :

- si vous avez des problèmes de reins
- si vous avez déjà développé une éruption cutanée après avoir pris de la lamotrigine ou tout autre médicament pour les ps Effets indésirables fréquents ils affectent jusqu'à 1 personne sur 10 ;
- si vous avez déjà développé une méningite après avoir pris de la lamotrigine (lisez le descriptif des symptômes dans la rubrique 4 de cette notice : effets indésirables rares)
- si vous prenez déjà un médicament contenant de la lamotrigine

si vous souffrez du syndrome de Brugada. Le syndrome de Brugada est une de Brugada est un electrique anormale du amu



الشركة التونسية الأوروبية للتأمين و إعادة التأمين Compagnie d'Assurances et de Réassurances Tuniso-Européenne

S.A au capital de 25.000.000 Dinars - R.C : B 18794 1997 Immeuble Carte, Lot BC4, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis, Tunisie Tél.: +216 71 184 000 - Fax: +216 71 184 184 www.carte.tn contact@carte.com.tn

BULLETIN DE SOINS

Adhésion N° :(<u> </u>
	PARTIE	A REMPLI	R PAR L'ADH	IERENT	
		ADH	ERENT		
Nom:	ZPII	2 T			
Prénom :	SOF:	<u> PAN</u>			
Adresse:	Sen	in N	Lanager		
		MA	ALADE		
Adhérent		K	Conjoint		Enfant
Nature de la	maladie :				***************************************

N'OUBLIEZ RIEN

Visa de l'Employeur

Vous éliminez toute correspondance inutile. Nos règlements seront alors rapides