

トルリシティの温度管理にご注意ください

トルリシティを
自宅に持ち帰ったら
速やかに冷蔵庫(2～8℃)に
入れてください

冷蔵庫(2～8℃)に
保存する



冷蔵庫が使用できない場合、室温(1～30℃)で
14日間まで保存できますが、
30℃を超える場所で保存しないでください。

自動車の中など
高温になる場所に
放置しない



直射日光が
あたる場所に
放置しない



凍結させないでください。
もし凍結した場合は、使用しないでください。

冷凍庫には
入れない



冷気の吹き出し口の
近くは避ける





糖尿病患者さんのための情報サイト:Lilly Diabetes

www.diabetes.co.jp

スマートフォンでも



Diabetes.co.jp

検索

このサイトでは、

トルリシティ®皮下注0.75mgアテオス®の使い方を
動画でもご紹介しています

トップページから、

「弊社製品をお使いの皆さまへ」→「トルリシティ®皮下注0.75mgアテオス®の使い方」の
順にお進みください。

●ご質問等は、主治医にご相談いただくか、下記までお問合せください。

大日本住友製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町2-6-8

くすり情報センター

TEL 0120-885-736 ※1

受付時間：月曜日～金曜日9:00～17:30 ※2

日本イーライリリー株式会社

〒651-0086 神戸市中央区磯上通7-1-5

Lilly Answers リリーアンサーズ

TEL 0120-245-970 ※1

受付時間：月曜日～金曜日8:45～17:30 ※2

時間外お問合せ窓口：注入器に関するお問合せのみ受付

TEL 0120-245-970 ※1

受付時間：平日17:30～22:00、土曜日・祝祭日8:45～22:00
(日曜日は受け付けておりません)

※1 通話料は無料です。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。 ※2 祝祭日および当社休日を除きます。