

Numer indeksu:

Logika dla informatyków
Egzamin poprawkowy (część licencjacka)
18 lutego 2012

Zadanie 1 (1 punkt). Jeśli formuła $(p \Rightarrow q) \Rightarrow ((r \Rightarrow q) \Rightarrow (p \Rightarrow r))$ jest tautologią, to w prostokąt poniżej wpisz słowo „TAUTOLOGIA”. W przeciwnym przypadku wpisz odpowiedni kontrprzykład.

Zadanie 2 (1 punkt). Jeśli formuła $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r) \wedge (r \Rightarrow \neg p)$ jest sprzeczna, to w prostokąt poniżej wpisz słowo „SPRZECZNA”. W przeciwnym przypadku wpisz odpowiedni kontrprzykład.

Zadanie 3 (1 punkt). Jeśli istnieje formuła zbudowana ze zmiennych zdaniowych, spójników \Rightarrow i \neg oraz nawiasów równoważna formule $p \vee q$, to w prostokąt poniżej wpisz dowolną taką formułę. W przeciwnym przypadku wpisz słowo „NIE”.

Zadanie 4 (1 punkt). W prostokąty obok zdań prawdziwych wpisz słowo „TAK”. W prostokąty obok zdań fałszywych wpisz słowo „NIE”.

1. Formuła $p \vee q$ jest w koniunkcyjnej postaci normalnej.

2. Formuła $p \vee q$ jest w dysjunkcyjnej postaci normalnej.

3. Formuła $p \wedge q$ jest w koniunkcyjnej postaci normalnej.

4. Formuła $p \wedge q$ jest w dysjunkcyjnej postaci normalnej.

Zadanie 5 (1 punkt). Niech ϕ i ψ oznaczać formuły rachunku kwantyfikatorów, być może zawierające wolne wystąpienia zmiennej x . Jeśli formuła

$$(\forall x \phi) \Rightarrow ((\exists x \psi) \Rightarrow \exists x (\phi \Rightarrow \psi))$$

jest prawem rachunku kwantyfikatorów, to w prostokąt poniżej wpisz słowo „TAK”. W przeciwnym razie w prostokąt poniżej wpisz odpowiedni kontrprzykład.

Zadanie 6 (1 punkt). W prostokąt poniżej wpisz formułę równoważną formule

$$\neg(\exists x (p(x) \vee q(x)) \Rightarrow r(x)),$$

w której argumentem spójnika negacji może być jedynie formuła atomowa $p(x)$, $q(x)$ lub $r(x)$.

Zadanie 7 (1 punkt). Jeśli dla wszystkich formuł ϕ i ψ logiki pierwszego rzędu formuła

$$(\forall x (\phi \vee \psi)) \Leftrightarrow (\forall x \phi) \vee (\forall x \psi)$$

jest tautologią, to w prostokąt poniżej wpisz słowo „TAUTOLOGIA”. W przeciwnym przypadku wpisz odpowiedni kontrprzykład.

Zadanie 8 (1 punkt). Jeśli równość $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ zachodzi dla dowolnych zbiorów A , B i C , to w prostokąt poniżej wpisz słowo „TAK”. W przeciwnym razie w prostokąt poniżej wpisz odpowiedni kontrprzykład.

Zadanie 9 (1 punkt). Jeśli równość $(A \setminus B) \setminus (B \setminus A) = A$ zachodzi dla dowolnych zbiorów A i B , to w prostokąt poniżej wpisz słowo „TAK”. W przeciwnym razie w prostokąt poniżej wpisz odpowiedni kontrprzykład.

Zadanie 10 (1 punkt). Jeśli istnieją takie zbiory A , B i C , że $A \setminus B = C$ oraz $A \neq (B \cup C)$, to w prostokąt poniżej wpisz przykład takich trzech zbiorów. W przeciwnym wypadku wpisz słowo „NIE”.

Numer indeksu:

Zadanie 11 (1 punkt). Niech $R = \{\langle n, n+3 \rangle \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{\langle n, n \rangle \mid n \in \mathbb{N}\}$. W prostokąt poniżej wpisz taką formułę ϕ , że $\{\langle n, m \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid \phi\} = RR$.

Zadanie 12 (2 punkty). W pierwszej kolumnie poniższej tabeli są podane definicje dwóch relacji binarnych określonych na zbiorze liczb naturalnych. W kolumnie „porządek?” wpisz słowo „TAK” obok tych relacji, które są relacjami porządku i słowo „NIE” obok tych relacji, które nie są relacjami porządku. W kolumnie „równoważność?” wpisz słowo „TAK” obok tych relacji, które są relacjami równoważności i słowo „NIE” obok tych relacji, które nie są relacjami równoważności. W ostatniej kolumnie podaj definicję relacji RR , gdzie R jest relacją z pierwszej kolumny.

relacja R	porządek?	równoważność?	relacja RR
$R = \{\langle x, x \rangle \mid x \in \mathbb{N}\}$			
$R = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x \neq y\}$			

Zadanie 13 (1 punkt). Jeśli równość $f^{-1}(Y \setminus Y') = f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(Y')$ zachodzi dla dowolnej funkcji $f : A \rightarrow B$ i dowolnych zbiorów $Y, Y' \subseteq B$, to w prostokąt poniżej wpisz słowo „TAK”. W przeciwnym razie w prostokąt poniżej wpisz odpowiedni kontrprzykład.

Zadanie 14 (1 punkt). Rozważmy funkcję $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ zdefiniowaną wzorem

$$f(n) = 5 \cdot (q(n) + 1) - (r(n) + 1),$$

gdzie $q(n)$ jest częścią całkowitą z dzielenia liczby n przez 5, zaś $r(n)$ — resztą z dzielenia tej liczby przez 5. Jeśli istnieje funkcja odwrotna do funkcji f , to w prostokąt poniżej wpisz wyrażenie definiujące tę funkcję. W przeciwnym przypadku w prostokąt poniżej wpisz słowo „NIE”.

Zadanie 15 (1 punkt). Rozważmy funkcje

$$\begin{aligned} f &: (A^B \times A^C) \rightarrow A^{B \times C}, \\ g &: C \rightarrow A^B, \\ h &: B \rightarrow A^C \end{aligned}$$

oraz elementy $a \in A$, $b \in B$ i $c \in C$. Wpisz słowo „TAK” w prostokąty obok tych spośród podanych niżej wyrażeń, które są poprawne i słowo „NIE” w prostokąty obok tych spośród podanych niżej wyrażeń, które są niepoprawne.

1. $(f(g, h))(b, c)$
2. $(f(g(a), h(a)))(b, c)$
3. $(f(g(c), h(b)))(b, c)$
4. $f(g(b), h(c))$

Zadanie 16 (1 punkt). W prostokąt poniżej wpisz definicję dowolnej funkcji różnowartościowej $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$ lub słowo „NIE”, jeśli taka funkcja nie istnieje.

Zadanie 17 (1 punkt). W prostokąt poniżej wpisz definicję jakiegokolwiek funkcji

$$f : (\mathbb{N} \times \mathbb{N})^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{N}^{(\mathbb{N} \times \mathbb{N})}.$$

Zadanie 18 (1 punkt). Jeśli istnieje taki zbiór $X \neq \mathbb{Q}$, że $\mathbb{Q} \subseteq X$ oraz zbiory X i \mathbb{N} są równoliczne, to w prostokąt poniżej wpisz dowolny taki zbiór. W przeciwnym przypadku w prostokąt poniżej wpisz słowo „NIE”.

Zadanie 19 (1 punkt). Jeśli istnieje relacja liniowego porządku na zbiorze $\mathbb{N} \times \{0, 1\}$, to w prostokąt poniżej wpisz dowolną taką relację. W przeciwnym przypadku w prostokąt poniżej wpisz słowo „NIE”.