

Numer indeksu:

Logika dla informatyków

Egzamin końcowy (pierwsza część)

1 lutego 2019
czas pisania: 90 min

Zadanie 1 (2 punkty). Jeśli istnieją takie spełnialne formuły φ i ψ , że formuła $\varphi \Leftrightarrow \psi$ jest spełnialna a formuła $(\neg\varphi) \Leftrightarrow \psi$ jest sprzeczna, to w prostokąt poniżej wpisz dowolny przykład takich formuł. w przeciwnym przypadku wpisz uzasadnienie, dlaczego takie formuły nie istnieją.

Zadanie 2 (2 punkty). Nie używając spójnika „ \Rightarrow ” wpisz w prostokąt poniżej formułę w negacyjnej postaci normalnej równoważną formule $p \Rightarrow \neg(q \Rightarrow \neg r)$.

Zadanie 3 (2 punkty). Czy formuła $p \vee q$ jest logiczną konsekwencją zbioru formuł $\{q \Rightarrow \neg p, \neg p \Rightarrow \neg q\}$? W prostokąt poniżej wpisz odpowiedź oraz dowód jej poprawności.

Zadanie 4 (2 punkty). Jeśli istnieją niepuste i rozłączne zbiory $A, B \subseteq \mathbb{N}$ spełniające podany warunek, to w odpowiedni prostokąt wpisz dowolne takie zbiory. W przeciwnym razie wpisz słowo NIE. Symbol \subsetneq oznacza ściśle zawieranie: $X \subsetneq Y$ jest równoważne $X \subseteq Y \wedge X \neq Y$.

(a) $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cup B)$

(b) $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subsetneq \mathcal{P}(A \cup B)$

(c) $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \supsetneq \mathcal{P}(A \cup B)$

Zadanie 5 (2 punkty). Jeśli istnieje taka rodzina $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ podzbiorów \mathbb{N} , że dla każdego $i \in \mathbb{N}$ zbiór A_i jest nieskończony, $\bigcup_{i=0}^{\infty} \bigcap_{j=i}^{\infty} A_j = \emptyset$ oraz $\bigcup_{i=0}^{\infty} A_i = \mathbb{N}$, to w prostokąt niżej wpisz przykład dowolnej takiej rodziny. W przeciwnym przypadku wpisz uzasadnienie, dlaczego taka rodzina nie istnieje.

Zadanie 6 (2 punkty). W podany prostokąt wpisz liczbę takich relacji równoważności R na zbiorze $\{a, b, c, d, e\}$, że $\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \notin R \wedge \langle c, d \rangle \notin R \wedge \langle b, d \rangle \notin R$.

Zadanie 7 (2 punkty). Różnicę symetryczną $\dot{\cup}$ zbiorów A i B definiujemy następująco:

$$A \dot{\cup} B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Nie używając słów języka naturalnego (czyli używając jedynie symboli matematycznych) uzupełnij poniższy tekst tak, aby otrzymać poprawny dowód następującego twierdzenia: Dla dowolnych zbiorów X, Y, Z zachodzi inkluzja $X \dot{\cup} Z \subseteq (X \dot{\cup} Y) \cup (Y \dot{\cup} Z)$.

Dowód. Dowód przeprowadzimy wprost. Weźmy dowolne zbiory X, Y, Z oraz element . Z definicji różnicy symetrycznej mamy lub . Rozważmy dwa przypadki:

(1) . Z definicji różnicy zbiorów mamy oraz . Rozważmy dwa przypadki. Przypadek (1a): . Z definicji różnicy zbiorów mamy , a stąd i z definicji różnicy symetrycznej . Zatem . Przypadek (1b): . Z definicji różnicy zbiorów mamy , a stąd i z definicji różnicy symetrycznej . Zatem .

(2) . Tutaj dowód jest symetryczny do przypadku (1): wystarczy zamienić miejscami wszystkie wystąpienia i .

Zadanie 8 (2 punkty). Dla zbiorów A, B i $C \subseteq A \times B$ definiujemy $A_C = \{a \in A \mid \exists b \in B \langle a, b \rangle \in C\}$ oraz $B_C = \{b \in B \mid \exists a \in A \langle a, b \rangle \in C\}$. Czy dla dowolnych takich zbiorów zachodzi równość $A_C \times B_C = C$? W prostokąt poniżej wpisz odpowiedź oraz odpowiednio dowód lub kontrprzykład.

Zadanie 9 (2 punkty). Niech R będzie taką relacją binarną na zbiorze A , że $R;R = R$. Czy z tego wynika, że R jest przechodnia? W prostokąt poniżej wpisz odpowiedź oraz odpowiednio dowód lub kontrprzykład.

Zadanie 10 (2 punkty). Rozważmy relację $R = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}$. W prostokąt poniżej wpisz wyliczoną wartość przechodniego domknięcia relacji R .

Numer indeksu:

Zadanie 11 (2 punkty). Rozważmy zbiór M miast i relację $P \subseteq M \times M$ informującą o bezpośrednich połączeniach kolejowych pomiędzy miastami. W prostokąt poniżej wpisz taką formułę φ w negacyjnej postaci normalnej, że $\{\langle m_1, m_2 \rangle \in M \times M \mid \varphi\}$ jest zapytaniem relacyjnego rachunku dziedzin oznaczającym wykaz par miast, między którymi nie istnieje połączenie z mniej niż dwiema przesiadkami.

Zadanie 12 (2 punkty). Niech V będzie niepustym zbiorem zmiennych zdaniowych, a φ spełnialną formułą rachunku zdań zawierającą wyłącznie zmienne ze zbioru V . Niech ψ będzie formułą otrzymaną z φ przez zastąpienie każdego wystąpienia zmiennej p literałem $\neg p$, dla wszystkich zmiennych $p \in V$. Niech \mathcal{V}_φ będzie zbiorem wszystkich wartościowań $\sigma : V \rightarrow \{\mathbf{T}, \mathbf{F}\}$ spełniających formułę φ , a \mathcal{V}_ψ zbiorem wszystkich wartościowań spełniających formułę ψ .

Jeśli dla wszystkich formuł φ istnieje bijekcja pomiędzy zbiorami \mathcal{V}_φ i \mathcal{V}_ψ , to w prostokąt poniżej wpisz dowolną taką bijekcję. W przeciwnym przypadku wpisz odpowiedni kontrprzykład.

Zadanie 13 (2 punkty). Niech $F : \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \times \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ będzie dana wzorem $(F(f, g))(n) = f(n) + g(n)$ dla $n \in \mathbb{N}$. Jeśli funkcja F ma funkcję odwrotną, to w prostokąt poniżej wpisz tę funkcję. W przeciwnym przypadku wpisz uzasadnienie, dlaczego funkcja odwrotna nie istnieje.

Zadanie 14 (2 punkty). Niech $f : A \rightarrow B$ i $g : B \rightarrow C$ będą takimi funkcjami, że złożenie gf jest „na”. Załóżmy dodatkowo, że zbiory A , B i C są równoliczne. Czy z tego wynika, że funkcja f jest „na”? W prostokąt poniżej wpisz odpowiedź oraz odpowiednio dowód lub kontrprzykład.

Zadanie 15 (2 punkty). Niech $F_f : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$ dla $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ będzie funkcją zdefiniowaną wzorem $F_f(A) = f^{-1}[A]$.

- (a) Podaj przykład różnowartościowej funkcji f , dla której F_f **jest** funkcją różnowartościową lub wpisz słowo „NIE”, jeśli taki przykład nie istnieje.

- (b) Podaj przykład różnowartościowej funkcji f , dla której F_f **nie jest** funkcją różnowartościową lub wpisz słowo „NIE”, jeśli taki przykład nie istnieje.

Zadanie 16 (2 punkty). Na zbiorach $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ i $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ definiujemy relacje równoważności \simeq_1 i \simeq_2 wzorami $f \simeq_1 g \stackrel{\text{df}}{\iff} \lim_{n \rightarrow \infty} (f(n) - g(n)) = 0$ oraz $f \simeq_2 g \stackrel{\text{df}}{\iff} \exists n_0 \forall n > n_0. f(n) = g(n)$. Niech $z_{\mathbb{N}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ i $z_{\mathbb{Q}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ będą takimi funkcjami, że $z_{\mathbb{N}}(n) = 0$ i $z_{\mathbb{Q}}(n) = 0$ dla $n \in \mathbb{N}$. W prostokąty poniżej wpisz odpowiednio moce zbiorów klas abstrakcji relacji \simeq_1 i \simeq_2 oraz moce klas abstrakcji funkcji $z_{\mathbb{N}}$ i $z_{\mathbb{Q}}$.

$ \mathbb{N}^{\mathbb{N}}_{/\simeq_1} = $	$ \mathbb{N}^{\mathbb{N}}_{/\simeq_2} = $	$ [z_{\mathbb{N}}]_{\simeq_1} = $	$ [z_{\mathbb{N}}]_{\simeq_2} = $
$ \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}_{/\simeq_1} = $	$ \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}_{/\simeq_2} = $	$ [z_{\mathbb{Q}}]_{\simeq_1} = $	$ [z_{\mathbb{Q}}]_{\simeq_2} = $

Zadanie 17 (2 punkty). Rozważmy funkcje $f : A \times B \rightarrow C$ i $g : C \rightarrow B^A$ oraz elementy $a \in A$, $b \in B$ i $c \in C$. W tym zadaniu uznamy wyrażenie za poprawne, jeśli dla każdej użytej w nim funkcji (i dla dowolnych zbiorów A, B i C) jej argument należy do dziedziny tej funkcji. Np. wyrażenie $g(b)$ nie jest poprawne, bo nie dla wszystkich zbiorów A, B i C jest $b \in C$. Jeśli wyrażenie jest poprawne, to przez jego *typ* rozumiemy zbiór do którego należy element oznaczany przez to wyrażenie. Np. typem wyrażenia $g(c)$ jest B^A . W prostokąty obok tych spośród podanych niżej wyrażeń, które są poprawne, wpisz odpowiedni typ wyrażenia. W pozostałe prostokąty wpisz słowo „NIE”. Operator \circ oznacza składanie funkcji.

$f(a, b)$	C	$g(f(a, b))(c)$		$(g(c))(b)$	
$g(b)$	NIE	$(g \circ f)(a, b)$		$((g \circ f)(a, b))(a)$	

Zadanie 18 (2 punkty). Na zbiorze $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ definiujemy porządek \preceq wzorem $f \preceq g \stackrel{\text{df}}{\iff} \forall n f(n) \leq g(n)$. W prostokąt poniżej wpisz izomorfizm pomiędzy porządkami $\langle \{0, 1\}^{\mathbb{N}}, \preceq \rangle$ oraz $\langle \mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq \rangle$ lub uzasadnienie, że taki izomorfizm nie istnieje.

Zadanie 19 (2 punkty). Jeśli istnieje niepusty porządek regularny $\langle P, \leq \rangle$, w którym każdy element ma następnik i każdy element ma poprzednik, to w prostokąt poniżej wpisz dowolny przykład takiego porządku. W przeciwnym przypadku wpisz uzasadnienie, że taki porządek nie istnieje.

Zadanie 20 (2 punkty). W tym zadaniu f, g i h są symbolami funkcyjnymi, a, b są symbolami stałych, natomiast u, x, y i z są zmiennymi. W prostokąty obok tych spośród podanych par termów, które są unifikowalne, wpisz najogólniejsze unifikatory tych termów. W prostokąty obok termów, które nie są unifikowalne, wpisz słowo „NIE”.

$f(g(x, y), z) \stackrel{?}{=} f(u, a)$		$f(g(x, x), x) \stackrel{?}{=} f(y, a)$	
$g(x, f(z, u)) \stackrel{?}{=} g(y, a)$		$f(f(x, b), y) \stackrel{?}{=} f(x, f(z, b))$	

Numer indeksu:

Oddane zadania:

Logika dla informatyków

Egzamin końcowy (część druga)

1 lutego 2019

czas pisania: 120 min

Każde z poniższych zadań będzie oceniane w skali od -4 do 20 punktów.¹

Funkcja $f : A \rightarrow B$ jest *quasi-bijekcją*, jeśli spełnia następujące dwa warunki:

- istnieje co najwyżej jeden taki element $b \in B$, że dla żadnego $a \in A$ nie zachodzi $f(a) = b$, oraz
- istnieje co najwyżej jeden taki dwuelementowy zbiór $\{a_1, a_2\} \subseteq A$, że $f(a_1) = f(a_2)$.

Dla ustalonego zbioru X definiujemy relację binarną \sim_q na zbiorze $\mathcal{P}(X)$ w następujący sposób:

$$A \sim_q B \stackrel{\text{df}}{\iff} \text{istnieje quasi-bijekcja } f : A \rightarrow B.$$

Ponadto zwrotne, symetryczne i przechodnie domknięcie relacji \sim_q oznaczamy $\sim_q^\#$.

Zadanie 21. Czy relacja \sim_q jest

- (a) zwrotna?
- (b) symetryczna?
- (c) przechodnia?

Czy którakolwiek z odpowiedzi zmienia się, jeśli relację \sim_q ograniczymy do zbioru $\mathcal{P}(X) \setminus \{\emptyset\}$? Wszystkie odpowiedzi należy uzasadnić, tzn. podać odpowiednie dowody lub kontrprzykłady.

Zadanie 22. Udowodnij, że jeśli A i B są skończonymi podzbiorami zbioru X , to $A \sim_q^\# B$.

Zadanie 23. Udowodnij, że jeśli A jest skończonym, a B nieskończonym podzbiorem X , to $A \not\sim_q^\# B$.

Wskazówka: Przydatny może się okazać lemat z zadania 7, mówiący że dla dowolnych zbiorów X, Y, Z zachodzi inkluzja $X \dot{\subseteq} Z \subseteq (X \dot{\subseteq} Y) \cup (Y \dot{\subseteq} Z)$. Jeśli zdecydujesz się z niego skorzystać, nie musisz go dowodzić.

¹Algorytm oceniania oddanych zadań jest następujący: najpierw zadanie jest ocenione w skali od 0 do 24 punktów, a następnie od wyniku zostają odjęte 4 punkty. Osoba, która nie oddaje rozwiązania zadania otrzymuje za to zadanie 0 punktów.