Semestr 3

Teoria miary

Skrypt z wykładów

Z oznaczeniami wykładów

Spis treści

0 Podstawowe pojęcia **1**
Wykład 1 . . . 1
0.1 Odcinki i prostokąty . . . 1
0.2 Prosta rozszerzona . . . 1
0.3 Granica górna i dolna ciągu zbiorów . . . 2
0.4 Przykłady granic ciągów zbiorów . . . 2

1 Struktury na zbiorach **4**
1.1 Ciało i sigma-ciało zbiorów . . . 4
Wykład 2 . . . 4
1.2 Własności sigma-ciał . . . 4
1.3 Zbiory przeliczalne i ich dopełnienia . . . 5
1.4 Przestrzeń mierzalna . . . 6
1.5 Przekroje i sigma-ciała generowane . . . 6
1.6 Sigma-ciało zbiorów borelowskich . . . 7
1.7 Pierścienie i sigma-pierścienie zbiorów . . . 8
Wykład 3 . . . 8
1.8 Ideały i filtry zbiorów . . . 8
1.9 Pi-układy i lambda-układy . . . 10
1.10 Rodziny monotoniczne . . . 10
Wykład 4 . . . 12
1.11 Generatory sigma-ciała borelowskiego . . . 12
1.12 Zbiory otwarte i sigma-ciało borelowskie . . . 15

2 Miara **16**
2.1 Funkcje zbioru i addytywność . . . 16
2.2 Miara i przestrzeń z miarą . . . 16
2.3 Własności miary . . . 17

Rozdział 0

Podstawowe pojęcia

Wykład 1

0.1 Odcinki i prostokąty

Definicja 0.1 (Odcinki)**.** Niech $a, b \in \mathbb{R}$ oraz $a \leqslant b$. Odcinek otwarty o końcach a i b to

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}. \tag{0.1}$$

Analogicznie określamy odcinek domknięty i odcinki półotwarte:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x \leqslant b\},$$
$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x < b\},$$
$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leqslant b\}.$$

W szczególności jednopunktowy zbiór $\{a\}$ zapisujemy również jako $[a, a]$.

Definicja 0.2 (Prostokąt uogólniony)**.** Niech $d \in \mathbb{N}$ oraz niech $I_1, \ldots, I_d$ będą odcinkami w $\mathbb{R}$. Prostokątem uogólnionym w $\mathbb{R}^d$ nazywamy zbiór

$$P = I_1 \times \cdots \times I_d = \{(x_1, \ldots, x_d) \in \mathbb{R}^d : x_i \in I_i \text{ dla każdego } i = 1, \ldots, d\}. \tag{0.2}$$

0.2 Prosta rozszerzona

Definicja 0.3 (Prosta rozszerzona)**.** Prostą rozszerzoną nazywamy zbiór

$$\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty] = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}. \tag{0.3}$$

Dla każdej liczby $a \in \mathbb{R}$ przyjmujemy

$$-\infty < a < +\infty.$$

Dla $a \in \mathbb{R}$ obowiązują reguły

$$a + (+\infty) = (+\infty) + a = +\infty,$$
$$a - (+\infty) = -\infty.$$

W teorii miary stosujemy także konwencję

$$0 \cdot (+\infty) = (+\infty) \cdot 0 = 0. \tag{0.4}$$

Uwaga 0.1. Równość (0.4) jest przyjętą konwencją rachunku na prostej rozszerzonej. Nie jest regułą obliczania granic: iloczyn typu $0 \cdot \infty$ w zadaniu o granicach pozostaje formą nieoznaczoną.

0.3 Granica górna i dolna ciągu zbiorów

Niech $(A_n)_{n\geqslant 1}$ będzie ciągiem podzbiorów ustalonego zbioru X.

Definicja 0.4 (Granica górna)**.** Granicą górną ciągu (A_n) nazywamy zbiór

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \{x \in X : \forall n \geqslant 1 \ \exists k \geqslant n \quad x \in A_k\}. \tag{0.5}$$

Innymi słowy, $x \in \limsup_{n\to\infty} A_n$ wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do nieskończenie wielu zbiorów A_n.

Definicja 0.5 (Granica dolna)**.** Granicą dolną ciągu (A_n) nazywamy zbiór

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \{x \in X : \exists n \geqslant 1 \ \forall k \geqslant n \quad x \in A_k\}. \tag{0.6}$$

Innymi słowy, $x \in \liminf_{n\to\infty} A_n$ wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do prawie wszystkich zbiorów A_n, czyli do wszystkich od pewnego miejsca ciągu.

Fakt 0.1. *Dla każdego ciągu zbiorów (A_n) zachodzi*

$$\liminf_{n\to\infty} A_n \subseteq \limsup_{n\to\infty} A_n. \tag{0.7}$$

Dowód. Jeżeli punkt należy do wszystkich zbiorów od pewnego miejsca ciągu, to należy do nieskończenie wielu zbiorów tego ciągu. □

Definicja 0.6 (Zbieżność ciągu zbiorów)**.** Jeżeli

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \limsup_{n\to\infty} A_n,$$

to mówimy, że ciąg (A_n) jest zbieżny. Wspólną wartość tych granic oznaczamy przez $\lim_{n\to\infty} A_n$.

0.4 Przykłady granic ciągów zbiorów

Przykład 0.1 (Ciąg naprzemienny)**.** Niech

$$A_n = [0, 1 + (-1)^n], \qquad n \geqslant 1.$$

Wówczas

$$A_{2k-1} = \{0\}, \qquad A_{2k} = [0, 2], \qquad k \geqslant 1.$$

Punkt 0 należy do każdego zbioru A_n. Każdy punkt $x \in (0, 2]$ należy do wszystkich zbiorów o indeksach parzystych, a nie należy do żadnego zbioru o indeksie nieparzystym. Punkty spoza $[0, 2]$ nie należą do żadnego z tych zbiorów. Zatem, zgodnie z (0.5) i (0.6),

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \{0\}, \qquad \limsup_{n\to\infty} A_n = [0, 2]. \tag{0.8}$$

Granice są różne, więc ciąg (A_n) nie jest zbieżny.

Przykład 0.2 (Początkowe odcinki zbioru liczb naturalnych)**.** Przyjmujemy $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ i rozważamy ciąg

$$A_n = \{1, 2, \ldots, n\}, \qquad n \geqslant 1.$$

Dla każdego $m \in \mathbb{N}$ mamy $m \in A_n$ dla wszystkich $n \geqslant m$. Każda liczba naturalna należy więc do prawie wszystkich zbiorów A_n. Punkty spoza $\mathbb{N}$ nie należą do żadnego z nich. Stąd

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \mathbb{N} = \limsup_{n\to\infty} A_n, \qquad \lim_{n\to\infty} A_n = \mathbb{N}. \tag{0.9}$$

Rozdział 1

Struktury na zbiorach

1.1 Ciało i sigma-ciało zbiorów

Definicja 1.1 (Ciało zbiorów)**.** Ciałem zbiorów w przestrzeni X nazywamy rodzinę $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ spełniającą następujące warunki:

1) $\varnothing \in \mathcal{A}$;

2) jeżeli $A, B \in \mathcal{A}$, to $A \cup B \in \mathcal{A}$;

3) jeżeli $A \in \mathcal{A}$, to $A^c \in \mathcal{A}$, gdzie $A^c = X \setminus A$.

Definicja 1.2 (Sigma-ciało zbiorów)**.** Sigma-ciałem (σ-ciałem) zbiorów w przestrzeni X nazywamy rodzinę $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$, dla której warunki 1) i 3) z definicji ciała są zachowane, a warunek 2) zastępujemy warunkiem:

2') jeżeli $A_n \in \mathcal{A}$ dla każdego $n \geqslant 1$, to

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}.$$

Wykład 2

1.2 Własności sigma-ciał

Niech $\mathcal{A}$ będzie sigma-ciałem podzbiorów zbioru X. Wszystkie dopełnienia w tej części rozumiemy względem X.

Fakt 1.1. *Zbiór X należy do $\mathcal{A}$.*

Dowód. Mamy $\varnothing \in \mathcal{A}$, a rodzina $\mathcal{A}$ jest zamknięta na dopełnienia. Zatem $X = \varnothing^c \in \mathcal{A}$. □

Fakt 1.2 (Skończone sumy)**.** *Jeżeli $A_1, \ldots, A_m \in \mathcal{A}$, to*

$$\bigcup_{k=1}^{m} A_k \in \mathcal{A}.$$

Dowód. Połóżmy $A_k = \varnothing$ dla $k > m$. Wtedy wszystkie zbiory tego ciągu należą do $\mathcal{A}$ i

$$\bigcup_{k=1}^{m} A_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{A}.$$

□

Fakt 1.3 (Przeliczalne i skończone przekroje)**.** *Jeżeli $A_n \in \mathcal{A}$ dla każdego $n \geqslant 1$, to*

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}.$$

Rodzina $\mathcal{A}$ jest również zamknięta na skończone przekroje.

Dowód. Z praw de Morgana otrzymujemy

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c \right)^c \in \mathcal{A}. \tag{1.1}$$

Skończone przekroje otrzymujemy tak samo, stosując prawo de Morgana do skończonych sum. □

Fakt 1.4 (Różnice zbiorów)**.** *Jeżeli $A, B \in \mathcal{A}$, to $A \setminus B \in \mathcal{A}$.*

Dowód. Wystarczy skorzystać z równości $A \setminus B = A \cap B^c$. □

Fakt 1.5 (Różnice symetryczne)**.** *Jeżeli $A, B \in \mathcal{A}$, to $A \triangle B \in \mathcal{A}$, gdzie*

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Dowód. Oba zbiory $A \setminus B$ i $B \setminus A$ należą do $\mathcal{A}$, a rodzina $\mathcal{A}$ jest zamknięta na sumy dwóch zbiorów. □

Uwaga 1.1 (Równoważna postać definicji sigma-ciała)**.** W definicji sigma-ciała wystarczy założyć, że rodzina $\mathcal{A}$ jest niepusta oraz zamknięta na dopełnienia i przeliczalne sumy. Warunek $\varnothing \in \mathcal{A}$ wynika wtedy z pozostałych założeń.

Dowód. Wybierzmy $A \in \mathcal{A}$. Wtedy $A^c \in \mathcal{A}$ oraz $X = A \cup A^c \in \mathcal{A}$ (sumę dwóch zbiorów można zapisać jako sumę przeliczalną, powtarzając je w ciągu). Stąd $\varnothing = X^c \in \mathcal{A}$. □

1.3 Zbiory przeliczalne i ich dopełnienia

Przykład 1.1. Niech X będzie dowolnym zbiorem. Rodzina

$$\mathcal{A} = \{A \subseteq X : A \text{ jest przeliczalny lub } A^c \text{ jest przeliczalny}\} \tag{1.2}$$

jest sigma-ciałem. Przez zbiór przeliczalny rozumiemy tutaj także zbiór skończony, czyli zbiór o mocy nie większej niż $\aleph_0$.

Dowód. Sprawdzamy trzy warunki z definicji 1.2.

1) Zbiór $\varnothing$ jest przeliczalny, więc $\varnothing \in \mathcal{A}$.

2) Niech $A \in \mathcal{A}$ i $B = A^c$. Jeżeli A jest przeliczalny, to $B^c = A$ jest przeliczalny. Jeżeli A^c jest przeliczalny, to przeliczalny jest sam zbiór B. W obu przypadkach $B = A^c \in \mathcal{A}$.

3) Niech $A_n \in \mathcal{A}$ dla każdego $n \geqslant 1$. Rozważamy dwa przypadki.

   Jeżeli wszystkie zbiory A_n są przeliczalne, to ich przeliczalna suma $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ jest przeliczalna, zatem należy do $\mathcal{A}$.

   Jeżeli pewien zbiór A_{n_0} nie jest przeliczalny, to z $A_{n_0} \in \mathcal{A}$ wynika, że $A_{n_0}^c$ jest przeliczalny. Ponadto

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)^c = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^c \subseteq A_{n_0}^c. \tag{1.3}$$

   Dopełnienie sumy jest więc przeliczalne. W tym przypadku również $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

□

1.4 Przestrzeń mierzalna

Definicja 1.3 (Przestrzeń mierzalna)**.** Przestrzenią mierzalną nazywamy parę $(X, \mathcal{F})$, gdzie $\mathcal{F}$ jest sigma-ciałem podzbiorów zbioru X.

1.5 Przekroje i sigma-ciała generowane

Twierdzenie 1.1 (Przekrój sigma-ciał)**.** *Niech $(\mathcal{F}_t)_{t\in T}$ będzie rodziną sigma-ciał podzbiorów ustalonego zbioru X. Wówczas*

$$\mathcal{G} = \bigcap_{t\in T} \mathcal{F}_t \tag{1.4}$$

jest sigma-ciałem. Dla pustej rodziny przyjmujemy, że jej przekrój jest równy $\mathcal{P}(X)$.

Dowód. Jeżeli $T = \varnothing$, to $\mathcal{G} = \mathcal{P}(X)$ jest sigma-ciałem. Załóżmy zatem, że $T \neq \varnothing$.

1) Dla każdego $t \in T$ mamy $\varnothing \in \mathcal{F}_t$, więc $\varnothing \in \mathcal{G}$.

2) Jeżeli $A_n \in \mathcal{G}$ dla każdego $n \geqslant 1$, to dla każdego $t \in T$ wszystkie zbiory A_n należą do $\mathcal{F}_t$. Zatem dla każdego $t \in T$ mamy

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}_t,$$

   czyli $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{G}$.

3) Jeżeli $A \in \mathcal{G}$, to $A \in \mathcal{F}_t$ dla każdego $t \in T$. Stąd $A^c \in \mathcal{F}_t$ dla każdego $t \in T$, a więc $A^c \in \mathcal{G}$.

□

Wniosek 1.1. *Dla dowolnej rodziny $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$ istnieje najmniejsze, w sensie zawierania, sigma-ciało podzbiorów X zawierające $\mathcal{E}$.*

Dowód. Rozważmy rodzinę wszystkich sigma-ciał zawierających $\mathcal{E}$:

$$\mathfrak{S} = \{\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X) : \mathcal{F} \text{ jest sigma-ciałem i } \mathcal{E} \subseteq \mathcal{F}\}.$$

Rodzina $\mathfrak{S}$ jest niepusta, ponieważ należy do niej $\mathcal{P}(X)$. Z twierdzenia 1.1 wynika, że

$$\mathcal{G} = \bigcap_{\mathcal{F} \in \mathfrak{S}} \mathcal{F}$$

jest sigma-ciałem. Każdy element $\mathcal{E}$ należy do każdego $\mathcal{F} \in \mathfrak{S}$, zatem $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{G}$. Jeżeli $\mathcal{F}_0$ jest dowolnym sigma-ciałem zawierającym $\mathcal{E}$, to $\mathcal{F}_0 \in \mathfrak{S}$, więc $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}_0$. □

Definicja 1.4 (Sigma-ciało generowane)**.** Najmniejsze sigma-ciało zawierające rodzinę $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$ nazywamy sigma-ciałem generowanym przez $\mathcal{E}$ i oznaczamy przez $\sigma(\mathcal{E})$. Zatem

$$\sigma(\mathcal{E}) = \bigcap\{\mathcal{F} : \mathcal{F} \text{ jest sigma-ciałem w } X,\ \mathcal{E} \subseteq \mathcal{F}\}. \tag{1.5}$$

1.6 Sigma-ciało zbiorów borelowskich

Definicja 1.5 (Zbiory borelowskie na prostej)**.** Sigma-ciało generowane przez wszystkie zbiory otwarte w $\mathbb{R}$ nazywamy sigma-ciałem zbiorów borelowskich i oznaczamy przez $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Jego elementy nazywamy zbiorami borelowskimi.

Fakt 1.6. *Sigma-ciało $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ jest generowane przez rodzinę wszystkich odcinków otwartych:*

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\Big(\{(a,b) : a,b \in \mathbb{R},\ a < b\}\Big). \tag{1.6}$$

Dowód. Każdy odcinek otwarty jest zbiorem otwartym, zatem sigma-ciało po prawej stronie (1.6) zawiera się w $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Z drugiej strony każdy zbiór otwarty $U \subseteq \mathbb{R}$ jest sumą wszystkich odcinków $(p,q) \subseteq U$ o wymiernych końcach $p < q$. Takich odcinków jest co najwyżej przeliczalnie wiele. Zatem każdy zbiór otwarty należy do sigma-ciała generowanego przez odcinki otwarte, co daje przeciwną inkluzję. □

Uwaga 1.2. Sama rodzina $\mathcal{J}$ wszystkich odcinków nie jest sigma-ciałem. Na przykład $(0,1) \in \mathcal{J}$, ale jego dopełnienie w $\mathbb{R}$,

$$(0,1)^c = (-\infty, 0] \cup [1, +\infty),$$

nie jest odcinkiem, więc nie należy do $\mathcal{J}$.

1.7 Pierścienie i sigma-pierścienie zbiorów

Definicja 1.6 (Pierścień zbiorów)**.** Pierścieniem zbiorów w X nazywamy rodzinę $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X)$ spełniającą warunki:

1) $\varnothing \in \mathcal{R}$;
2) jeżeli $A, B \in \mathcal{R}$, to $A \cup B \in \mathcal{R}$;
3) jeżeli $A, B \in \mathcal{R}$, to $A \setminus B \in \mathcal{R}$.

Definicja 1.7 (Sigma-pierścień zbiorów)**.** Sigma-pierścieniem zbiorów w X nazywamy pierścień $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X)$ zamknięty na przeliczalne sumy. Oznacza to, że warunek 2) w definicji pierścienia zastępujemy warunkiem: jeżeli $A_n \in \mathcal{R}$ dla każdego $n \geqslant 1$, to

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{R}.$$

Wykład 3

1.8 Ideały i filtry zbiorów

W tej części wszystkie rozważane zbiory są podzbiorami ustalonego zbioru X, a dopełnienia bierzemy względem X.

Definicja 1.8 (Ideał zbiorów)**.** Rodzinę $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{P}(X)$ nazywamy ideałem zbiorów, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) $\varnothing \in \mathcal{I}$ oraz $X \notin \mathcal{I}$;
2) jeżeli $A, B \in \mathcal{I}$, to $A \cup B \in \mathcal{I}$;
3) jeżeli $A \subseteq B$ i $B \in \mathcal{I}$, to $A \in \mathcal{I}$.

Ostatni warunek oznacza, że każdy podzbiór elementu ideału również należy do tego ideału.

Przykład 1.2 (Ideał zbiorów skończonych)**.** Dla $X = \mathbb{R}$ rodzina

$$\mathcal{I}_{\text{fin}} = \{A \subseteq \mathbb{R} : A \text{ jest skończony}\} \tag{1.7}$$

jest ideałem zbiorów.

Dowód. Sprawdzamy kolejno warunki definicji 1.8.

1) Zbiór pusty jest skończony, więc $\varnothing \in \mathcal{I}_{\text{fin}}$. Zbiór $\mathbb{R}$ jest nieskończony, zatem $\mathbb{R} \notin \mathcal{I}_{\text{fin}}$.
2) Jeżeli $A, B \in \mathcal{I}_{\text{fin}}$, to oba zbiory są skończone. Ich suma jest skończona, gdyż $|A \cup B| \leqslant |A| + |B| < \infty$. Stąd $A \cup B \in \mathcal{I}_{\text{fin}}$.

3) Jeżeli $A \subseteq B$ i $B \in \mathcal{I}_{\text{fin}}$, to $|A| \leqslant |B| < \infty$. Zatem A jest skończony i należy do $\mathcal{I}_{\text{fin}}$.

□

Definicja 1.9 (Filtr zbiorów)**.** Rodzinę $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ nazywamy filtrem zbiorów, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) $X \in \mathcal{F}$ oraz $\varnothing \notin \mathcal{F}$;
2) jeżeli $A, B \in \mathcal{F}$, to $A \cap B \in \mathcal{F}$;
3) jeżeli $A \subseteq B \subseteq X$ i $A \in \mathcal{F}$, to $B \in \mathcal{F}$.

Ostatni warunek oznacza, że każdy nadzbiór elementu filtru, zawarty w X, również należy do tego filtru.

Przykład 1.3 (Filtr zbiorów o skończonym dopełnieniu)**.** Dla $X = \mathbb{R}$ rodzina

$$\mathcal{F}_{\text{cofin}} = \{A \subseteq \mathbb{R} : A^c \text{ jest skończony}\} \tag{1.8}$$

jest filtrem zbiorów.

Dowód. Sprawdzamy kolejno warunki definicji 1.9.

1) Mamy $\mathbb{R}^c = \varnothing$, więc $\mathbb{R} \in \mathcal{F}_{\text{cofin}}$. Natomiast $\varnothing^c = \mathbb{R}$ jest nieskończony, zatem $\varnothing \notin \mathcal{F}_{\text{cofin}}$.
2) Jeżeli $A, B \in \mathcal{F}_{\text{cofin}}$, to A^c i B^c są skończone. Z prawa de Morgana otrzymujemy
$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$
Prawa strona jest sumą dwóch zbiorów skończonych, więc jest skończona. Stąd $A \cap B \in \mathcal{F}_{\text{cofin}}$.
3) Jeżeli $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}$ i $A \in \mathcal{F}_{\text{cofin}}$, to $B^c \subseteq A^c$. Ponieważ A^c jest skończony, również B^c jest skończony. Zatem $B \in \mathcal{F}_{\text{cofin}}$.

□

Fakt 1.7 (Dualność ideałów i filtrów)**.** *Rodzina $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{P}(X)$ jest ideałem wtedy i tylko wtedy, gdy rodzina*

$$\mathcal{I}^* = \{A^c : A \in \mathcal{I}\} \tag{1.9}$$

jest filtrem.

Dowód. Niech $\mathcal{I}$ będzie ideałem. Z warunków $\varnothing \in \mathcal{I}$ i $X \notin \mathcal{I}$ otrzymujemy $X \in \mathcal{I}^*$ i $\varnothing \notin \mathcal{I}^*$. Jeżeli $C, D \in \mathcal{I}^*$, to $C^c, D^c \in \mathcal{I}$, więc

$$(C \cap D)^c = C^c \cup D^c \in \mathcal{I}.$$

Zatem $C \cap D \in \mathcal{I}^*$. Jeżeli $C \subseteq D \subseteq X$ i $C \in \mathcal{I}^*$, to $D^c \subseteq C^c \in \mathcal{I}$. Zamknięcie ideału na branie podzbiorów daje $D^c \in \mathcal{I}$, czyli $D \in \mathcal{I}^*$.

Odwrotnie, niech $\mathcal{I}^*$ będzie filtrem. Mamy $\varnothing \in \mathcal{I}$ i $X \notin \mathcal{I}$. Jeżeli $A, B \in \mathcal{I}$, to $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \in \mathcal{I}^*$, więc $A \cup B \in \mathcal{I}$. Jeżeli $A \subseteq B$ i $B \in \mathcal{I}$, to $B^c \subseteq A^c$ i $B^c \in \mathcal{I}^*$. Z warunku dotyczącego nadzbiorów w filtrze wynika $A^c \in \mathcal{I}^*$, a więc $A \in \mathcal{I}$. □

1.9 Pi-układy i lambda-układy

Definicja 1.10 (Pi-układ)**.** Rodzinę $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{P}(X)$ nazywamy pi-układem (π-układem), jeżeli jest niepusta i zamknięta na przekroje dwóch zbiorów, to znaczy

$$A, B \in \mathcal{P} \quad \Longrightarrow \quad A \cap B \in \mathcal{P}.$$

Przykład 1.4 (Rodziny będące pi-układami)**.** W przestrzeni $X = \mathbb{R}$ następujące rodziny są pi-układami:

1) rodzina $\mathcal{I}_{\text{fin}}$ zbiorów skończonych;

2) rodzina $\mathcal{F}_{\text{cofin}}$ zbiorów o skończonym dopełnieniu;

3) rodzina $\mathcal{J}$ wszystkich przedziałów w $\mathbb{R}$ wraz ze zbiorem pustym; dopuszczamy także przedziały nieograniczone.

Dowód. Każda z tych rodzin jest niepusta. Przekrój dwóch zbiorów skończonych jest skończony, gdyż jest podzbiorem każdego z nich. Zamknięcie rodziny $\mathcal{F}_{\text{cofin}}$ na przekroje sprawdziliśmy w przykładzie 1.3. Przekrój dwóch przedziałów jest przedziałem albo zbiorem pustym, więc również należy do $\mathcal{J}$. □

Definicja 1.11 (Lambda-układ)**.** Rodzinę $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{P}(X)$ nazywamy lambda-układem (λ-układem), jeżeli:

1) $X \in \mathcal{L}$;

2) jeżeli $A, B \in \mathcal{L}$ i $A \subseteq B$, to $B \setminus A \in \mathcal{L}$;

3) jeżeli $A_n \in \mathcal{L}$ dla każdego $n \geqslant 1$ oraz $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$, to $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{L}$.

Twierdzenie 1.2 (Dynkina–Sierpińskiego)**.** *Rodzina zbiorów, która jest jednocześnie pi-układem i lambda-układem, jest sigma-ciałem.*

Twierdzenie 1.3 (O pi-układzie i lambda-układzie)**.** *Jeżeli $\mathcal{P}$ jest pi-układem, $\mathcal{L}$ jest lambda-układem oraz $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}$, to*

$$\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}. \tag{1.10}$$

1.10 Rodziny monotoniczne

Definicja 1.12 (Rodzina monotoniczna)**.** Rodzinę $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(X)$ nazywamy rodziną monotoniczną, jeżeli:

1) jest zamknięta na przeliczalne sumy ciągów wstępujących: jeżeli $A_n \in \mathcal{M}$ i $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$, to

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{M};$$

2) jest zamknięta na przeliczalne przekroje ciągów zstępujących: jeżeli $A_n \in \mathcal{M}$ i $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$, to

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{M}.$$

Przykład 1.5 (Przedziały i zbiory skończone)**.** Rodzina $\mathcal{J}$ wszystkich przedziałów w $\mathbb{R}$ wraz ze zbiorem pustym jest rodziną monotoniczną. Przedziały mogą być nieograniczone. Istotnie, suma wstępującego ciągu przedziałów jest przedziałem lub zbiorem pustym, podobnie jak przekrój zstępującego ciągu przedziałów.

Natomiast rodzina zbiorów skończonych nie jest monotoniczna. Połóżmy

$$A_n = \{1, 2, \ldots, n\}.$$

Każdy A_n jest skończony i $A_n \subseteq A_{n+1}$, ale

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \mathbb{N}$$

nie jest zbiorem skończonym.

Uwaga 1.3 (Rodziny generowane)**.** Podobnie jak w przypadku sigma-ciał można rozważać najmniejsze rodziny danego typu zawierające ustaloną rodzinę zbiorów. W szczególności przez $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ oznaczamy najmniejszą rodzinę monotoniczną zawierającą $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$. Jest ona przekrojem wszystkich rodzin monotonicznych zawierających $\mathcal{E}$:

$$\mathcal{M}(\mathcal{E}) = \bigcap\{\mathcal{H} \subseteq \mathcal{P}(X) : \mathcal{H} \text{ jest monotoniczna}, \mathcal{E} \subseteq \mathcal{H}\}. \tag{1.11}$$

Rodzina pod przekrojem jest niepusta, ponieważ należy do niej $\mathcal{P}(X)$. Przekrój zachowuje oba warunki definicji 1.12, co uzasadnia tę konstrukcję.

Twierdzenie 1.4 (O rodzinie monotonicznej generowanej przez ciało)**.** *Jeżeli $\mathcal{F}$ jest ciałem zbiorów w X, to*

$$\sigma(\mathcal{F}) = \mathcal{M}(\mathcal{F}). \tag{1.12}$$

Dowód. Pierwsza inkluzja. Sigma-ciało $\sigma(\mathcal{F})$ zawiera $\mathcal{F}$ i jest rodziną monotoniczną, gdyż jest zamknięte na dowolne przeliczalne sumy i przekroje. Z minimalności $\mathcal{M}(\mathcal{F})$ otrzymujemy

$$\mathcal{M}(\mathcal{F}) \subseteq \sigma(\mathcal{F}).$$

Ta inkluzja nie wymaga założenia, że $\mathcal{F}$ jest ciałem.

Przeciwna inkluzja. Wykażemy, że $\mathcal{M}(\mathcal{F})$ jest sigma-ciałem. Dla skrócenia zapisu połóżmy $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\mathcal{F})$.

1. Zbiór pusty. Ponieważ $\mathcal{F}$ jest ciałem, mamy $\varnothing \in \mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}$.

2. Dopełnienia. Rozważmy rodzinę

$$\mathcal{G} = \{A \in \mathcal{M} : A^c \in \mathcal{M}\}.$$

Jest ona podrodziną $\mathcal{M}$ i zawiera $\mathcal{F}$, ponieważ $\mathcal{F}$ jest zamknięte na dopełnienia. Pokażemy, że $\mathcal{G}$ jest monotoniczna. Jeżeli $A_n \in \mathcal{G}$ i $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$, to $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{M}$ oraz

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)^c = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^c \in \mathcal{M},$$

gdyż ciąg (A_n^c) jest zstępujący. Stąd $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{G}$. Analogicznie dla $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$ mamy $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{M}$ i

$$\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right)^c = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c \in \mathcal{M}.$$

Zatem również $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{G}$. Rodzina $\mathcal{G}$ jest monotoniczna i zawiera $\mathcal{F}$, więc z minimalności $\mathcal{M}$ wynika $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{G}$. Stąd $\mathcal{G} = \mathcal{M}$, czyli $\mathcal{M}$ jest zamknięta na dopełnienia.

3. Sumy dwóch zbiorów. Dla ustalonego $B \subseteq X$ połóżmy

$$\mathcal{H}_B = \{A \in \mathcal{M} : A \cup B \in \mathcal{M}\}.$$

Rodzina $\mathcal{H}_B$ jest monotoniczna. Istotnie, dla wstępującego ciągu (A_n) jej elementów mamy

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cup B = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cup B) \in \mathcal{M},$$

ponieważ ciąg $(A_n \cup B)$ jest wstępujący. Sama suma $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ też należy do $\mathcal{M}$, więc należy do $\mathcal{H}_B$. Dla ciągu zstępującego analogicznie korzystamy z równości

$$\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cup B = \bigcap_{n=1}^{\infty} (A_n \cup B) \in \mathcal{M}.$$

Najpierw niech $B \in \mathcal{F}$. Dla każdego $A \in \mathcal{F}$ mamy $A \cup B \in \mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}$, więc $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{H}_B$. Z minimalności $\mathcal{M}$ otrzymujemy $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{H}_B \subseteq \mathcal{M}$. Zatem

$$\forall A \in \mathcal{M}\ \forall B \in \mathcal{F} \qquad A \cup B \in \mathcal{M}.$$

Teraz ustalmy dowolny $A \in \mathcal{M}$ i rozważmy $\mathcal{H}_A$. Ta rodzina jest monotoniczna, a z właśnie otrzymanego wyniku i przemienności sumy wynika, że zawiera $\mathcal{F}$. Ponownie minimalność daje $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{H}_A$. Otrzymujemy więc

$$\forall A, B \in \mathcal{M} \qquad A \cup B \in \mathcal{M}.$$

Indukcyjnie $\mathcal{M}$ jest zamknięta na skończone sumy.

4. Sumy przeliczalne. Niech $A_n \in \mathcal{M}$ dla każdego $n \geqslant 1$. Połóżmy

$$B_n = \bigcup_{k=1}^{n} A_k.$$

Wówczas $B_n \in \mathcal{M}$ oraz $B_n \subseteq B_{n+1}$. Z monotoniczności otrzymujemy

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{M}.$$

Zatem $\mathcal{M}$ jest sigma-ciałem zawierającym $\mathcal{F}$, więc $\sigma(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{M}$. Obie inkluzje dają równość (1.12). □

Wykład 4

1.11 Generatory sigma-ciała borelowskiego

Niech $\mathcal{J}$ oznacza rodzinę wszystkich przedziałów w $\mathbb{R}$, z dopuszczeniem przedziałów nieograniczonych i zbioru pustego. Sigma-ciało borelowskie na prostej oznaczamy

również przez $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ lub $\mathrm{Bor}(\mathbb{R})$. Rozważmy rodziny

$$\begin{aligned}
\mathcal{J}_0 &= \{(a,b) : a,b \in \mathbb{R},\ a < b\},\\
\mathcal{J}_D &= \{[a,b] : a,b \in \mathbb{R},\ a \leqslant b\},\\
\mathcal{J}_P &= \{(a,b] : a,b \in \mathbb{R},\ a < b\},\\
\mathcal{P}_0^- &= \{(-\infty,b) : b \in \mathbb{R}\}, & \mathcal{P}_D^- &= \{(-\infty,b] : b \in \mathbb{R}\},\\
\mathcal{P}_0^+ &= \{(a,+\infty) : a \in \mathbb{R}\}, & \mathcal{P}_D^+ &= \{[a,+\infty) : a \in \mathbb{R}\}.
\end{aligned}$$

Twierdzenie 1.5 (Generatory sigma-ciała borelowskiego na prostej)**.** *Zachodzą równości*

$$\begin{aligned}
\mathcal{B}(\mathbb{R}) &= \sigma(\mathcal{J}) = \sigma(\mathcal{J}_0)\\
&= \sigma(\mathcal{J}_D) = \sigma(\mathcal{J}_P)\\
&= \sigma(\mathcal{P}_0^-) = \sigma(\mathcal{P}_D^-)\\
&= \sigma(\mathcal{P}_0^+) = \sigma(\mathcal{P}_D^+).
\end{aligned} \tag{1.13}$$

Do dowodu wykorzystamy dwie własności operacji generowania sigma-ciała.

Lemat 1.1 (Monotoniczność generowania)**.** *Jeżeli $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{E}' \subseteq \mathcal{P}(X)$, to*

$$\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \sigma(\mathcal{E}').$$

Dowód. Sigma-ciało $\sigma(\mathcal{E}')$ zawiera $\mathcal{E}'$, więc zawiera także $\mathcal{E}$. Ponieważ $\sigma(\mathcal{E})$ jest najmniejszym sigma-ciałem zawierającym $\mathcal{E}$, otrzymujemy żądaną inkluzję. □

Wniosek 1.2 (Idempotentność generowania)**.** *Dla każdej rodziny $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$ mamy*

$$\sigma\Big(\sigma(\mathcal{E})\Big) = \sigma(\mathcal{E}).$$

Dowód. Rodzina $\sigma(\mathcal{E})$ jest już sigma-ciałem, więc jest najmniejszym sigma-ciałem zawierającym samą siebie. □

Dowód twierdzenia 1.5. Przedziały otwarte i wszystkie przedziały. Równość $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{J}_0)$ została uzasadniona w (1.6). Ponieważ $\mathcal{J}_0 \subseteq \mathcal{J}$, lemat 1.1 daje $\sigma(\mathcal{J}_0) \subseteq \sigma(\mathcal{J})$. Z drugiej strony dla $a \leqslant b$ mamy


$$[a,b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n}\right), \tag{1.14}$$

a dla $a < b$ również

$$\begin{aligned}
[a,b) &= \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, b\right),\\
(a,b] &= \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a, b + \frac{1}{n}\right).
\end{aligned}$$

Wszystkie te zbiory należą do $\sigma(\mathcal{J}_0)$. Przedziały nieograniczone otrzymujemy jako przeliczalne sumy przedziałów ograniczonych tego samego typu. Ponadto $\mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty}(-n,n)$, a zbiór pusty należy do każdego sigma-ciała. Zatem $\mathcal{J} \subseteq \sigma(\mathcal{J}_0)$, co daje

$$\sigma(\mathcal{J}) \subseteq \sigma\Big(\sigma(\mathcal{J}_0)\Big) = \sigma(\mathcal{J}_0) = \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$



Rysunek 1.1: Przedział domknięty jako przekrój malejących przedziałów otwartych.

Przedziały domknięte. Z inkluzji $\mathcal{J}_D \subseteq \mathcal{J}$ wynika $\sigma(\mathcal{J}_D) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Dla $a < b$ wybierzmy $n_0 \in \mathbb{N}$ tak duże, aby $2/n_0 < b - a$. Wówczas

$$(a,b) = \bigcup_{n=n_0}^{\infty} \left[a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n}\right] \in \sigma(\mathcal{J}_D). \tag{1.15}$$

Można też skorzystać z równości

$$(a,b) = [a,b] \setminus \Big(\{a\} \cup \{b\}\Big), \qquad \{a\} = [a,a], \quad \{b\} = [b,b].$$

Stąd $\mathcal{J}_0 \subseteq \sigma(\mathcal{J}_D)$, a więc $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \sigma(\mathcal{J}_D)$.

Przedziały półotwarte. Inkluzja $\mathcal{J}_P \subseteq \mathcal{J}$ daje $\sigma(\mathcal{J}_P) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Dla $a < b$ i dostatecznie dużego n_0 mamy

$$(a,b) = \bigcup_{n=n_0}^{\infty} \left(a, b - \frac{1}{n}\right] \in \sigma(\mathcal{J}_P).$$

Otrzymujemy przeciwną inkluzję, zatem $\sigma(\mathcal{J}_P) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Półproste otwarte. Każda półprosta $(-\infty, b)$ należy do $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, ponieważ

$$(-\infty, b) = \bigcup_{n=n_0}^{\infty} (-n, b)$$

dla n_0 tak dużego, aby $-n_0 < b$. Stąd $\sigma(\mathcal{P}_0^-) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Aby uzyskać przeciwną inkluzję, zauważmy, że

$$(a, +\infty) = (-\infty, a]^c = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-\infty, a + \frac{1}{n}\right)\right)^c \in \sigma(\mathcal{P}_0^-).$$

Zatem

$$(a,b) = (-\infty, b) \cap (a, +\infty) \in \sigma(\mathcal{P}_0^-).$$

To daje $\mathcal{J}_0 \subseteq \sigma(\mathcal{P}_0^-)$ i w konsekwencji $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{P}_0^-)$. Analogicznie dla prawych półprostych korzystamy z równości

$$(-\infty, b) = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(b - \frac{1}{n}, +\infty\right)\right)^c$$

oraz $(a,b) = (a, +\infty) \cap (-\infty, b)$. Otrzymujemy $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{P}_0^+)$.

Półproste domknięte. Pozostałe równości wynikają w ten sam sposób z zależności

$$(-\infty, b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-\infty, b + \frac{1}{n}\right), \qquad (-\infty, b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(-\infty, b - \frac{1}{n}\right],$$
$$[a, +\infty) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, +\infty\right), \qquad (a, +\infty) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[a + \frac{1}{n}, +\infty\right).$$

Rodziny półprostych otwartych i domkniętych generują więc te same sigma-ciała. □

Uwaga 1.4 (Zbiory borelowskie w $\mathbb{R}^d$)**.** W przestrzeni $\mathbb{R}^d$ można zdefiniować sigma-ciało borelowskie jako sigma-ciało generowane przez prostokąty


$$I_1 \times \cdots \times I_d,$$

gdzie $I_1, \ldots, I_d$ są przedziałami w $\mathbb{R}$.

1.12 Zbiory otwarte i sigma-ciało borelowskie

Definicja 1.13 (Zbiór otwarty na prostej)**.** Zbiór $U \subseteq \mathbb{R}$ nazywamy otwartym, jeżeli

$$\forall x \in U \ \exists \delta > 0 \qquad (x - \delta, x + \delta) \subseteq U.$$



Rysunek 1.2: Otoczenie punktu zbioru otwartego oraz prostokąty wewnątrz koła.

Twierdzenie 1.6. *Niech τ będzie rodziną wszystkich zbiorów otwartych w $\mathbb{R}$. Wówczas*

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\tau).$$

Dowód. Każdy przedział otwarty jest zbiorem otwartym, więc $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{J}_0) \subseteq \sigma(\tau)$. Z drugiej strony każdy zbiór otwarty U jest sumą zawartych w nim przedziałów o wymiernych końcach. Jest ich co najwyżej przeliczalnie wiele, jak w dowodzie (1.6). Zatem $\tau \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$, co daje przeciwną inkluzję. □

Uwaga 1.5. W przestrzeniach metrycznych, a ogólniej topologicznych, sigma-ciało borelowskie definiuje się jako sigma-ciało generowane przez zbiory otwarte.

Rozdział 2

Miara

2.1 Funkcje zbioru i addytywność

Definicja 2.1 (Funkcja zbioru)**.** Niech $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ będzie rodziną zbiorów. Odwzorowanie

$$\mu : \mathcal{A} \longrightarrow [0, +\infty]$$

nazywamy funkcją zbioru.

Definicja 2.2 (Skończona addytywność)**.** Funkcja zbioru $\mu : \mathcal{A} \to [0, +\infty]$ jest skończenie addytywna, jeżeli dla $A, B \in \mathcal{A}$ takich, że $A \cap B = \varnothing$ i $A \cup B \in \mathcal{A}$, zachodzi

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B). \tag{2.1}$$

Definicja 2.3 (Przeliczalna addytywność)**.** Funkcja zbioru $\mu : \mathcal{A} \to [0, +\infty]$ jest przeliczalnie addytywna, jeżeli dla każdego ciągu parami rozłącznych zbiorów $A_n \in \mathcal{A}$, którego suma należy do $\mathcal{A}$, mamy

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n). \tag{2.2}$$

Parami rozłączne oznacza, że $A_n \cap A_m = \varnothing$ dla $n \neq m$.

2.2 Miara i przestrzeń z miarą

Definicja 2.4 (Miara)**.** Niech $(X, \mathcal{F})$ będzie przestrzenią mierzalną. Miarą na sigma-ciele $\mathcal{F}$ nazywamy przeliczalnie addytywną funkcję zbioru

$$\mu : \mathcal{F} \longrightarrow [0, +\infty]$$

spełniającą warunek $\mu(\varnothing) = 0$.

Definicja 2.5 (Przestrzeń z miarą)**.** Trójkę $(X, \mathcal{F}, \mu)$, gdzie $\mathcal{F}$ jest sigma-ciałem podzbiorów X, a μ jest miarą na $\mathcal{F}$, nazywamy przestrzenią z miarą lub przestrzenią miarową. Zbiory należące do $\mathcal{F}$ nazywamy zbiorami mierzalnymi.

2.3 Własności miary

W tej części $(X, \mathcal{F}, \mu)$ jest przestrzenią z miarą, a wszystkie rozważane zbiory należą do $\mathcal{F}$.

Fakt 2.1 (Skończona addytywność miary)**.** *Miara jest skończenie addytywna: jeżeli* $A \cap B = \varnothing$*, to*

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B).$$

Dowód. Połóżmy $A_1 = A$, $A_2 = B$ oraz $A_n = \varnothing$ dla $n \geqslant 3$. Zbiory tego ciągu są parami rozłączne. Z przeliczalnej addytywności i warunku $\mu(\varnothing) = 0$ otrzymujemy

$$\mu(A \cup B) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \mu(A) + \mu(B).$$

□

Uwaga 2.1. Indukcyjnie dla dowolnych parami rozłącznych zbiorów $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{F}$ mamy

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k).$$

Fakt 2.2 (Subtraktywność)**.** *Jeżeli* $A \subseteq B$ *i* $\mu(A) < +\infty$*, to*

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A). \tag{2.3}$$

Dowód. Zbiory A i $B \setminus A$ są mierzalne i rozłączne, a ich suma jest równa B. Z faktu 2.1 wynika

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A). \tag{2.4}$$

Ponieważ $\mu(A)$ jest skończona, możemy ją odjąć i otrzymujemy (2.3). □

Fakt 2.3 (Miara sumy i przekroju)**.** *Dla dowolnych* $A, B \in \mathcal{F}$ *zachodzi*

$$\mu(A) + \mu(B) = \mu(A \cup B) + \mu(A \cap B). \tag{2.5}$$

Dowód. Z rozkładu $A = (A \cap B) \cup (A \setminus B)$ na zbiory rozłączne otrzymujemy

$$\begin{aligned} \mu(A) + \mu(B) &= \mu(A \cap B) + \mu(A \setminus B) + \mu(B) \\ &= \mu(A \cap B) + \mu\Big((A \setminus B) \cup B\Big) \\ &= \mu(A \cap B) + \mu(A \cup B). \end{aligned}$$

W drugim przejściu użyliśmy rozłączności $A \setminus B$ i B. □

Fakt 2.4 (Monotoniczność)**.** *Jeżeli* $A \subseteq B$*, to* $\mu(A) \leqslant \mu(B)$*.*

Dowód. Z równości (2.4) i nieujemności miary wynika

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geqslant \mu(A).$$

Sam rozkład (2.4) nie wymaga założenia o skończoności $\mu(A)$. □

Fakt 2.5 (Przeliczalna podaddytywność)**.** *Dla dowolnego ciągu zbiorów $A_n \in \mathcal{F}$ zachodzi*

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n). \tag{2.6}$$

Dowód. Połóżmy $B_1 = A_1$ oraz dla $n \geqslant 1$

$$B_{n+1} = A_{n+1} \setminus \bigcup_{k=1}^{n} A_k. \tag{2.7}$$


Zbiory B_n są mierzalne, parami rozłączne i spełniają $B_n \subseteq A_n$. Ponadto

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n :$$

każdy punkt sumy należy do pierwszego zbioru A_n, w którym się pojawia, a więc należy do odpowiedniego B_n. Z przeliczalnej addytywności i monotoniczności miary otrzymujemy

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

□



Rysunek 2.1: Rozkład zbioru A oraz rozłącznienie pierwszych trzech zbiorów ciągu.