

数学分析部分习题题解答参考

教材:Mathematical Analysis I,II (第7版), V.A. Zorich, 中译本

清华大学数学科学系2024级数学分析教学 卢旭光 2024

以下题目编号是倒序的, 最新出来的放在最前面.

21(关于勒让德变换的习题, 一般情形).卓里奇第五章第4节p.219习题9(勒让德变换): 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为一区间(有界、无界、开、闭、半开半闭均可), 函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. 称函数

$$f^*(t) := \sup_{x \in I} (tx - f(x)), \quad t \in \mathbb{R}$$

为函数 f 的勒让德变换. 试证明下面的性质 **a)**, **b)**, **c)**:

a) 令

$$I^* = \{t \in \mathbb{R} \mid f^*(t) < \infty\}.$$

则 I^* 或者是空集, 或者是单点集, 或者是一个区间, 而当 I^* 是区间时, 函数 $f^*(t)$ 在 I^* 上是凸函数.

b) 如果 f 在 I 上是连续凸函数, 则 $\{f'_+(x), f'_-(x) \mid x \in I^\circ\} \subset I^*$ 从而 I^* 非空, 并有

$$(f^*)^*(x) := \sup_{t \in I^*} (xt - f^*(t)) = f(x) \quad \forall x \in I.$$

这表明连续凸函数的勒让德变换是对合变换(即变换与自己的复合乘法等于恒等变换: $A \circ A = \text{id}$).

c) 当 $I^* \neq \emptyset$ 时, 以下不等式成立:

$$xt \leq f(x) + f^*(t) \quad \forall x \in I, \forall t \in I^*.$$

【证】a): 证明与第19题**a)** 相同.

b): 设 f 是 I 上的连续凸函数. 任取 $t \in \{f'_+(x), f'_-(x) \mid x \in I^\circ\}$, 则有 $x_t \in I^\circ$ 使得 $t = f'_+(x_t)$ 或 $t = f'_-(x_t)$. 由凸函数的性质知

$$f(x) \geq f(x_t) + t(x - x_t) \quad \forall x \in I$$

即

$$tx - f(x) \leq tx_t - f(x_t) \quad \forall x \in I.$$

因此

$$f^*(t) \leq tx_t - f(x_t) < \infty.$$

所以 $t \in I^*$. 这证明了 $\{f'_+(x), f'_-(x) \mid x \in I^\circ\} \subset I^*$.

下证 $(f^*)^*(x) \equiv f(x), x \in I$. 任取 $x \in I$, 由 $(f^*)^*(x)$ 的定义知对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $t_\varepsilon \in I^*$ 使得

$$(f^*)^*(x) < xt_\varepsilon - f^*(t_\varepsilon) + \varepsilon.$$

因 $f^*(t_\varepsilon) \geq t_\varepsilon x - f(x)$ 故得

$$(f^*)^*(x) < xt_\varepsilon - t_\varepsilon x + f(x) + \varepsilon = f(x) + \varepsilon.$$

因 x 与 $\varepsilon > 0$ 无关, 故令 $\varepsilon \rightarrow 0+$ 得知 $(f^*)^*(x) \leq f(x)$.

另一方面, 因 f 连续, 故结合第20题知, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $y = y_\varepsilon \in I^\circ$ 使得

$$|f(y) - f(x)| < \varepsilon \quad \text{且} \quad |A_y(x - y)| < \varepsilon \quad (*)$$

其中 $A_y = f'_+(y)$ 或 $= f'_-(y)$. 对此 A_y 我们有

$$(f^*)^*(x) \geq xA_y - f^*(A_y).$$

而由 f^* 的定义, 存在 $z = z_\varepsilon \in I$ 使得

$$f^*(A_y) \leq A_y z - f(z) + \varepsilon \quad \text{即} \quad -f^*(A_y) \geq -A_y z + f(z) - \varepsilon.$$

再由凸函数不等式 $f(z) \geq f(y) + A_y(z - y)$ 导出

$$-f^*(A_y) \geq -A_y z + f(z) - \varepsilon \geq f(y) - A_y y - \varepsilon.$$

代入上面并使用不等式(*)得到

$$(f^*)^*(x) \geq xA_y - f^*(A_y) \geq A_y(x - y) + f(y) - \varepsilon > f(x) - 3\varepsilon.$$

因 x 与 $\varepsilon > 0$ 无关, 故令 $\varepsilon \rightarrow 0+$ 得知 $(f^*)^*(x) \geq f(x)$.

这就证明了 $(f^*)^*(x) = f(x)$.

c): 这直接由函数 $f^*(t)$ 的定义推出. □

【注】 本题b)中的连续性假设不能去掉, 否则有反例. 当然这只能在 I 不是开区间时有反例, 因为开区间上的凸函数都是连续的.

【例】 设 $I = [0, 1]$,

$$f(x) = 0, \quad x \in (0, 1); \quad f(x) = 1, \quad x \in \{0, 1\}.$$

则 f 是 $I = [0, 1]$ 上的凸函数. 计算

$$\begin{aligned} f^*(t) &= \max \left\{ \sup_{0 < x < 1} (tx - f(x)), \sup_{x=0} (tx - f(x)), \sup_{x=1} (tx - f(x)) \right\} \\ &= \max \left\{ \sup_{0 < x < 1} (tx), \sup_{x=0} (-1), \sup_{x=1} (t - 1) \right\} = \max \left\{ \sup_{0 < x < 1} (tx), -1, t - 1 \right\}. \end{aligned}$$

当 $t > 0$ 时

$$f^*(t) = \max \left\{ \sup_{0 < x < 1} (tx), -1, t - 1 \right\} = \max \{t, -1, t - 1\} = t.$$

当 $t \leq 0$ 时

$$f^*(t) = \max \left\{ \sup_{0 < x < 1} (tx), -1, t - 1 \right\} = \max \{0, -1, t - 1\} = 0.$$

所以

$$f^*(t) = t \mathbf{1}_{\{t > 0\}}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

所以 $I^* = \mathbb{R}$. 然后计算

$$\begin{aligned} (f^*)^*(x) &= \sup_{t \in \mathbb{R}} (xt - f^*(t)) = \sup_{t \in \mathbb{R}} (xt - t \mathbf{1}_{\{t > 0\}}) \\ &= \max \left\{ \sup_{t \leq 0} (xt - t \mathbf{1}_{\{t > 0\}}), \sup_{t > 0} (xt - t \mathbf{1}_{\{t > 0\}}) \right\} = \max \left\{ \sup_{t \leq 0} (xt), \sup_{t > 0} (xt - t) \right\}. \end{aligned}$$

对任意 $x \in [0, 1]$ 易见

$$\sup_{t \leq 0} (xt) = 0, \quad \sup_{t > 0} (xt - t) = \sup_{t > 0} ((x - 1)t) = 0.$$

所以

$$(f^*)^*(x) = 0 \quad \forall x \in I = [0, 1].$$

所以 $(f^*)^*(x) \not\equiv f(x), x \in I$. □

20(一个引理). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为任一区间, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ 为一个连续凸函数. 则对任意 $x \in I$, 任意 $y \in I^\circ$ 和任意 $A_y \in \{f'_+(y), f'_-(y)\}$, 都有

$$\lim_{I^\circ \ni y \rightarrow x} A_y(x - y) = 0.$$

这里 I° 是区间 I 的内部.

【证】 设 $x \in I$ 不是 I 的左端点. 则存在 $\delta > 0$ 使得 $(x - \delta, x) \subset I^\circ$. 当 $y \in (b - \delta/2, b)$ 时有 $y \in I^\circ, y + y - b \in (b - \delta, b) \subset I^\circ$, 且由凸函数性质知对任意 $A_y \in \{f'_+(y), f'_-(y)\}$ 有

$$f(x) \geq f(y) + A_y(x - y), \quad f(y + y - x) \geq f(y) + A_y(y - x)$$

$$\text{即 } A_y(x - y) \leq f(x) - f(y), \quad -A_y(x - y) = A_y(y - x) \leq f(y + y - x) - f(y)$$

$\implies$

$$|A_y(x-y)| \leq \max\{|f(x)-f(y)|, |f(y+y-x)-f(y)|\} \rightarrow 0 \quad (I^\circ \ni y \rightarrow x).$$

这里用到 f 的连续性.

设 $x \in I$ 不是 I 的右端点. 则存在 $\delta > 0$ 使得 $(x, x+\delta) \subset I^\circ$. 当 $y \in (x, x+\delta/2)$ 时有 $y \in I^\circ, y+y-x \in (x, x+\delta) \subset I^\circ$ 且对任意 $A_y \in \{f'_+(y), f'_-(y)\}$ 有

$$f(x) \geq f(y) + A_y(x-y), \quad f(y+y-x) \geq f(y) + A_y(y-x),$$

$$\text{即 } A_y(x-y) \leq f(x)-f(y), \quad -A_y(x-y) = A_y(y-x) \leq f(y+y-x)-f(y)$$

$\implies$

$$|A_y(x-y)| \leq \max\{|f(x)-f(y)|, |f(y+y-x)-f(y)|\} \rightarrow 0 \quad (I^\circ \ni y \rightarrow x).$$

这里用到 f 的连续性. □

19(关于勒让德变换的习题, 可微的情形). 卓里奇第五章第4节p.219 **习题9** (勒让德变换): 首先将这一习题清楚地重述如下:

设 $I \subset \mathbb{R}$ 为一区间(有界、无界、开、闭、半开半闭均可), 函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 可微. 称函数

$$f^*(t) := \sup_{x \in I} (tx - f(x)), \quad t \in \mathbb{R}$$

为函数 f 的勒让德变换. 试证明下面的性质**a), b), c), d), e), f)**:

a) 令

$$I^* = \{t \in \mathbb{R} \mid f^*(t) < \infty\}.$$

则 I^* 或者是空集, 或者是单点集, 或者是一个区间, 而当 I^* 是区间时, 函数 $f^*(t)$ 在 I^* 上是凸函数.

b) 如果 f 在 I 上是凸函数, 则 $f'(I) = \{f'(x) \mid x \in I\} \subset I^*$ 从而 I^* 非空, 并有

$$(f^*)^*(x) := \sup_{t \in I^*} (xt - f^*(t)) = f(x) \quad \forall x \in I.$$

这表明凸函数的勒让德变换是对合变换(即变换与自己的复合乘法等于恒等变换: $A \circ A = \text{id}$).

c) 当 $I^* \neq \emptyset$ 时, 以下不等式成立:

$$xt \leq f(x) + f^*(t) \quad \forall x \in I, \forall t \in I^*.$$

d) 如果 f 在 I 上是凸函数, 则有

$$f^*(t) = \max_{x \in I} (tx - f(x)) = tx_t - f(x_t) \quad \forall t \in f'(I)$$

其中 $x_t \in I$ 满足 $t = f'(x_t)$. 这说明, 如果把可微凸函数 f 的勒让德变换 f^* 限制在 $f'(I) = \{f'(x) \mid x \in I\}$ 上, 则 $f^*(t)$ 便有明显易求的表达式.

e) 当 $\alpha > 1, x \in [0, \infty)$ 时, 函数 $f(x) = \frac{1}{\alpha}x^\alpha$ 的勒让德变换是函数 $f^*(t) = \frac{1}{\beta}t^\beta, t \in [0, \infty) = f'([0, \infty))$, 其中 $\beta > 1$ 满足 $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1$. 根据这个结果和 c), d) 便得到已证明的 Young 不等式:

$$xt \leq \frac{1}{\alpha}x^\alpha + \frac{1}{\beta}t^\beta \quad \forall x, t \in [0, \infty).$$

f) 函数 $f(x) = e^x (x \in \mathbb{R})$ 的勒让德变换是函数 $f^*(t) = t \log(t/e), t \in (0, \infty) = f'(\mathbb{R})$. 因此由 c), d) 得到不等式

$$xt \leq e^x + t \log(t/e) \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall t \in (0, \infty).$$

【证】a): 假设 I^* 不是空集也不是单点集, 来证明 I^* 是一个区间. 任取 $t_1, t_2 \in I, t_1 < t_2$, 来证明 $[t_1, t_2] \subset I$. 事实上由 f^* 的定义有

$$f^*(t_1) \geq t_1x - f(x), \quad f^*(t_2) \geq t_2x - f(x) \quad \forall x \in I.$$

因此对任意 $\theta \in [0, 1]$ 有

$$\begin{aligned} (1-\theta)f^*(t_1) + \theta f^*(t_2) &\geq (1-\theta)t_1x - (1-\theta)f(x) + \theta t_2x - \theta f(x) \\ &= ((1-\theta)t_1 + \theta t_2)x - f(x) \quad \forall x \in I. \end{aligned}$$

关于 $x \in I$ 取上确界得到

$$f^*((1-\theta)t_1 + \theta t_2) \leq (1-\theta)f^*(t_1) + \theta f^*(t_2) < \infty.$$

这表明 $(1-\theta)t_1 + \theta t_2 \in I^*$. 因 $\theta \in [0, 1]$ 是任意的, 故 $[t_1, t_2] \subset I^*$. 据已证的关于区间的刻画知集合 I^* 是一个区间, 而上面的不等式同时表明 f^* 在 I^* 上是凸函数.

b): 设 f 是 I 上的凸函数. 任取 $t \in \{f'(x) \mid x \in I\}$, 则有 $x_t \in I$ 使得 $t = f'(x_t)$. 由凸函数的性质知(见讲义补充的命题 5.4.14*)

$$f(x) \geq f(x_t) + f'(x_t)(x - x_t) = f(x_t) + t(x - x_t) \quad \forall x \in I$$

即

$$tx - f(x) \leq tx_t - f(x_t) \quad \forall x \in I.$$

因此

$$f^*(t) \leq tx_t - f(x_t) < \infty.$$

所以 $t \in I^*$. 这证明了 $\{f'(x) \mid x \in I\} \subset I^*$.

下证 $(f^*)^*(x) \equiv f(x), x \in I$. 任取 $x \in I$, 由 $(f^*)^*(x)$ 的定义知对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $t_\varepsilon \in I^*$ 使得

$$(f^*)^*(x) < xt_\varepsilon - f^*(t_\varepsilon) + \varepsilon.$$

因 $f^*(t_\varepsilon) \geq t_\varepsilon x - f(x)$ 故得

$$(f^*)^*(x) < xt_\varepsilon - t_\varepsilon x + f(x) + \varepsilon = f(x) + \varepsilon.$$

因 x 与 $\varepsilon > 0$ 无关, 故令 $\varepsilon \rightarrow 0+$ 得知 $(f^*)^*(x) \leq f(x)$.

另一方面, 由 $f'(I) \subset I^*$ 知 $t = f'(x) \in I^*$, 因此再由 $(f^*)^*(x)$ 的定义知

$$(f^*)^*(x) \geq xt - f^*(t).$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 由 $f^*(t)$ 的定义, 存在 $x_\varepsilon \in I$ 使得

$$f^*(t) < tx_\varepsilon - f(x_\varepsilon) + \varepsilon.$$

将 $t = f'(x)$ 代入并使用凸函数不等式(见讲义补充的**命题5.4.14***) $f(x_\varepsilon) \geq f(x) + f'(x)(x_\varepsilon - x)$ 得到

$$\begin{aligned} (f^*)^*(x) &\geq xt - f^*(t) > xt - tx_\varepsilon + f(x_\varepsilon) - \varepsilon = f(x_\varepsilon) + f'(x)(x - x_\varepsilon) - \varepsilon \\ &\geq f(x) + f'(x)(x_\varepsilon - x) + f'(x)(x - x_\varepsilon) - \varepsilon = f(x) - \varepsilon. \end{aligned}$$

所以

$$(f^*)^*(x) \geq f(x) - \varepsilon.$$

因 x 与 $\varepsilon > 0$ 无关, 故令 $\varepsilon \rightarrow 0+$ 得知 $(f^*)^*(x) \geq f(x)$.

这就证明了 $(f^*)^*(x) = f(x)$.

c): 这直接由函数 $f^*(t)$ 的定义推出.

d): 设 f 在 I 上为凸函数. 则对任意 $t \in f'(I)$, 存在 $x_t \in I$ 使得 $t = f'(x_t)$. 据凸函数不等式(见讲义补充的**命题5.4.14***)有

$$f(x) \geq f(x_t) + f'(x_t)(x - x_t) = f(x_t) + t(x - x_t) \quad \forall x \in I$$

即

$$tx - f(x) \leq tx_t - f(x_t) \quad \forall x \in I.$$

因 $x_t \in I$, 故这个不等式表明 $tx_t - f(x_t)$ 是最大值, 因此

$$f^*(t) = \max_{x \in I} (tx - f(x)) = tx_t - f(x_t), \quad t \in f'(I).$$

e): 设 $\alpha > 1$, $f(x) = \frac{1}{\alpha}x^\alpha, x \in [0, \infty)$. 则 $f'(x) = x^{\alpha-1}$, $f'([0, \infty)) = [0, \infty)$. 对任意 $t \in [0, \infty)$, 解方程 $f'(x_t) = t$ 得到 $x_t = t^{\frac{1}{\alpha-1}}$. 于是有(注意 $\beta = \frac{\alpha}{\alpha-1}$)

$$f^*(t) = tx_t - f(x_t) = t^{1+\frac{1}{\alpha-1}} - \frac{1}{\alpha}t^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} = \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right)t^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} = \frac{1}{\beta}t^\beta.$$

所以由c),d) 便有

$$xt \leq f(x) + f^*(t) = \frac{1}{\alpha}x^\alpha + \frac{1}{\beta}t^\beta \quad \forall x, t \in [0, \infty).$$

f): 设 $f(x) = e^x, x \in \mathbb{R}$. 则 $f'(x) = e^x > 0$, $f'(\mathbb{R}) = (0, \infty)$. 对任意 $t \in (0, \infty)$, 解方程 $f'(x_t) = t$ 得 $x_t = \log(t)$. 因此 f 的勒让德变换为

$$f^*(t) = t \log t - f(\log(t)) = t \log t - t = t \log(t/e), \quad t \in (0, \infty).$$

所以由c),d) 便有

$$xt \leq e^x + t \log(t/e) \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall t \in (0, \infty).$$

□

【注】一般来说, 即便对于区间 I 上的光滑凸函数 f 来说, 集合 $f'(I)$ 也可能比 I^* 小. 例子如下: 设 $I = (0, \infty)$, $f(x) = (1+x^2)^{1/2}, x \in I$. 则函数 $f(x) = (1+x^2)^{1/2}$ 是光滑的严格凸函数:

$$f'(x) = \frac{x}{(1+x^2)^{1/2}}, \quad f''(x) = \frac{1}{(1+x^2)^{3/2}}.$$

不难验证

$$f^*(t) = \sup_{x \in (0, \infty)} (xt - f(x)) = \begin{cases} \infty & \text{若 } t > 1, \\ -\sqrt{1-t^2} & \text{若 } t \in (0, 1], \\ -1 & \text{若 } t \leq 0. \end{cases}$$

因此由 I^* 的定义有

$$I^* = \{t \in \mathbb{R} \mid f^*(t) < \infty\} = (-\infty, 1].$$

但

$$f'(I) = (0, 1) \quad \text{远小于 } I^*.$$

下面是对讲义§5.4的补充, 它在解答第19题时有用.

• 凸函数在区间端点处的行为.

凸函数在其定于区间的端点处的行为与其在内点的行为只有一个区别: 凸函数在端点处的切线的斜率可能为无穷大. 这里当然要求所考虑的端点属于函数的定义域. 确切来说有下面的命题.

【命题5.4.14*】 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为任一区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 为凸函数. 则有

(1) 若 $a \in I$ 是 I 的左端点, 则差商 $I \setminus \{a\} \ni x \mapsto \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 单调不减, 因此右极限

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ 存在且 } < \infty, \text{ 但可能 } = -\infty.$$

当 $f'_+(a) > -\infty$ 时, (由导数的定义知) f 在左端点 a 处可导, $f'(a) = f'_+(a)$, 并有

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a) \quad \forall x \in I.$$

若 $b \in I$ 是 I 的右端点, 则差商 $I \setminus \{b\} \ni x \mapsto \frac{f(x)-f(b)}{x-b}$ 单调不减, 因此左极限

$$f'_-(b) = \lim_{x \rightarrow b-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} \text{ 存在且 } > -\infty, \text{ 但可能 } = \infty.$$

当 $f'_-(b) < \infty$ 时, (由导数的定义知) f 在右端点 b 处可导, $f'(b) = f'_-(b)$, 并有

$$f(x) \geq f(b) + f'(b)(x - b) \quad \forall x \in I.$$

(2) 若 $a \in I$ 是 I 的左端点, 则

$$f'_+(a) \leq f'_-(x) \leq f'_+(x) \quad \forall x \in I^\circ.$$

若 $b \in I$ 是 I 的右端点, 则

$$f'_-(x) \leq f'_+(x) \leq f'_-(b) \quad \forall x \in I^\circ.$$

(3) 若 f 在 I 上处处可导, 则导函数 $x \mapsto f'(x)$ 在 I 上单调不减, 并有

$$f(y) \geq f(x) + f'(x)(y - x) \quad \forall x, y \in I$$

这里特别包括 x 是 I 的端点的情形.

【证】(1): 设 $a \in I$ 是 I 的左端点, 则由凸函数的三斜率不等式(5.4.1) 有

$$\frac{f(y) - f(a)}{y - a} \leq \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad \forall x, y \in I \text{ s.t. } a < y < x.$$

所以差商单调不减, 因此固定 $x > a$, 让 $y \rightarrow a+$, 则极限右极限 $f'_+(a) = \lim_{y \rightarrow a+} \frac{f(y)-f(a)}{y-a}$ 存在, 并有

$$f'_+(a) = \lim_{y \rightarrow a+} \frac{f(y) - f(a)}{y - a} \leq \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

这蕴含 $f'_+(a) < \infty$. 因此当 $f'_+(a) > -\infty$ 时, f 在左端点 a 处可导且 $f'(a) = f'_+(a)$ 并有

$$f'(a) \leq \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad \text{从而有} \quad f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a), \quad x \in I.$$

对 $b \in I$ 是 I 的右端点的情形, 同法可证相应的结论成立.

(2): 任取 $x \in I^\circ$. 若 $a \in I$ 是 I 的左端点, 则由命题5.4.7 有

$$f(a) \geq f(x) + f'_-(x)(a-x) \quad \text{即} \quad \frac{f(x) - f(a)}{x-a} \leq f'_-(x).$$

因此由(1)的证明中的不等式有

$$f'_+(a) \leq \frac{f(x) - f(a)}{x-a} \leq f'_-(x).$$

若 $b \in I$ 是 I 的右端点, 则同理有

$$f'_+(x) \leq \frac{f(x) - f(b)}{x-b} \leq f'_-(b).$$

(3): 设 f 在 I 上处处可导. 则由可微的凸函数性质(命题5.4.9)知导函数 $f'(x)$ 在 I° 内单调不减, 于是结合(2)知导函数 $f'(x)$ 在整个区间 I 上单调不减. 任取 $x, y \in I$. 当 $x \in I^\circ$ 时应用命题5.4.7或命题5.4.9, 当 x 为 I 的端点时应用(1), 都得知不等式 $f(y) \geq f(x) + f'(x)(y-x)$ 成立. $\square$

18. 卓里奇第五章第3节习题p.218 第2题和解答参考:

设 $p > 1$, 证明存在常数 $0 < c_p < \infty$ 使得

$$\text{当 } p \geq 2 \text{ 时, } |1+x|^p \geq 1+px+c_p(|x|^2 \vee |x|^p) \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

$$\text{当 } 1 < p < 2 \text{ 时, } |1+x|^p \geq 1+px+c_p(|x|^2 \wedge |x|^p) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

这里 $a \vee b = \max\{a, b\}$, $a \wedge b = \min\{a, b\}$.

【证】对 $x \geq 0, x \leq 0$ 和 $p \geq 2, 1 < p < 2$ 这几种情形分别证明.

Case1. $x \in [0, \infty)$.

Case1.1. $p \geq 2$. 先设 $x \in [0, 1]$. 考虑Lagrange 余项的Taylor 公式:

$$(1+x)^p = 1+px + \frac{p(p-1)(1+\xi)^{p-2}}{2}x^2 \geq 1+px + \frac{p(p-1)}{2}x^2.$$

其次设 $x \in [1, \infty)$. 令

$$f(x) = (1+x)^p - 1 - px - cx^p, \quad \text{其中 } c = \min\{1, 2^{p-1} - 1, 2^p - 1 - p\}.$$

计算导数: 对任意 $x \in [1, \infty)$,

$$f'(x) = p(1+x)^{p-1} - p - cpx^{p-1},$$

$$f''(x) = p(p-1)(1+x)^{p-2} - cp(p-1)x^{p-2} \geq 0.$$

所以

$$f'(x) \geq f'(1) = p2^{p-1} - p - cp = p(2^{p-1} - 1 - c) \geq 0, \quad x \in [1, \infty).$$

所以

$$f(x) \geq f(1) = 2^p - 1 - p - c \geq 0, \quad x \in [1, \infty).$$

所以

$$(1+x)^p \geq 1 + px + cx^p, \quad x \in [1, \infty).$$

Case1.2. $1 < p < 2$. 先设 $x \in [0, 1]$. 则如上

$$(1+x)^p = 1 + px + \frac{p(p-1)(1+\xi)^{p-2}}{2}x^2 \geq 1 + px + \frac{p(p-1)2^{p-2}}{2}x^2.$$

其次设 $x \in [1, \infty)$. 令

$$f(x) = (1+x)^p - 1 - px - cx^p, \quad \text{其中 } c = \min\{2^{p-2}, 2^{p-1} - 1, 2^p - p - 1\}.$$

计算导数: 注意 $p-2 < 0$, 对任意 $x \geq 1$ 有

$$\begin{aligned} f'(x) &= p(1+x)^{p-1} - p - cpx^{p-1}, \\ f''(x) &= p(p-1)(1+x)^{p-2} - cp(p-1)x^{p-2} \\ &\geq p(p-1)(2x)^{p-2} - cp(p-1)x^{p-2} = p(p-1)x^{p-2}(2^{p-2} - c) \geq 0 \end{aligned}$$

所以

$$f'(x) \geq f'(1) = p2^{p-1} - p - cp = p(2^{p-1} - 1 - c) \geq 0, \quad x \geq 1.$$

所以

$$f(x) \geq f(1) = 2^p - 1 - p - c \geq 0, \quad x \geq 1.$$

所以

$$(1+x)^p \geq 1 + px + cx^p, \quad x \in [1, \infty).$$

综合**Case1**中的结果, 我们证明了

$$\begin{aligned} \text{当 } p \geq 2 \text{ 时, } \quad (1+x)^p &\geq 1 + px + a_p(x^2 \vee x^p) \quad \forall x \geq 0, \\ \text{当 } 1 < p < 2 \text{ 时, } \quad (1+x)^p &\geq 1 + px + a_p(x^2 \wedge x^p) \quad \forall x \geq 0. \end{aligned}$$

其中

$$a_p = \min\left\{\frac{p(p-1)}{2}, 1, 2^{p-1} - 1, 2^p - 1 - p, \frac{p(p-1)2^{p-2}}{2}, 2^{p-2}\right\}.$$

Case2. $x \in (-\infty, 0]$.

Case2.1. 设 $p \geq 2$. 先设 $x \in [-1, 0]$. 则由伯努利不等式有

$$\begin{aligned} |1+x|^p &= (1+x)^p = (1+x)(1+x)^{p-1} \geq (1+x)(1+(p-1)x) \\ &= 1+x+(p-1)x+(p-1)x^2 = 1+px+(p-1)x^2. \end{aligned}$$

其次设 $x \in (-\infty, -1]$. 则 $-x \geq 1$. 使用凸函数不等式:

$$(a+b)^p \leq 2^{p-1}(a^p+b^p), \quad a, b \geq 0$$

有

$$\begin{aligned} |x|^p &= (-x)^p = (1+(-1-x))^p \leq 2^{p-1}(1+(-1-x)^p) = 2^{p-1} + 2^{p-1}(-1-x)^p \\ \implies |1+x|^p &= (-1-x)^p \geq 2^{1-p}|x|^p - 1 \geq 1+px+2^{1-p}|x|^p \end{aligned}$$

这里用到 $-x \geq 1, p \geq 2 \implies p(-x) \geq 2 \implies -1 \geq 1+px$.

Case2.2. 设 $1 < p < 2$. 先设 $x \in [-1, 0]$. 由Lagrange 余项的Taylor 公式有

$$|1+x|^p = (1+x)^p = 1+px + \frac{p(p-1)(1+\xi)^{p-2}}{2}x^2 \geq 1+px + \frac{p(p-1)}{2}x^2$$

这里用到 $-1 < \xi \leq 0 \implies 0 < 1+\xi \leq 1$ 从而由 $p-2 < 0$ 有 $(1+\xi)^{p-2} \geq 1$.

其次设 $x \in (-\infty, -1]$. 令 $t = -x$, 则 $t \geq 1$ 且 $|1+x| = -x-1 = t-1$. 令

$$f(t) = (t-1)^p - 1 + pt - ct^p, \quad t \in [1, \infty); \quad c = \min\{1, p-1\}.$$

计算导数: 对任意 $t > 1$,

$$\begin{aligned} f'(t) &= p(t-1)^{p-1} + p - cpt^{p-1}, \\ f''(t) &= p(p-1)(t-1)^{p-2} - cp(p-1)t^{p-2} = p(p-1)((t-1)^{p-2} - ct^{p-2}) \\ &\geq p(p-1)(t^{p-2} - ct^{p-2}) = p(p-1)t^{p-2}(1-c) \geq 0 \end{aligned}$$

这里用到 $p-2 < 0$. 所以

$$\begin{aligned} f'(t) &\geq f'(1) = p - cp \geq 0, \quad t \geq 1, \\ \implies f(t) &\geq f(1) = -1 + p - c \geq 0, \quad t \geq 1. \end{aligned}$$

所以

$$(t-1)^p \geq 1 - pt + ct^p \quad \text{即} \quad |1+x|^p \geq 1+px+c|x|^p.$$

综合**Case2**中的结果得到

$$\text{当 } p \geq 2 \text{ 时,} \quad |1+x|^p \geq 1+px+b_p|x|^2 \vee |x|^p \quad \forall x \leq 0,$$

当 $1 < p < 2$ 时, $|1+x|^p \geq 1+px+b_p(|x|^2 \wedge |x|^p) \quad \forall x \leq 0$.

其中

$$b_p = \min \left\{ p-1, 2^{1-p}, \frac{p(p-1)}{2} \right\}.$$

最后取上以上两种情形中系数 a_p, b_p 的最小者为 c_p 即完成了证明, 这个最小系数为

$$c_p = \min \{a_p, b_p\} = \min \left\{ \frac{p(p-1)}{2}, 2^{p-1}-1, 2^p-p-1, \frac{p(p-1)2^{p-2}}{2}, 2^{p-2}, p-1, 2^{1-p} \right\}.$$

易见 $c_p > 0$. 例如利用求导易证当 $p > 1$ 时 $2^p - p - 1 > 0$. □

17. 卓里奇第五章第3节习题p.218 第1题的修正和解答提示: 该题中的凸组合系数 α_i 均大于零, 因此应该假设所有 $x_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$. 否则该题不对. 证明时务必考虑指对恒等式:

$$\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^t \right)^{1/t} = \exp \left(\frac{\log(\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^t)}{t} \right).$$

然后用洛必达法则, 或导数的定义求 $t \rightarrow 0+$ 时的极限.

对于该题第四问(单调不减和严格递增), 要用到函数 $x \mapsto x \log(x)$ 在 $(0, \infty)$ 上的严格凸性.

16. 卓里奇第五章第3节习题p.195 第11 b)题和解答参考:

设实函数 f 在区间 $I \subset \mathbb{R}$ 上 n 次可微, $x_1, x_2, \dots, x_n \in I$ 互不相同. 证明满足 $L(x_i) = f(x_i) (i = 1, 2, \dots, n)$ 的次数 $\leq n-1$ 的 Lagrange 插值多项式 $L(x)$ 存在且唯一. 此外证明对任意 $x \in I$, 存在 $\xi \in I$ 使得

$$f(x) - L(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)}{n!} f^{(n)}(\xi).$$

【证】 我们将使用连乘记号. 令

$$l_i(x) = \left(\prod_{j=1}^n \mathbf{1}_{\{j \neq i\}}(x_i - x_j) \right)^{-1} \prod_{j=1}^n \mathbf{1}_{\{j \neq i\}}(x - x_j), \quad x \in \mathbb{R}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

则每个 $l_i(x)$ 都是 $n-1$ 次多项式, 且易见有

$$l_i(x_k) = \begin{cases} 1 & \text{if } k = i, \\ 0 & \text{if } k \neq i \end{cases} \quad i, k = 1, 2, \dots, n. \quad (1)$$

令

$$L(x) = \sum_{i=1}^n f(x_i) l_i(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

则 $L(x)$ 是次数 $\leq n-1$ 的多项式且由(1) 有

$$L(x_k) = f(x_k), \quad k = 1, 2, 3, \dots, n. \quad (2)$$

假设还有次数 $\leq n-1$ 的多项式 $\tilde{L}(x)$ 也满足(2), 令

$$P(x) = \tilde{L}(x) - L(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

则 P 是次数 $\leq n-1$ 的多项式, 因此可写

$$P(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1}.$$

周知, 有

$$P^{(n-1)}(x) \equiv (n-1)!c_{n-1}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

由(2) 有

$$P(x_k) = \tilde{L}(x_k) - L(x_k) = 0, \quad k = 1, 2, 3, \dots, n. \quad (3)$$

因此由本题的上一问(即**11 a**), 反复使用Rolle 定理) 知存在 $\xi \in \mathbb{R}$ 使得 $P^{(n-1)}(\xi) = 0$. 这蕴含 $c_{n-1} = 0$. 于是有

$$P(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{n-2}x^{n-2}.$$

从而有

$$P^{(n-2)}(x) \equiv (n-2)!c_{n-2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

而如上, 由(3) 知存在 $\tilde{\xi} \in \mathbb{R}$ 使得 $P^{(n-2)}(\tilde{\xi}) = 0$. 这蕴含 $c_{n-2} = 0$. 运用归纳法易证 $c_k = 0$ for all $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$. 所以 $P(x) \equiv 0, x \in \mathbb{R}$. 所以 $\tilde{L}(x) \equiv L(x), x \in \mathbb{R}$.

以上证明了Lagrange 插值多项式 $L(x)$ 的存在性和唯一性.

下证本题的第二部分. 任取 $x \in I$. 若 $x \in \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 则有

$$f(x) - L(x) = 0, \quad \prod_{j=1}^n (x - x_j) = 0$$

因此对任意 $\xi \in I$ 都有

$$f(x) - L(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \prod_{j=1}^n (x - x_j)$$

成立。 设 $x \notin \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. 则 $x, x_1, x_2, \dots, x_n$ 互不相同. 此时有 $\prod_{j=1}^n (x - x_j) \neq 0$. 考虑辅助函数

$$F(t) = f(t) - L(t) - \frac{\prod_{j=1}^n (t - x_j)}{\prod_{j=1}^n (x - x_j)} (f(x) - L(x)), \quad t \in I. \quad (4)$$

易见 $F(t)$ 在上 n 次可微并且

$$F(x) = F(x_1) = F(x_2) = \cdots = F(x_n) = 0 \quad (\text{即} F \text{有} n+1 \text{个互不相同的零点}).$$

因此由本题的上一问(即11 a)) 知存在 $\xi \in I$ 使得 $F^{(n)}(\xi) = 0$. 下面计算 n 次导数 $F^{(n)}(t), t \in I$.

因 $t \mapsto \prod_{j=1}^n (t - x_j) = t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \cdots + a_0$ 是首项系数为1的 n 次多项式, 故有

$$\frac{d^n}{dt^n} \prod_{j=1}^n (t - x_j) \equiv n!, \quad t \in \mathbb{R}.$$

而因 $L(t)$ 是次数 $\leq n-1$ 的多项式, 故有

$$L^{(n)}(t) \equiv 0.$$

于是由(4)有

$$F^{(n)}(t) = f^{(n)}(t) - \frac{n!}{\prod_{j=1}^n (x - x_j)} (f(x) - L(x)), \quad t \in I.$$

这就得到

$$0 = F^{(n)}(\xi) = f^{(n)}(\xi) - \frac{n!}{\prod_{j=1}^n (x - x_j)} (f(x) - L(x))$$

即

$$f^{(n)}(\xi) = \frac{n!}{\prod_{j=1}^n (x - x_j)} (f(x) - L(x))$$

即

$$f(x) - L(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \prod_{j=1}^n (x - x_j).$$

□

15. 卓里奇第五章第3节习题p.178 第7题的解答参考:

我们用黑体 $\mathbf{r}$ 表示向量. 同学们书写时可以加箭头, 即

$$\text{把}\mathbf{r}\text{写成}\vec{\mathbf{r}}, \text{即 } \mathbf{r} = \vec{\mathbf{r}} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

在 $\mathbb{R}^3$ 中引入内积: 对任意 $\mathbf{r}_1 = (x_1, y_1, z_1), \mathbf{r}_2 = (x_2, y_2, z_2)$, 定义二者的内积(也叫点积)为

$$\langle \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 \rangle = \mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_2 = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2.$$

定义 $\mathbf{r}$ 的长度为

$$|\mathbf{r}| = (\langle \mathbf{r}, \mathbf{r} \rangle)^{1/2} = (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r})^{1/2} = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}.$$

内积的基本运算性质是:

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 \rangle &= \langle \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1 \rangle; \\ \langle \alpha \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 \rangle &= \alpha \langle \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 \rangle; \quad (\alpha \in \mathbb{R}) \\ \langle \mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3 \rangle &= \langle \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_3 \rangle + \langle \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3 \rangle.\end{aligned}$$

考虑二体运动: 设两个物体的质量分别为 m_1, m_2 , 位于空间 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 处. 则物体 m_1 被物体 m_2 吸引的引力为

$$\mathbf{F}_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = Gm_1m_2 \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|^3} \quad (\text{从}\mathbf{r}_1 \text{ 指向}\mathbf{r}_2).$$

对称地, 物体 m_2 被物体 m_1 吸引的引力为(方向相反)

$$\mathbf{F}_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = Gm_1m_2 \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3} \quad (\text{从}\mathbf{r}_2 \text{ 指向}\mathbf{r}_1).$$

设这两个物体的运动轨迹为

$$\mathbf{r}_i(t) = (x_i(t), y_i(t), z_i(t)), \quad i = 1, 2; \quad t \in I$$

这里 $I \subset \mathbb{R}$ 为时间区间, 并假设运动轨迹是光滑的, 即假定 $t \mapsto \mathbf{r}_i(t)$ 有连续的二阶导数, $i = 1, 2$. 这样我们就可以使用牛顿第二定律. 周知

$$\mathbf{v}_i(t) = \mathbf{r}'_i(t) = (x'_i(t), y'_i(t), z'_i(t)) = \text{物体的速度},$$

$$\mathbf{r}''_i(t) = (x''_i(t), y''_i(t), z''_i(t)) = \text{物体的加速度}, \quad i = 1, 2; \quad t \in I.$$

于是由牛顿第二定律有

$$m_1 \mathbf{r}''_1(t) = \mathbf{F}_1(\mathbf{r}_1(t), \mathbf{r}_2(t)) = Gm_1m_2 \frac{\mathbf{r}_2(t) - \mathbf{r}_1(t)}{|\mathbf{r}_2(t) - \mathbf{r}_1(t)|^3}, \quad t \in I \quad (1)$$

$$m_2 \mathbf{r}''_2(t) = \mathbf{F}_2(\mathbf{r}_1(t), \mathbf{r}_2(t)) = Gm_1m_2 \frac{\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t)}{|\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t)|^3}, \quad t \in I \quad (2)$$

我们来证明 “动能+位能 $\equiv$ 常数” (一种机械能守恒律):

$$E(t) := \frac{1}{2}m_1|\mathbf{v}_1(t)|^2 + \frac{1}{2}m_2|\mathbf{v}_2(t)|^2 + Gm_1m_2 \frac{-1}{|\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t)|} \equiv \text{常数}, \quad t \in I.$$

也即等价地, 证明

$$E'(t) = \frac{d}{dt}E(t) \equiv 0, \quad t \in I.$$

为证明这一点, 我们将利用 “和的导数等于导数的和”, 因此先分别计算每一项的导数. 首先由复合函数求导有

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}m_i|\mathbf{v}_i(t)|^2 \right) = \frac{1}{2}m_i \frac{d}{dt} \left((x'_i(t))^2 + (y'_i(t))^2 + (z'_i(t))^2 \right)$$

$$= m_i(x'_i(t)x''_i(t) + y'_i(t)y''_i(t) + z'_i(t)z''_i(t)) = m_i\langle \mathbf{r}'_i(t), \mathbf{r}''_i(t) \rangle, \quad i = 1, 2.$$

将牛二定律(1),(2)代入得到

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m_1 |\mathbf{v}_1(t)|^2 + \frac{1}{2} m_2 |\mathbf{v}_2(t)|^2 \right) &= m_1 \langle \mathbf{r}'_1(t), \mathbf{r}''_1(t) \rangle + m_2 \langle \mathbf{r}'_2(t), \mathbf{r}''_2(t) \rangle \\ &= \langle \mathbf{r}'_1(t), m_1 \mathbf{r}''_1(t) \rangle + \langle \mathbf{r}'_2(t), m_2 \mathbf{r}''_2(t) \rangle \\ &= \langle \mathbf{r}'_1(t), \mathbf{F}_1(\mathbf{r}_1(t), \mathbf{r}_2(t)) \rangle + \langle \mathbf{r}'_2(t), \mathbf{F}_2(\mathbf{r}_1(t), \mathbf{r}_2(t)) \rangle \\ &= \left\langle \mathbf{r}'_1(t), Gm_1 m_2 \frac{\mathbf{r}_2(t) - \mathbf{r}_1(t)}{|\mathbf{r}_2(t) - \mathbf{r}_1(t)|^3} \right\rangle + \left\langle \mathbf{r}'_2(t), Gm_1 m_2 \frac{\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t)}{|\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t)|^3} \right\rangle \\ &= \left\langle \mathbf{r}'_1(t), Gm_1 m_2 \frac{\mathbf{r}_2(t) - \mathbf{r}_1(t)}{|\mathbf{r}_2(t) - \mathbf{r}_1(t)|^3} \right\rangle - \left\langle \mathbf{r}'_2(t), Gm_1 m_2 \frac{\mathbf{r}_2(t) - \mathbf{r}_1(t)}{|\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t)|^3} \right\rangle \\ &= Gm_1 m_2 \frac{1}{|\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t)|^3} \left(\langle \mathbf{r}'_1(t), \mathbf{r}_2(t) - \mathbf{r}_1(t) \rangle - \langle \mathbf{r}'_2(t), \mathbf{r}_2(t) - \mathbf{r}_1(t) \rangle \right) \\ &= Gm_1 m_2 \frac{-1}{|\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t)|^3} \langle \mathbf{r}'_1(t) - \mathbf{r}'_2(t), \mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t) \rangle. \end{aligned}$$

另一方面, 由复合函数求导有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{-1}{|\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t)|} \right) &= -\frac{d}{dt} \left((|\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t)|^2)^{-\frac{1}{2}} \right) \\ &= (-1) \frac{-1}{2} (|\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t)|^2)^{-\frac{3}{2}} \frac{d}{dt} (|\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t)|^2) \\ &= \frac{1}{2} (|\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t)|^2)^{-\frac{3}{2}} 2 \langle \mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t), \mathbf{r}'_1(t) - \mathbf{r}'_2(t) \rangle \\ &= \frac{1}{|\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t)|^3} \langle \mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t), \mathbf{r}'_1(t) - \mathbf{r}'_2(t) \rangle \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$\frac{d}{dt} \left(Gm_1 m_2 \frac{-1}{|\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t)|} \right) = Gm_1 m_2 \frac{1}{|\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t)|^3} \langle \mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t), \mathbf{r}'_1(t) - \mathbf{r}'_2(t) \rangle$$

它与上面动能的导数恰好反号, 所以

$$E'(t) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m_1 |\mathbf{v}_1(t)|^2 + \frac{1}{2} m_2 |\mathbf{v}_2(t)|^2 \right) + \frac{d}{dt} \left(Gm_1 m_2 \frac{-1}{|\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t)|} \right) \equiv 0.$$

所以 $E(t) \equiv$ 常数.

以上可以推广到 n 体运动: 设 $\mathbb{R}^3$ 中有 n 个物体(可设 $n \geq 3$), 它们的质量分别为 $m_1, m_2, \dots, m_n$, 位于空间 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n$ 处(这些点互不相同). 则物体 m_1 被物体 $m_2, m_3, \dots, m_n$ 吸引的引力(作为合力)为

$$\mathbf{F}_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n) = \sum_{j=1}^n \mathbf{1}_{\{j \neq 1\}} Gm_1 m_j \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_1|^3}.$$

物体 m_2 被物体 $m_1, m_3, m_4, \dots, m_n$ 吸引的引力(作为合力)为

$$\mathbf{F}_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n) = \sum_{j=1}^n \mathbf{1}_{\{j \neq 2\}} Gm_2 m_j \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_2|^3}.$$

一般地, 对任意 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 物体 m_i 被其余 $n - 1$ 个物体吸引的引力(作为合力) 为

$$\mathbf{F}_i(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n) = \sum_{j=1}^n \mathbf{1}_{\{j \neq i\}} G m_i m_j \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|^3}.$$

设

$$\mathbf{r}_i(t) = (x_i(t), y_i(t), z_i(t)), \quad t \in I$$

是第 i 个物体的运行轨迹(假定这些轨迹都是光滑的), 这里 $I \subset \mathbb{R}$ 为时间区间. 周知

$$\mathbf{v}_i(t) = \mathbf{r}'_i(t) = \text{物体的速度},$$

$$\mathbf{r}''_i(t) = \mathbf{v}'_i(t) = \text{物体的加速度}, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad t \in I.$$

于是由牛顿第二定律有

$$m_i \mathbf{r}''_i(t) = \mathbf{F}_i(\mathbf{r}_1(t), \mathbf{r}_2(t), \dots, \mathbf{r}_n(t)) = \sum_{j=1}^n \mathbf{1}_{\{j \neq i\}} G m_i m_j \frac{\mathbf{r}_j(t) - \mathbf{r}_i(t)}{|\mathbf{r}_j(t) - \mathbf{r}_i(t)|^3}, \quad t \in I$$

$i = 1, 2, \dots, n$. 我们来证明 “动能+位能 $\equiv$ 常数” (一种机械能守恒律):

$$E(t) := \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i |\mathbf{v}_i(t)|^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} G m_i m_j \frac{-1}{|\mathbf{r}_j(t) - \mathbf{r}_i(t)|} \equiv \text{常数}, \quad t \in I.$$

注意: 若 $a_{ij} = a_{ji}$, $i, j = 1, 2, \dots, n; i \neq j$, 则易见有

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \mathbf{1}_{\{i \neq j\}} a_{ij}.$$

于是只需证明

$$E(t) := \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i |\mathbf{v}_i(t)|^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \mathbf{1}_{\{i \neq j\}} G m_i m_j \frac{-1}{|\mathbf{r}_j(t) - \mathbf{r}_i(t)|} \equiv \text{常数}, \quad t \in I.$$

也即等价地, 证明

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i |\mathbf{v}_i(t)|^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \mathbf{1}_{\{i \neq j\}} G m_i m_j \frac{-1}{|\mathbf{r}_j(t) - \mathbf{r}_i(t)|} \right) \equiv 0, \quad t \in I.$$

为证明这一点, 我们将利用 “和的导数等于导数的和”, 因此先分别计算每一项的导数. 如上由复合函数求导有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i |\mathbf{v}_i(t)|^2 \right) &= \sum_{i=1}^n m_i \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} |\mathbf{v}_i(t)|^2 \right) \\ &= \sum_{i=1}^n m_i \langle \mathbf{r}'_i(t), \mathbf{r}''_i(t) \rangle = \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{r}'_i(t), m_i \mathbf{r}''_i(t) \rangle = \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{r}'_i(t), \mathbf{F}_i(\mathbf{r}_1(t), \mathbf{r}_2(t), \dots, \mathbf{r}_n(t)) \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^n \left\langle \mathbf{r}'_i(t), \sum_{j=1}^n 1_{\{j \neq i\}} G m_i m_j \frac{\mathbf{r}_j(t) - \mathbf{r}_i(t)}{|\mathbf{r}_j(t) - \mathbf{r}_i(t)|^3} \right\rangle \\
&= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 1_{\{j \neq i\}} \left\langle G m_i m_j \frac{\mathbf{r}_j(t) - \mathbf{r}_i(t)}{|\mathbf{r}_j(t) - \mathbf{r}_i(t)|^3}, \mathbf{r}'_i(t) \right\rangle.
\end{aligned}$$

插补一个等式: 设 $\mathbf{a}_{ij} = -\mathbf{a}_{ji}$, $i, j = 1, 2, \dots, n; i \neq j$, 则有

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 1_{\{j \neq i\}} \langle \mathbf{a}_{ij}, \mathbf{b}_i \rangle = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 1_{\{j \neq i\}} \langle \mathbf{a}_{ij}, \mathbf{b}_i - \mathbf{b}_j \rangle. \quad (3)$$

事实上我们有

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 1_{\{j \neq i\}} \langle \mathbf{a}_{ij}, \mathbf{b}_i \rangle = - \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n 1_{\{j \neq i\}} \langle \mathbf{a}_{ji}, \mathbf{b}_i \rangle = - \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n 1_{\{j \neq i\}} \langle \mathbf{a}_{ij}, \mathbf{b}_j \rangle$$

所以

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 1_{\{j \neq i\}} \langle \mathbf{a}_{ij}, \mathbf{b}_i \rangle &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 1_{\{j \neq i\}} \langle \mathbf{a}_{ij}, \mathbf{b}_i \rangle + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 1_{\{j \neq i\}} \langle \mathbf{a}_{ij}, \mathbf{b}_i \rangle \\
&= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 1_{\{j \neq i\}} \langle \mathbf{a}_{ij}, \mathbf{b}_i \rangle - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 1_{\{j \neq i\}} \langle \mathbf{a}_{ij}, \mathbf{b}_j \rangle \\
&= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 1_{\{j \neq i\}} \left(\langle \mathbf{a}_{ij}, \mathbf{b}_i \rangle - \langle \mathbf{a}_{ij}, \mathbf{b}_j \rangle \right) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 1_{\{j \neq i\}} \langle \mathbf{a}_{ij}, \mathbf{b}_i - \mathbf{b}_j \rangle.
\end{aligned}$$

所以(3)成立.

由(3) 得到

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i |\mathbf{v}_i(t)|^2 \right) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 1_{\{j \neq i\}} G m_i m_j \frac{-1}{|\mathbf{r}_j(t) - \mathbf{r}_i(t)|^3} \langle \mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t), \mathbf{r}'_i(t) - \mathbf{r}'_j(t) \rangle. \quad (4)$$

另一方面如上由复合函数求导有

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{-1}{|\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t)|} \right) = \frac{1}{|\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t)|^3} \langle \mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t), \mathbf{r}'_i(t) - \mathbf{r}'_j(t) \rangle.$$

所以有

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 1_{\{j \neq i\}} G m_i m_j \frac{-1}{|\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t)|} \right) &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 1_{\{j \neq i\}} G m_i m_j \frac{d}{dt} \left(\frac{-1}{|\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t)|} \right) \\
&= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 1_{\{j \neq i\}} G m_i m_j \frac{1}{|\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t)|^3} \langle \mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t), \mathbf{r}'_i(t) - \mathbf{r}'_j(t) \rangle. \quad (5)
\end{aligned}$$

比较(4), (5)两式的右端知二者只是互为反号, 于是得到

$$E'(t) = \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i |\mathbf{v}_i(t)|^2 \right) + \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 1_{\{j \neq i\}} G m_i m_j \frac{-1}{|\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t)|} \right) \equiv 0, \quad t \in I.$$

这就证明了上述机械能守恒: $E(t) \equiv \text{常数}$. (欢迎同学们讨论此题.)

□

14. 卓里奇第五章第1节习题p.159第4题和解答参考:

一个物体, 可以把它看作是一个质点, 在重力的作用下从一个光滑的小山上滑下来, 山坡是可微函数 $y = f(x)$ 的图像: $\{(x, f(x)) \mid x \in I\}$.

(a) 求物体在山坡上点 $(x_0, y_0) = (x_0, f(x_0))$ 处的加速度的水平分量和竖直分量.

(b) 当 $y = x^2$ 时且物体从很高的地方滑下来时, 求抛物线 $y = x^2$ 上使加速度的水平分量最大的点. (补充假定: 物体在下滑之前处于静态, 即下滑的初速度为零.)

注: 题目所说的“光滑”一般理解为: f 至少有连续的一阶导数, 而若研究中必须用到二阶导数时, 就假定 f 至少有连续的二阶导数, 等等. 本题解答中将使用向量的内积与模长:

$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} = a_1 b_1 + a_2 b_2$, 它称为向量 $\mathbf{a} = (a_1, a_2)$ 与 $\mathbf{b} = (b_1, b_2)$ 的内积,

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}.$$

【本题解答】 首先由题意知, 本题假定质点在三维空间中的滑动轨迹位于一张平面内, 并假设这平面就是 xy -平面, 而山形函数 f 在区间 I 上是光滑的, $[a, b] \subset I$, $0 = f(a) \leq f(x) \leq f(b)$ for all $x \in [a, b]$.

设

$$t \mapsto \mathbf{r}(t) = (x(t), y(t)), \quad t \in [0, T]$$

是质点沿着山坡 $(x, f(x))$ 下滑时的运动轨迹, 也即

$$y(t) = f(x(t)), \quad x(0) = b, \quad y(0) = f(x(0)) = f(b) = H.$$

不妨设质点开始下滑的位置为 $(b, f(b))$, 其中高度 $H := f(b) > 0$.

注意: 质点在点 $(b, f(b))$ 处可以有两种状态: 静止的(即初速度为零), 非静止的. 我们下面的分析包含了两种情况.

在以下分析中我们略去量纲(即考虑无量纲化的运动方程).

设 $m > 0$ 为质点的质量, $g \approx 9.8$ 为重力加速度. 设质点在时刻 t 的速度和加速度为 $\mathbf{v}(t), \mathbf{a}(t)$. 则

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) = (x'(t), y'(t)), \quad \mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t) = (x''(t), y''(t)).$$

为分析方便, 我们假定质点在下滑期间的速度不为零, 即

$$\mathbf{v}(t) \neq \mathbf{0} \quad \forall t \in (0, T).$$

因 $y'(t) = (f(x(t)))' = f'(x(t))x'(t)$, 故

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) = x'(t)(1, f'(x(t))), \quad t \in [0, T]. \quad (1)$$

由此可见 $\mathbf{v}(t) \neq 0 \iff x'(t) \neq 0$.

任取 $t_0 \in (0, T)$, 它对应的位于山坡上的点为 $(x_0, y_0) = (x_0, f(x_0))$, 即

$$(x_0, y_0) = (x_0, f(x_0)) = (x(t_0), f(x(t_0))) = (x(t_0), y(t_0)).$$

我们对位于 $(x_0, y_0) = (x_0, f(x_0))$ 处的质点做受力分析, 然后用牛顿第二定律导出机械能守恒律.

山坡在点 (x_0, y_0) 处的切线为

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0), \quad x \in \mathbb{R}, \quad \text{i.e.} \quad \frac{x - x_0}{1} = \frac{y - y_0}{f'(x_0)}.$$

因此点 (x_0, y_0) 处的切线方向和法线方向分别为

$$(1, f'(x_0)), \quad (-f'(x_0), 1).$$

设质点的质量为 m . 则质点在点 (x_0, y_0) 处受的重力为 $(0, -mg)$. 按上述两个垂直方向我们做此重力的垂直分解:

$$(0, -mg) = \lambda(1, f'(x_0)) + \mu(-f'(x_0), 1) = (\lambda - \mu f'(x_0), \lambda f'(x_0) + \mu)$$

解得

$$\lambda - \mu f'(x_0) = 0, \quad -mg = \lambda f'(x_0) + \mu = \mu([f'(x_0)]^2 + 1).$$

$\implies$

$$\mu = -\frac{mg}{1 + [f'(x_0)]^2}, \quad \lambda = -\frac{mg f'(x_0)}{1 + [f'(x_0)]^2}.$$

设山坡曲线在点 $(x_0, f(x_0)) = (x_0, y_0)$ 处的曲率半径为 R , 则

$$\frac{1}{R} = |\kappa(x_0)| = \frac{|f''(x_0)|}{(1 + [f'(x_0)]^2)^{3/2}} \quad (\text{见卓里奇第一卷p.220 习题10})$$

因此质点在 (x_0, y_0) 处的受到的向心力为 (注意 $\mathbf{v}(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0)) = (x'(t_0), f'(x(t_0))x'(t_0)) = (1, f'(x_0))x'(t_0)$)

$$\begin{aligned} \text{向心力} &= \pm \frac{m|\mathbf{v}(t_0)|^2}{R} \frac{(-f'(x_0), 1)}{|(-f'(x_0), 1)|} \\ &= \pm m|\mathbf{v}(t_0)|^2 \frac{|f''(x_0)|}{(1 + [f'(x_0)]^2)^{3/2}} \frac{(-f'(x_0), 1)}{(1 + [f'(x_0)]^2)^{1/2}} \\ &= \pm m|\mathbf{v}(t_0)|^2 \frac{|f''(x_0)|(-f'(x_0), 1)}{(1 + [f'(x_0)]^2)^2}. \end{aligned}$$

这里符号“ $\pm$ ”的确定方式如下: 根据向心力的定义和法向量 $(-f'(x_0), 1)$ 的指向,

当 $f'(x_0) > 0, f''(x_0) > 0$ 时取“ $+$ ”号,

当 $f'(x_0) > 0, f''(x_0) < 0$ 时取“ $-$ ”号,

当 $f'(x_0) < 0, f''(x_0) > 0$ 时取“ $+$ ”号,

当 $f'(x_0) < 0, f''(x_0) < 0$ 时取“ $-$ ”号. 以上四种情形统一写成

$$\text{向心力} = m|\mathbf{v}(t_0)|^2 \frac{f''(x_0)(-f'(x_0), 1)}{(1 + [f'(x_0)]^2)^2}.$$

质点在 (x_0, y_0) 处受到的支持力 $\mathbf{N}$ 等于重力的一个反向分力与向心力之和(它垂直于切线方向, 使物体保持在山坡上):

$$\text{支持力}\mathbf{N} = (-1)\mu(-f'(x_0), 1) + \text{向心力}. \quad (2)$$

因此质点在 (x_0, y_0) 处受到的合力为

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(t_0) &= \text{重力} + \text{支持力} = (0, -mg) + (-1)\mu(-f'(x_0), 1) + \text{向心力} \\ &= \lambda(1, f'(x_0)) + m|\mathbf{v}(t_0)|^2 \frac{f''(x_0)(-f'(x_0), 1)}{(1 + [f'(x_0)]^2)^2} \\ &= -\frac{mgf'(x_0)}{1 + [f'(x_0)]^2}(1, f'(x_0)) + m|\mathbf{v}(t_0)|^2 \frac{f''(x_0)(-f'(x_0), 1)}{(1 + [f'(x_0)]^2)^2}. \end{aligned}$$

根据牛顿第二定律有 (下面将 t_0 代入, 即使用表示 $x_0 = x(t_0)$)

$$m\mathbf{r}''(t_0) = \mathbf{F}(t_0) = -\frac{mgf'(x(t_0))(1, f'(x(t_0)))}{1 + [f'(x(t_0))]^2} + m|\mathbf{v}(t_0)|^2 \frac{f''(x(t_0))(-f'(x(t_0)), 1)}{(1 + [f'(x(t_0))]^2)^2}.$$

因 $t_0 \in (0, T)$ 是任意时刻, 故得到

$$m\mathbf{r}''(t) = -\frac{mgf'(x(t))(1, f'(x(t)))}{1 + [f'(x(t))]^2} + m|\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))(-f'(x(t)), 1)}{(1 + [f'(x(t))]^2)^2}, \quad t \in (0, T). \quad (3)$$

这给出加速度的关系式:

$$\mathbf{r}''(t) = -\frac{gf'(x(t))(1, f'(x(t)))}{1 + [f'(x(t))]^2} + |\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))(-f'(x(t)), 1)}{(1 + [f'(x(t))]^2)^2}, \quad t \in (0, T). \quad (4)$$

由此我们可以导出机械能守恒律: 由(1), (4) 和 $(1, f'(x(t)))$ 垂直于 $(-f'(x(t)), 1)$ 我们计算

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{d}{dt} |\mathbf{v}(t)|^2 &= \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left((x'(t))^2 + (y'(t))^2 \right) = x'(t)x''(t) + y'(t)y''(t) = \mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}''(t) \\ &= x'(t)(1, f'(x(t))) \cdot \left(-\frac{gf'(x(t))(1, f'(x(t)))}{1 + [f'(x(t))]^2} + |\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))(-f'(x(t)), 1)}{(1 + [f'(x(t))]^2)^2} \right) \\ &= -\frac{mgf'(x(t))}{1 + [f'(x(t))]^2} x'(t)(1 + [f'(x(t))]^2) = -gf'(x(t))x'(t) = -gy'(t). \end{aligned}$$

所以

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{m}{2} |\mathbf{v}(t)|^2 + mgy(t) \right) = m \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} |\mathbf{v}(t)|^2 + gy'(t) \right) = 0 \quad \forall t \in (0, T).$$

所以

$$\frac{m}{2} |\mathbf{v}(t)|^2 + mgy(t) \equiv C$$

这就证明了动能与势能之和等于常数:

$$\frac{1}{2} m |\mathbf{v}(t)|^2 + mgy(t) \equiv C \text{ (常数)}, \quad t \in [0, T]. \quad (5)$$

将

$$|\mathbf{v}(t)|^2 = 2 \left(\frac{C}{m} - gy(t) \right) = 2 \frac{C}{m} - 2gf(x(t))$$

代入(4) 得到

$$\mathbf{r}''(t) = -\frac{gf'(x(t))(1, f'(x(t)))}{1 + [f'(x(t))]^2} + 2 \left(\frac{C}{m} - gf(x(t)) \right) \frac{f''(x(t))(-f'(x(t)), 1)}{(1 + [f'(x(t))]^2)^2} \quad (6)$$

也即当 $t \in (0, T)$ 时

$$\begin{aligned} x''(t) &= -\frac{gf'(x(t))}{1 + [f'(x(t))]^2} - \left(2 \frac{C}{m} - 2gf(x(t)) \right) \frac{f''(x(t))f'(x(t))}{(1 + [f'(x(t))]^2)^2}, \\ y''(t) &= -\frac{g[f'(x(t))]^2}{1 + [f'(x(t))]^2} + \left(2 \frac{C}{m} - 2gf(x(t)) \right) \frac{f''(x(t))}{(1 + [f'(x(t))]^2)^2}. \end{aligned}$$

在守恒律(5)中取 $t = 0$, 则常数 $2 \frac{C}{m}$ 被确定为(注意 $y(0) = f(b) = H$)

$$2 \frac{C}{m} = |\mathbf{v}(0)|^2 + 2gH.$$

代入上式得到: $t \in (0, T)$ 时

$$x''(t) = -\frac{gf'(x(t))}{1 + [f'(x(t))]^2} - \left(|\mathbf{v}(0)|^2 + 2g(H - f(x(t))) \right) \frac{f''(x(t))f'(x(t))}{(1 + [f'(x(t))]^2)^2}, \quad (7)$$

$$y''(t) = -\frac{g[f'(x(t))]^2}{1 + [f'(x(t))]^2} + \left(|\mathbf{v}(0)|^2 + 2g(H - f(x(t))) \right) \frac{f''(x(t))}{(1 + [f'(x(t))]^2)^2}. \quad (8)$$

让我们写出在任意时刻 t , 质点在 $(x(t), y(t))$ 所受的向心力和支持力:

$$\text{向心力} = m |\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))(-f'(x(t)), 1)}{(1 + [f'(x(t))]^2)^2}. \quad (9)$$

$$\text{支持力 } \mathbf{N} = (-1)\mu(-f'(x(t)), 1) + \text{向心力}. \quad (10)$$

同学们可能会问: 为什么(10)中关于支持力 $\mathbf{N}$ 的等式的右边是统一的“加上”向心力, 而不是“减去”向心力?, 或者为什么不根据曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x(t), y(t))$ 处的凸、凹性的不同而对向心力的系数取不同的符号?

对这个问题我的解释如下, 供同学们参考:

首先说明, 支持力的等式(10)是牛顿第二定律的结果, 其证明在下面给出.

其次从力学的角度看, (10)也是合理的:

如果山坡曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x(t), y(t))$ 处是凸的, 即 $f''(x)|_{x=x(t)} > 0$ (例如山坡凸曲线 $y = f(x) = x^2, f''(x) = 2 > 0$), 则此时向心力指向山坡的外侧(即指向斜上方), 其作用在于托住(顶住)物体使物体保持在山坡表面上;

如果山坡曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x(t), y(t))$ 处是凹的, 即 $f''(x)|_{x=x(t)} < 0$ (例如山坡为凹曲线 $y = f(x) = \sqrt{1-x}, f''(x) = -\frac{1}{4}(1-x)^{-3/2} < 0$), 则此时向心力指向山坡的内侧(即指向斜下方), 其作用在于与重力的分力一起拉住物体使物体保持在山坡上. **但是必须说明**, 如果山坡曲线很陡, 则物体可以从山坡某点开始脱离山坡表面, 从而导致另一种分析, 不符合题目的本意. 所以需要自动假定山坡曲线能使物体保持在山坡上, 例如山坡曲线为 $y = f(x) = x^2$ 即可做到这一点.

下面证明支持力的关系式(10). 为此我们令 $c(t)$ 是一个取值为1 或-1的函数, 使得在 t 时刻的支持力 $\mathbf{N}$ 可以写成

$$\begin{aligned} \text{支持力 } \mathbf{N} &= (-1)\mu(-f'(x(t)), 1) + c(t)\text{向心力} \\ &= (-1)\mu(-f'(x(t)), 1) + c(t)m|\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))(-f'(x(t)), 1)}{(1 + [f'(x(t))]^2)^2}. \end{aligned}$$

如上, 在 t 时刻质点在 $(x(t), y(t))$ 处受到的合力为

$$\mathbf{F}(t) = \text{重力} + \text{支持力} = -\frac{mgf'(x(t))(1, f'(x(t)))}{1 + [f'(x(t))]^2} + c(t)m|\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))(-f'(x(t)), 1)}{(1 + [f'(x(t))]^2)^2}$$

从而由牛顿第二定律得到加速度的关系式:

$$\mathbf{r}''(t) = -\frac{gf'(x(t))(1, f'(x(t)))}{1 + [f'(x(t))]^2} + c(t)|\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))(-f'(x(t)), 1)}{(1 + [f'(x(t))]^2)^2}, \quad t \in (0, T). \quad (11)$$

然后利用 $(1, f'(x(t)))$ 垂直于 $(-f'(x(t)), 1)$, 如上计算得到

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \frac{d}{dt} |\mathbf{v}(t)|^2 \\ &= x'(t)(1, f'(x(t))) \cdot \left(-\frac{gf'(x(t))(1, f'(x(t)))}{1 + [f'(x(t))]^2} + c(t)|\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))(-f'(x(t)), 1)}{(1 + [f'(x(t))]^2)^2} \right) \\ &= -\frac{mgf'(x(t))}{1 + [f'(x(t))]^2} x'(t)(1 + [f'(x(t))]^2) = -gf'(x(t))x'(t) = -gy'(t). \end{aligned}$$

因此

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} |\mathbf{v}(t)|^2 + gy(t) \right) = 0 \quad \forall t \in [0, T].$$

这证明了此时守恒律(5) 仍成立.

由 $y'(t) = f'(x(t))x'(t)$ 有

$$|\mathbf{v}(t)|^2 = [x'(t)]^2(1 + [f'(x(t))]^2). \quad (12)$$

代入守恒律(5)中得到

$$\frac{m}{2}[x'(t)]^2(1 + [f'(x(t))]^2) + mgf(x(t)) \equiv C$$

即

$$[x'(t)]^2(1 + [f'(x(t))]^2) + 2gf(x(t)) \equiv \text{常数}, \quad t \in [0, T].$$

两边对 t 求导得到

$$\begin{aligned} 0 &\equiv 2x'(t)x''(t)(1 + [f'(x(t))]^2) + [x'(t)]^2 2f'(x(t))f''(x(t))x'(t) + 2gf'(x(t))x'(t) \\ &= 2x'(t) \left(x''(t)(1 + [f'(x(t))]^2) + [x'(t)]^2 f'(x(t))f''(x(t)) + gf'(x(t)) \right). \end{aligned}$$

因 $x'(t) \neq 0$ for all $t \in (0, T)$, 故消去 $x'(t)$ 得到

$$x''(t)(1 + [f'(x(t))]^2) + [x'(t)]^2 f'(x(t))f''(x(t)) + gf'(x(t)) = 0$$

即

$$x''(t) = -\frac{gf'(x(t))}{1 + [f'(x(t))]^2} - \frac{[x'(t)]^2 f''(x(t))f'(x(t))}{1 + [f'(x(t))]^2}.$$

再次运用复合函数求导法得到 $y''(t)$ 的表达式:

$$\begin{aligned} y''(t) &= \frac{d}{dt}(f'(x(t))x'(t)) = f''(x(t))[x'(t)]^2 + f'(x(t))x''(t) \\ &= f''(x(t))[x'(t)]^2 - \frac{g[f'(x(t))]^2}{1 + [f'(x(t))]^2} - \frac{[x'(t)]^2 [f'(x(t))]^2 f''(x(t))}{1 + [f'(x(t))]^2} \\ &= -\frac{g[f'(x(t))]^2}{1 + [f'(x(t))]^2} + \frac{[x'(t)]^2 f''(x(t))}{1 + [f'(x(t))]^2}. \end{aligned}$$

结合关系式(12), 可将 $x''(t), y''(t)$ 写成

$$\begin{aligned} x''(t) &= -\frac{gf'(x(t))}{1 + [f'(x(t))]^2} - |\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))f'(x(t))}{(1 + [f'(x(t))]^2)^2}, \\ y''(t) &= -\frac{g[f'(x(t))]^2}{1 + [f'(x(t))]^2} + |\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))}{(1 + [f'(x(t))]^2)^2}. \end{aligned}$$

这就给出

$$\mathbf{r}''(t) = -\frac{gf'(x(t))(1, f'(x(t)))}{1 + [f'(x(t))]^2} + |\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))(-f'(x(t)), 1)}{(1 + [f'(x(t))]^2)^2}, \quad t \in (0, T). \quad (13)$$

比较加速度 $\mathbf{r}''(t)$ 的两个等式(11), (13) 得到

$$c(t)|\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))(-f'(x(t)), 1)}{(1 + [f'(x(t))]^2)^2} \equiv |\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))(-f'(x(t)), 1)}{(1 + [f'(x(t))]^2)^2}, \quad t \in (0, T).$$

于是得到恒等式:

$$c(t)m|\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))(-f'(x(t)), 1)}{(1 + [f'(x(t))]^2)^2} \equiv m|\mathbf{v}(t)|^2 \frac{f''(x(t))(-f'(x(t)), 1)}{(1 + [f'(x(t))]^2)^2}$$

也即我们证明了

$$c(t)\text{向心力} \equiv \text{向心力}, \quad t \in (0, T).$$

这就证明了支持力与重力的反向分力和向心力的关系式(10):

$$\text{支持力}\mathbf{N} = (-1)\mu(-f'(x(t)), 1) + c(t)\text{向心力} = (-1)\mu(-f'(x(t)), 1) + \text{向心力}, \quad t \in (0, T).$$

现在回到本题中的第一问, 设在 t_0 时刻质点位于山坡上点 $(x_0, y_0) = (x(t_0), y(t_0))$ 处. 则由(7),(8) 和 $f(x_0) = y_0$ 知此时质点的水平加速度和竖直加速度分别为

$$\begin{aligned} x''(t_0) &= -\frac{gf'(x_0)}{1 + [f'(x_0)]^2} - \left(|\mathbf{v}(0)|^2 + 2g(H - y_0)\right) \frac{f''(x_0)f'(x_0)}{(1 + [f'(x_0)]^2)^2}, \\ y''(t_0) &= -\frac{g[f'(x_0)]^2}{1 + [f'(x_0)]^2} + \left(|\mathbf{v}(0)|^2 + 2g(H - y_0)\right) \frac{f''(x_0)}{(1 + [f'(x_0)]^2)^2}. \end{aligned}$$

若质点从静止开始下滑, 即质点开始下滑时的初速度为零, 则有

$$\begin{aligned} x''(t_0) &= -\frac{gf'(x_0)}{1 + [f'(x_0)]^2} - 2g(H - y_0) \frac{f''(x_0)f'(x_0)}{(1 + [f'(x_0)]^2)^2}, \\ y''(t_0) &= -\frac{g[f'(x_0)]^2}{1 + [f'(x_0)]^2} + 2g(H - y_0) \frac{f''(x_0)}{(1 + [f'(x_0)]^2)^2}. \end{aligned}$$

对于本题的第二问, 山坡函数为 $y = f(x) = x^2$ 其中 $0 \leq x \leq b$. 这对应于上面的 $a = 0, b > 0$ 和 $f(b) = b^2 = H$. 根据假设还知质点下滑的初速度为零: $\mathbf{v}(0) = \mathbf{0}$. 计算: $f'(x) = 2x, f''(x) = 2$. 将这些代入上面的公式(7) 有

$$\begin{aligned} x''(t) &= \left(-\frac{g2x}{1 + 4x^2} - 2g(b^2 - x^2) \frac{4x}{(1 + 4x^2)^2}\right)_{x=x(t)} = -2g(1 + 4b^2) \frac{x}{(1 + 4x^2)^2} \Big|_{x=x(t)}. \\ \implies |x''(t)| &= 2g(1 + 4b^2) \frac{x}{(1 + 4x^2)^2} \Big|_{x=x(t)} \end{aligned}$$

为了确定 $\max_{0 \leq t \leq T} |x''(t)|$, 只需求出 $x_0 \in (0, b)$ 使得

$$\frac{x_0}{(1 + 4x_0^2)^2} = \max_{x \in [0, b]} \frac{x}{(1 + 4x^2)^2}.$$

令 $\varphi(x) = \frac{x}{(1 + 4x^2)^2}, x \in [0, \infty)$. 则 $\varphi(0) = 0, \varphi(\infty) = 0, \varphi(x) \geq 0$ for all $x \in [0, \infty)$. 因此最大值 $\max_{x \in [0, \infty)} \varphi(x)$ 存在且显然 > 0 . 设 $x_0 \in (0, \infty)$ s.t. $\varphi(x_0) = \max_{x \in [0, \infty)} \varphi(x)$.

因 $\varphi(x_0) > 0$, 故 $x_0 \in (0, \infty)$, 也即 φ 的最大值点 x_0 属于 φ 的定义域的**内部**. 根据极值原理有 $\varphi'(x_0) = 0$. 计算:

$$\varphi'(x) = \frac{(1+4x^2)^2 - x2(1+4x^2)8x}{(1+4x^2)^4} = \frac{1+4x^2-16x^2}{(1+4x^2)^3} = \frac{1-12x^2}{(1+4x^2)^3}, \quad x > 0.$$

$$\text{因此 } \varphi'(x_0) = 0 \iff x_0 = \frac{1}{\sqrt{12}}.$$

由此看出, 为使最大值能够在 $(0, b)$ 内达到, 应使 $b > \frac{1}{\sqrt{12}}$. 此时有

$$\max_{x \in [0, b]} \frac{x}{(1+4x^2)^2} = \max_{x \in [0, \infty)} \frac{x}{(1+4x^2)^2} = \frac{x}{(1+4x^2)^2} \Big|_{x=x_0=\frac{1}{\sqrt{12}}} = \frac{3\sqrt{3}}{32}.$$

这就是说, 为了质点的加速度的水平分量达到最大值, 质点开始下滑的位置 (b, b^2) 应满足 $b > \frac{1}{\sqrt{12}}$. 例如取 $b > \frac{1}{2}$ 则 $x_0 = \frac{1}{\sqrt{12}} \in (0, b)$.

结论: 质点从抛物型山坡 $y = x^2$ 上很高的地方 (b, b^2) 滑下来时, 在点 $(\frac{1}{\sqrt{12}}, \frac{1}{12})$ 处其加速度的水平分量达到最大值。

最后观察: 上述最大值为

$$\max_{0 \leq t \leq T} |x''(t)| = 2g(1+4b^2) \frac{3\sqrt{3}}{32} = g(1+4b^2) \frac{3\sqrt{3}}{16}.$$

它表明质点水平方向加速度的最大值与质点最初的高度 b^2 成正比(它应该与事实相符). $\square$

13. 卓里奇第五章第1节习题p.159 第3题和解答参考: 盛有水的玻璃杯绕水杯的轴线以常角速度 ω 旋转. 设 $y = f(x)$ 是杯内液体表面与通过旋转轴的一个平面的交线的方程.

a) 证明: $f'(x) = \frac{\omega^2}{g}x$, 其中 g 是重力加速度.

b) 如果旋转轴与玻璃杯轴线不重合, 则在a)中对函数 $f(x)$ 所提的条件(即关于导数的表达式) 是否发生变化?

【解】我们同时考虑a), b): 如上, 设 $y = f(x)$ 是杯内液体表面与通过旋转轴的一个平面—— 设为 xy -平面—— 的交线的方程. 设旋转轴为 y -轴(即直线 $x = 0$). 据旋转的对称性, 可设玻璃杯轴线为直线 $x = x_0$, 其中 $x_0 \geq 0$, 即这时水杯的轴线在旋转轴的右侧(包括 $x_0 = 0$ 即两轴重合的情形). 此处可以画图.

做受力分析: 考虑水杯右壁上的液体表面的位于 $(x, f(x))$ 处的一个质点, 这里 $x > x_0$. 这质点受到三个力而在此平面上处于平衡状态(即质点除了绕轴匀速旋转外, 没有其他运动), 这三个力是: 向水杯外侧(即向水平右侧)的离心力、向下的重力、向杯内左

上方的支持力(这个支持力 = -压力, 此处的压力当然是指液体对杯壁的压力). 由平衡, 即合力为零, 有

$$\text{离心力} + \text{重力} + \text{支持力} = 0.$$

即

$$\text{压力} = -\text{支持力} = \text{离心力} + \text{重力}$$

即

$$\lambda \left(1, -\frac{1}{f'(x)}\right) = (m\omega^2 x, 0) + (0, -mg)$$

解得

$$\lambda = m\omega^2 x, \quad -\frac{\lambda}{f'(x)} = -mg$$

因此

$$f'(x) = \frac{\omega^2}{g}x, \quad x > x_0.$$

由此得到通过绕 y -轴旋转的(玻璃杯中的)液体表面在 xy -平面上的交线方程为

$$y = f(x) = C + \frac{\omega^2}{2g}x^2, \quad |x| \geq x_0.$$

其中 C 是常数. 当 $x_0 = 0$ 时这曲线方程就是旋转轴与玻璃杯轴线重合时的曲线方程. $\square$

12 (Weierstrass函数: 处处连续处处不可导). 设 $0 < a < 1$, $b > 0$ 是整数且是奇数, 满足

$$ab > 1 + \frac{\pi}{2}(1 - a).$$

令

$$W(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a^k \cos(b^k \pi x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

则 $W(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上Hölder连续(Hölder指数至少为 $\alpha = \frac{\log(1/a)}{\log b}$), 但 $W(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处不可导.

【说明】 本题是卓里奇一个类似习题的替代品, 但这个例子更好且更容易严格证明! 网上有人认为卓书习题中的例子更简单. 实际上那是指直观上显得简单, 证明却比较麻烦. 本题是K.Weierstrass构造的例子, 它说明: 最好的无限次可微的初等函数的无限叠加可以产生处处不可微的函数.]

【证】 令 $\alpha = \frac{\log(1/a)}{\log b}$, 则由假设易见 $0 < \alpha < 1$. 先证明 W 的Hölder连续性:

$$|W(x) - W(y)| \leq L|x - y|^\alpha \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

其中 $L = \max\left\{\frac{\pi b}{ab-1} + \frac{2}{1-a}, \frac{2b^\alpha}{1-a}\right\}$.

首先易见 W 在 $\mathbb{R}$ 上有界:

$$|W(x)| \leq \sum_{k=0}^{\infty} a^k = \frac{1}{1-a} < \infty \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

对任意 $x, y \in \mathbb{R}$, 可设 $x \neq y$. 若 $|x - y| \geq \frac{1}{b}$, 即 $\frac{1}{|x-y|} \leq b$, 则

$$|W(x) - W(y)| \leq \frac{2}{1-a} = \frac{2}{1-a} \left(\frac{1}{|x-y|} \right)^{\alpha} |x-y|^{\alpha} \leq \frac{2}{1-a} b^{\alpha} |x-y|^{\alpha} \leq L|x-y|^{\alpha}.$$

设 $|x - y| < \frac{1}{b}$. 由

$$(0, \frac{1}{b}) = \bigcup_{n=1}^{\infty} [\frac{1}{b^{n+1}}, \frac{1}{b^n})$$

知存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得

$$|x - y| \in [\frac{1}{b^{n+1}}, \frac{1}{b^n}) \quad \text{即} \quad b^{-n-1} \leq |x - y| < b^{-n}.$$

此时有

$$\begin{aligned} |W(x) - W(y)| &= \sum_{k=0}^{\infty} a^k |\cos(b^k \pi x) - \cos(b^k \pi y)| \\ &= \sum_{k=0}^n a^k |\cos(b^k \pi x) - \cos(b^k \pi y)| + \sum_{k=n+1}^{\infty} a^k |\cos(b^k \pi x) - \cos(b^k \pi y)| \\ &\leq \sum_{k=0}^n a^k b^k \pi |x - y| + 2 \sum_{k=n+1}^{\infty} a^k = \frac{(ab)^{n+1} - 1}{ab - 1} \pi |x - y| + 2 \frac{a^{n+1}}{1-a} \\ &\leq \left(\frac{1}{ab-1} \pi b^{n+1} |x - y| + 2 \frac{1}{1-a} \right) a^{n+1} \leq \left(\frac{\pi b}{ab-1} + \frac{2}{1-a} \right) a^{n+1} \end{aligned}$$

这里用到 $b^n |x - y| \leq 1$. 因 $-(n+1) \log b \leq \log(|x - y|)$, 即 $-(n+1) \leq \frac{1}{\log b} \log(|x - y|)$, 故

$$a^{n+1} = e^{-(n+1) \log(1/a)} \leq e^{\frac{\log(1/a)}{\log b} \log(|x-y|)} = e^{\alpha \log(|x-y|)} = |x - y|^{\alpha}.$$

所以

$$|W(x) - W(y)| \leq \left(\frac{\pi b}{ab-1} + \frac{2}{1-a} \right) |x - y|^{\alpha} \leq L|x - y|^{\alpha}.$$

这就证明了 W 在 $\mathbb{R}$ 上Hölder连续.

下证 W 在 $\mathbb{R}$ 上处处不可微. 对任意 $x \in \mathbb{R}$, 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 据阿基米德原理有

$$\mathbb{R} = \bigcup_{p \in \mathbb{Z}} \left[\frac{p}{b^n}, \frac{p+1}{b^n} \right).$$

因此存在 $p_n = p_{n,x} \in \mathbb{Z}$ 使得

$$\frac{p_n}{b^n} \leq x < \frac{p_n + 1}{b^n}.$$

计算

$$W\left(\frac{p_n+1}{b^n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} a^k \cos(b^{k-n}\pi(p_n+1)) + \sum_{k=n}^{\infty} a^k \cos(b^{k-n}\pi(p_n+1)),$$

$$W\left(\frac{p_n}{b^n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} a^k \cos(b^{k-n}\pi p_n) + \sum_{k=n}^{\infty} a^k \cos(b^{k-n}\pi p_n).$$

因当 $k \geq n$ 时, b^{k-n} 是奇数, 故

$$\cos(b^{k-n}\pi(p_n+1)) = (-1)^{p_n+1}, \quad \cos(b^{k-n}\pi p_n) = (-1)^{p_n}, \quad k = n, n+1, n+2, \dots$$

由这两者反号得到

$$\begin{aligned} & \left| W\left(\frac{p_n+1}{b^n}\right) - W\left(\frac{p_n}{b^n}\right) \right| \\ &= \left| \sum_{k=0}^{n-1} a^k \cos(b^{k-n}\pi(p_n+1)) - \sum_{k=0}^{n-1} a^k \cos(b^{k-n}\pi p_n) + (-1)^{p_n+1} 2 \sum_{k=n}^{\infty} a^k \right| \\ &\geq 2 \sum_{k=n}^{\infty} a^k - \sum_{k=0}^{n-1} a^k \left| \cos(b^{k-n}\pi(p_n+1)) - \cos(b^{k-n}\pi p_n) \right| \\ &\geq 2 \sum_{k=n}^{\infty} a^k - \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{k-n} \pi = 2 \frac{a^n}{1-a} - \frac{\pi}{b^n} \frac{(ab)^n - 1}{ab - 1} \end{aligned}$$

以上用到 $|\cos(x) - \cos(y)| \leq |x - y|$. 于是得到

$$\begin{aligned} & \left| \frac{W\left(\frac{p_n+1}{b^n}\right) - W\left(\frac{p_n}{b^n}\right)}{\frac{1}{b^n}} \right| = b^n \left| W\left(\frac{p_n+1}{b^n}\right) - W\left(\frac{p_n}{b^n}\right) \right| \\ &\geq 2 \frac{(ab)^n}{1-a} - \pi \frac{(ab)^n - 1}{ab - 1} = (ab)^n \left(\frac{2}{1-a} - \frac{\pi}{ab - 1} \right) + \frac{\pi}{ab - 1} \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

这里用到假设

$$ab > 1, \quad \frac{2}{1-a} - \frac{\pi}{ab - 1} > 0.$$

因

$$\frac{p_n}{b^n} \leq x < \frac{p_n+1}{b^n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{W\left(\frac{p_n+1}{b^n}\right) - W\left(\frac{p_n}{b^n}\right)}{\frac{1}{b^n}} \right| = \infty$$

故由讲义第五章第例5.1.2知 W 在点 x 处不可导. □

11. 讲义第四章末尾的一道作业题: 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, $K \subset \mathbb{R}$ 为非空紧集. 假设 f 在 K 上是单射并且对每个 $x \in K$ 存在 $\varepsilon = \varepsilon_x > 0$ 使得 f 在 $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ 上也是单射. 证明存在开集 $\Omega \supset K$ 使得 f 在 Ω 上是单射.

【证】考虑集合

$$\Omega_\delta = \{x \in \mathbb{R} \mid \text{dist}(x, K) < \delta\}, \quad \delta > 0.$$

我们已证明了函数 $x \mapsto g(x) := \text{dist}(x, K)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续. 由连续函数的开集刻画(即连续函数在开集下的逆像是开集) 和 $(-\infty, \delta)$ 是开集, 可知

$$\Omega_\delta = g^{-1}((-\infty, \delta)) = \{x \in \mathbb{R} \mid g(x) \in (-\infty, \delta)\} \text{ 是开集.}$$

显然 $K \subset \Omega_\delta$. 来证明存在 $\delta > 0$, 使得 f 在 Ω_δ 上是单射.

[证法1(正证法, 有限覆盖):]

为记号简单也为了今后与高维空间研究的衔接, 我们把以 x 为中心 $\varepsilon > 0$ 为半径的开区间记作 $B(x, \varepsilon)$, 即 $B(x, \varepsilon) = (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$.

Step1. 由本题假设知, 对任意 $x \in K$ 存在 $\varepsilon_x > 0$ 使得 f 在 $B(x, \varepsilon_x)$ 上是单射. 由 $K \subset \bigcup_{x \in K} B(x, \frac{1}{2}\varepsilon_x)$ 和 K 是紧集知, 存在有限多个 $x_1, x_2, \dots, x_N \in K$ 使得

$$K \subset \bigcup_{j=1}^N B(x_j, \frac{1}{2}\varepsilon_j), \quad \text{其中 } \varepsilon_j = \varepsilon_{x_j}.$$

令

$$r = \min\{\frac{1}{2}\varepsilon_1, \frac{1}{2}\varepsilon_2, \dots, \frac{1}{2}\varepsilon_N\}.$$

则 $r > 0$.

Step2. 考虑 $\frac{1}{4}r$ 和最小数

$$\eta := \inf_{x, y \in K, |x-y| \geq \frac{1}{4}r} |f(x) - f(y)| = \min_{x, y \in K, |x-y| \geq \frac{1}{4}r} |f(x) - f(y)|.$$

需证明这个下确界 η 确实是最小数.

事实上由下确界的定义, 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 存在 $x_n, y_n \in K$ 满足 $|x_n - y_n| \geq \frac{1}{4}r$ 使得 $\eta \leq |f(x_n) - f(y_n)| < \eta + 1/n$. 这蕴含

$$\eta = \lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(y_n)|.$$

因 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset K$ 且 K 是紧集, 故存在 $x_0 \in K$ 和收敛子列 $x_{n_i} \rightarrow x_0 \in K$ ($i \rightarrow \infty$). 同理由 $\{y_n\}_{n=1}^\infty \subset K$, 存在 $y_0 \in K$ 和收敛子列 $y_{n_{i_j}} \rightarrow y_0 \in K$ ($j \rightarrow \infty$). 这给出

$$x_0, y_0 \in K, \quad |x_0 - y_0| = \lim_{j \rightarrow \infty} |x_{n_{i_j}} - y_{n_{i_j}}| \geq \frac{1}{4}r$$

同时由 f 连续有

$$\eta = \lim_{j \rightarrow \infty} |f(x_{n_{i_j}}) - f(y_{n_{i_j}})| = |f(x_0) - f(y_0)|.$$

这就证明了下确界 η 可以达到, 所以 $\eta = \min_{x, y \in K, |x-y| \geq \frac{1}{4}r} |f(x) - f(y)|$.

因 f 在 K 上是单射, 故有 $\eta > 0$.

其次令

$$K_r = \{x \in \mathbb{R} \mid \text{dist}(x, K) \leq r\}.$$

则如上, 由连续函数的闭集刻画(即连续函数在闭集下的逆像是闭集) 和 $[0, r]$ 是闭集知 K_r 是闭集. 易见 K_r 有界[细节: 令 $d = \max_{x, y \in K} |x - y|$, 则由 K 是紧集知 $d < \infty$. 取定一点 $c \in K$, 则对任意 $x \in K_r$, 取 $x^* \in K$ 使得 $\text{dist}(x, K) = |x - x^*|$, 则有 $|x - x^*| \leq r$ 从而有 $|x - c| \leq |x - x^*| + |x^* - c| \leq r + d =: R$. 这表明 $K_r \subset [c - R, c + R]$, 所以 K_r 是有界集]. 所以 K_r 是紧集. 因 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 故 f 在紧集 K_r 上连续从而在 K_r 上一致连续. 因此对于数 $\frac{1}{4}\eta > 0$, 存在 $\delta_1 > 0$ 使得

$$|f(x) - f(y)| < \frac{1}{4}\eta \quad \forall x, y \in K_r \text{ s.t. } |x - y| < \delta_1.$$

Step3. 令

$$\delta = \min\{\frac{1}{8}r, \delta_1\}.$$

则 $\delta > 0$. 来证明 f 在 Ω_δ 上是单射. 对任意 $x, y \in \Omega_\delta, x \neq y$, 要证明 $f(x) \neq f(y)$.

为此我们取 $x^*, y^* \in K$ 使得

$$\text{dist}(x, K) = |x - x^*|, \quad \text{dist}(y, K) = |y - y^*|.$$

则 $|x - x^*| < \delta, |y - y^*| < \delta$. 因 $\delta < r$, 故 $\Omega_\delta \subset K_r$, 从而有 $|f(x) - f(x^*)| < \frac{1}{4}\eta$,

$$|f(y) - f(y^*)| < \frac{1}{4}\eta.$$

(1) 先设 $|x - y| \geq \frac{1}{2}r$. 此时有

$$|x^* - y^*| = |x^* - x + x - y + y - y^*| \geq |x - y| - |x - x^*| - |y - y^*| \geq \frac{1}{2}r - 2\delta \geq \frac{1}{4}r$$

因此有 $|f(x^*) - f(y^*)| \geq \eta$, 从而有

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= |f(x) - f(x^*) + f(x^*) - f(y^*) + f(y^*) - f(y)| \\ &\geq |f(x^*) - f(y^*)| - |f(x) - f(x^*)| - |f(y^*) - f(y)| \geq \eta - \frac{1}{4}\eta - \frac{1}{4}\eta > 0. \end{aligned}$$

这蕴含 $f(x) \neq f(y)$.

(2) 其次设 $|x - y| < \frac{1}{2}r$. 因 $x^* \in K \subset \bigcup_{j=1}^N B(x_j, \frac{1}{2}\varepsilon_j)$, 故存在 $j \in \{1, 2, \dots, N\}$ 使得 $x^* \in B(x_j, \frac{1}{2}\varepsilon_j)$. 由此有

$$|x - x_j| \leq |x - x^*| + |x^* - x_j| < \delta + \frac{1}{2}\varepsilon_j \leq \frac{1}{8}r + \frac{1}{2}\varepsilon_j \leq \frac{9}{16}\varepsilon_j$$

从而有

$$|y - x_j| \leq |y - x| + |x - x_j| < \frac{1}{2}r + \frac{9}{16}\varepsilon_j < \varepsilon_j.$$

这表明 x, y 都属于 $B(x_j, \varepsilon_j)$. 于是由 f 在 $B(x_j, \varepsilon_j)$ 上为单射知 $f(x) \neq f(y)$.

综上所述我们证明了 f 在 Ω_δ 上是单射。

[证法2(反证法, 列紧性):] 假设对任意 $\delta > 0$, f 在 Ω_δ 上都不是单射. 那么对每个 $n \in \mathbb{N}$, 取 $\delta = 1/n$, 则存在 $x_n, y_n \in \Omega_{1/n}$ 使得 $x_n \neq y_n$ 但 $f(x_n) = f(y_n)$. 由 $\Omega_{1/n}$ 的定义, 存在 $x_n^*, y_n^* \in K$ 使得 $\text{dist}(x_n, K) = |x_n - x_n^*|, \text{dist}(y_n, K) = |y_n - y_n^*|$, 因此

$$|x_n - x_n^*| < 1/n, \quad |y_n - y_n^*| < 1/n, \quad f(x_n) = f(y_n), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (*)$$

因 $\{x_n^*\}_{n=1}^\infty \subset K$ 且 K 是紧集, 故存在 $x_0 \in K$ 和子列 $x_{n_{i_j}}^* \rightarrow x_0 (i \rightarrow \infty)$. 同理因 $\{y_n^*\}_{n=1}^\infty \subset K$, 故存在 $y_0 \in K$ 和子列 $y_{n_{i_j}}^* \rightarrow y_0 (j \rightarrow \infty)$. 由(*)和 f 连续得知

$$\lim_{j \rightarrow \infty} x_{n_{i_j}} = x_0, \quad \lim_{j \rightarrow \infty} y_{n_{i_j}} = y_0, \quad f(x_0) = \lim_{j \rightarrow \infty} f(x_{n_{i_j}}) = \lim_{j \rightarrow \infty} f(y_{n_{i_j}}) = f(y_0).$$

因 $x_0, y_0 \in K$ 且 f 在 K 上是单射, 故得 $x_0 = y_0$. 于是当 $j \rightarrow \infty$ 时 $x_{n_{i_j}}$ 和 $y_{n_{i_j}}$ 都收敛于 x_0 . 而由假设知存在 $\varepsilon > 0$ 使得 f 在 $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ 上是单射. 对此 $\varepsilon > 0$, 当 $j \gg 1$ 时有 $x_{n_{i_j}}, y_{n_{i_j}} \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$. 于是由 $f(x_{n_{i_j}}) = f(y_{n_{i_j}})$ 应有 $x_{n_{i_j}} = y_{n_{i_j}}$, 但这矛盾于 $x_n \neq y_n$ for all $n \in \mathbb{N}$. 这矛盾证明了必存在 $\delta > 0$, 使得 f 在 Ω_δ 上是单射. $\square$

10. 卓里奇第三章p.88 习题5: 回忆 e 的抽象准确表达式(见卓书p.86):

$$e = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{\theta_n}{n!n}, \quad 0 < \theta_n < 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (1)$$

由此和 $e = \sum_{k=0}^\infty \frac{1}{k!} > \sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{k!}$ 得到

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{1}{(n+1)!} < e < \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{1}{n!n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

该题的c)中, 对“证明关于 e 的上述过剩近似比不足近似好”的一个正确的理解是(例如): 证明当 $n \geq 2$ 时

$$\left| \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{1}{(n+1)!} - e \right| > \frac{1}{(n+2)!}, \quad (2)$$

$$\left| \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{1}{n!n} - e \right| < \frac{1}{(n+2)!} \cdot \frac{2}{n} \quad (3)$$

从而有

$$\frac{\left| \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{1}{n!n} - e \right|}{\left| \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{1}{(n+1)!} - e \right|} < \frac{2}{n} \quad \forall n \geq 2.$$

这就是说, 当 $n \geq 2$ 时, 在 $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ 的基础上, 添加 $\frac{1}{n!n}$ 要比添加 $\frac{1}{(n+1)!}$ 有更好的近似.

估计式(2)是显然的: 这是因为

$$e = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{1}{(n+1)!} + \sum_{k=n+2}^{\infty} \frac{1}{k!} > \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!}.$$

为证(3), 首先回忆该题的a), b):

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{1}{n!n} &= 3 - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)(k+1)!}, \quad n \geq 2, \\ e &= 3 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+1)!}. \end{aligned}$$

据此便有

$$0 < \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{1}{n!n} - e = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+1)!}, \quad n \geq 2.$$

来估计:

$$\begin{aligned} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+1)!} &= \frac{1}{n(n+1)(n+1)!} + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+1)!} \\ &\leq \frac{1}{n(n+1)(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} \\ &= \frac{1}{n(n+1)(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} \frac{1}{n+1} = \frac{1}{(n+2)!} \left(\frac{n+2}{n(n+1)} + \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \frac{1}{(n+2)!} \cdot \frac{2}{n}. \end{aligned}$$

这就给出估计(**). $\square$

9. 定义: 次数 ≥ 1 的整系数多项式的根叫做代数数. 证明代数数的全体是可数集.

[注: 不是代数数的数叫做超越数. 不是实的代数数的实数叫做实的超越数. 在卓里奇作业中, 学生可以只考虑实的超越数.]

【证】 证明中将使用代数基本定理: 每个 n 次多项式有根且至多有 n 个互不相同的根. 由此不难推知, 若一个多项式有无限多个互不相同的个根, 则这个多项式必恒为零, 即这多项式的系数都等于零.

对每个 $n \in \mathbb{N}$, 集合

$$\mathbb{P}_n = \{P_n \mid P_n(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_n z^n \mid a_k \in \mathbb{Z}, k = 0, 1, 2, \dots, n; a_n \neq 0\}.$$

是次数 = n 的整系数多项式的全体. 所有次数 ≥ 1 的整系数多项式的全体即为

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}_n.$$

来证明, 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 由下式给出的映射 $\varphi: \mathbb{P}_n \rightarrow \mathbb{Z}^{n+1}$,

$$\mathbb{P}_n \ni P_n \mapsto \varphi(P_n) := (a_0, a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}^{n+1}, \quad \text{其中 } P_n(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots + a_n z^n$$

是从 $\mathbb{P}_n$ 到 $\mathbb{Z}^{n+1}$ 的单射.

事实上若 $P_n, \tilde{P}_n \in \mathbb{P}_n$ 且 $P_n = \tilde{P}_n$, 即 $P_n(z) \equiv \tilde{P}_n(z)$, 即 $(P_n - \tilde{P}_n)(z) \equiv 0, z \in \mathbb{C}$, 即 $P_n - \tilde{P}_n$ 是零多项式, 则它的系数都为零, 即 $a_k = \tilde{a}_k, k = 0, 1, 2, \dots, n$, 因此 $(a_0, a_1, \dots, a_n) = (\tilde{a}_0, \tilde{a}_1, \dots, \tilde{a}_n)$, 即 $\varphi(P_n) = \varphi(\tilde{P}_n)$. 这表明 $P_n \mapsto \varphi(P_n) = (a_0, a_1, \dots, a_n)$ 确实是映射. 其次若 $P_n \neq \tilde{P}_n$, 则二者的系数不全相同, 即有 $(a_0, a_1, \dots, a_n) \neq (\tilde{a}_0, \tilde{a}_1, \dots, \tilde{a}_n)$, 即 $\varphi(P_n) \neq \varphi(\tilde{P}_n)$. 因此映射 $P_n \mapsto \varphi(P_n) = (a_0, a_1, \dots, a_n)$ 是单射. 所以 $\varphi: \mathbb{P}_n \rightarrow \mathbb{Z}^{n+1}$ 是单射.

因为 $\mathbb{Z}^{n+1}$ 是可数集, $\varphi: \mathbb{P}_n \rightarrow \mathbb{Z}^{n+1}$ 是单射, 故 $\mathbb{P}_n$ 是可数集. 因可数多个可数集的并是可数集, 所以 $\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}_n$ 是可数集. 显然它是无限集, 所以 $\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}_n$ 是可数无限集. 因此可将其编号成一个序列

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}_n = \{Q_1, Q_2, Q_3, \dots\} = \{Q_n\}_{n=1}^{\infty}.$$

每个整系数多项式 Q_n 的根的集合是有限集, 记作

$$Z_{Q_n} = \{z_1^{(n)}, z_2^{(n)}, \dots, z_{N_n}^{(n)}\}.$$

于是集合

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} Z_{Q_n}$$

就是代数数的全体. 因可数个可数集的并集是可数集, 所以代数数的全体 $\bigcup_{n=1}^{\infty} Z_{Q_n}$ 是可数集. $\square$

8 (见卓里奇第一卷p.60 习题4). 证明下面四条互相等价:

- (1) 实数的完备性公理.
- (2) 有限覆盖原理.
- (3) Weierstrass 聚点原理.
- (4) 闭区间套原理+阿基米德性质.

【证】 采取如下路线 “(1) $\implies$ (4) $\implies$ (3) $\implies$ (4) $\implies$ (2) $\implies$ (1).”

“(1) $\implies$ (4) $\implies$ (3)” 和 “(4) $\implies$ (2)” 已在讲义中证明.

“(3) $\implies$ (4)” : 先证阿基米德性质, 即证明 $\mathbb{N}$ 无上界. 若 $\mathbb{N}$ 有上界, 则 $\mathbb{N}$ 是一个有界无限集. 据Weierstrass 聚点原理, $\mathbb{N}$ 有聚点. 设 x_0 为 $\mathbb{N}$ 的一个聚点, 则由聚点的定义知 $\mathbb{N} \cap (x_0 - 1/2, x_0 + 1/2)$ 是无限集. 因此存在 $m, n \in \mathbb{N} \cap (x_0 - 1/2, x_0 + 1/2)$ 且 $m \neq n$. 设例如 $m < n$, 则得到 $x_0 - 1/2 < m < n < x_0 + 1/2 \implies 1 \leq n - m < 1/2 + 1/2 = 1$ 矛盾. 这矛盾证明了 $\mathbb{N}$ 无上界.

其次证闭区间套原理. 设一系列有界闭区间 $[a_n, b_n]$ 满足 $[a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}]$, $n = 1, 2, 3, \dots$ 和 $b_n - a_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. (注: 因已证明了阿基米德性质成立, 故可以建立极限概念.) 要证 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{x_0\}$ 是单点集.

对每个 $n \in \mathbb{N}$, 由 $a_n < b_n$ 不难证明 $[a_n, b_n]$ 是无限集(例如对任意 $N \in \mathbb{N}$, 把此区间 N 等分即知 $[a_n, b_n]$ 至少有 $N + 1$ 个元素.) 这蕴含对任意有限集 $E \subset \mathbb{R}$, 集合 $[a_n, b_n] \setminus E$ 非空. 据此我们依次

取 $x_1 \in [a_1, b_1]$,

取 $x_2 \in [a_2, b_2] \setminus \{x_1\}$,

取 $x_3 \in [a_3, b_3] \setminus \{x_1, x_2\}, \dots$,

(应用操作程序的归纳法原理, 递归地取) $x_n \in [a_n, b_n] \setminus \{x_1, x_2, \dots, x_{n-1}\}, n = 2, 3, 4, \dots$

这样的得到的 x_n 互不相同且 $x_n \in [a_1, b_1], n = 1, 2, 3, \dots$ 所以 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一个有界无穷集. 据Weierstrass 聚点原理, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有聚点. 设 x_0 为 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的一个聚点. 来证明 $x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$. 反证法, 设 $x_0 \notin \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$. 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $x_0 \notin [a_N, b_N]$ 即 $x_0 < a_N$ 或 $x_0 > b_N$. 先设 $x_0 < a_N$. 取 $\varepsilon = a_N - x_0 > 0$, 则交集 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \cap (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ 是无限集, 因此存在 $n > N$ 使得 $x_n \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$. 这就导致矛盾: $a_n \leq x_n < x_0 + \varepsilon = a_N \leq a_n$. 同理若 $x_0 > b_N$ 也有矛盾, 所以必有 $x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$. 又若 $x_* \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$, 则由 $x_0, x_* \in [a_n, b_n]$ 有 $|x_* - x_0| \leq b_n - a_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 所以 $|x_* - x_0| = 0$ 所以 $x_* = x_0$ 所以 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{x_0\}$ 是单点集.

“(2) $\implies$ (1)” : 设非空集合 $X, Y \subset \mathbb{R}$ 满足 $x \leq y$ for all $x \in X, y \in Y$. 来证明存在 $c \in \mathbb{R}$ 使得 $x \leq c \leq y$ for all $x \in X, y \in Y$.

Case1. 设存在 $(x_0, y_0) \in X \times Y$ 满足 $x_0 = y_0$. 此时 $c := x_0 = y_0$ 就是一个满足要求的分割点: 对任意 $x \in X, y \in Y$ 有 $x \leq y_0 = c = x_0 \leq y$.

Case2. 设对任意 $(x, y) \in X \times Y$ 都有 $x < y$. 取 $a \in X, b \in Y$. 来证明存在 $c \in [a, b]$ 使得对任意 $x \in X$ 都有 $x \leq c$ 并且对任意 $y \in Y$ 都有 $c \leq y$. 意即 $[a, b]$ 中的这个 c 就是一个满足要求的分割点.

反证法: 假设 $[a, b]$ 中没有满足要求的分割点, 则这等于说对任意 $c \in [a, b]$ 都有: 或者存在 $x_c \in X$ 使得 $c < x_c$ (从而 $c \in (a - 1, x_c), a < x_c$), 或者存在 $y_c \in Y$ 使得 $y_c < c$ (从

而 $c \in (y_c, b+1), y_c < b$. 据此我们得到 $[a, b]$ 的一个开区间族覆盖:

$$[a, b] \subset \bigcup_{x \in X_a} (a-1, x) \cup \bigcup_{y \in Y_b} (y, b+1)$$

其中

$$X_a = \{x \in X \mid a < x\}, \quad Y_b = \{y \in Y \mid y < b\}.$$

据有限覆盖原理, 存在 $N, M \in \mathbb{N}$ 和 $x_1, x_2, \dots, x_N \in X_a, y_1, y_2, \dots, y_M \in Y_b$ 使得

$$[a, b] \subset \bigcup_{i=1}^N (a-1, x_i) \cup \bigcup_{j=1}^M (y_j, b+1).$$

由 $x_i < y_j$ for all $i = 1, 2, \dots, N; j = 1, 2, \dots, M$, 得知

$$a < \max\{x_1, x_2, \dots, x_N\} < \min\{y_1, y_2, \dots, y_M\} < b.$$

(这里只用到有限多个实数中一定有最小数和最大数). 取一个 $c \in \mathbb{R}$ 满足

$$\max\{x_1, x_2, \dots, x_N\} \leq c \leq \min\{y_1, y_2, \dots, y_M\}.$$

来证明这个 c 便是 $[a, b]$ 中的一个满足要求的分割点从而与 “ $[a, b]$ 中没有满足要求的割点” 矛盾.

对任意 $x \in X$, 若 $x < a$, 则 $x < a < c$. 若 $x \geq a$, 则由 $x < b$ 知 $x \in [a, b]$. 而由 X, Y 的性质知 $x < y_j$ for all $j = 1, 2, \dots, M$, 因此 $x \notin \bigcup_{j=1}^M (y_j, b+1)$. 所以存在 $i \in \{1, 2, \dots, N\}$ 使得 $x \in (a-1, x_i)$ 从而有 $x < x_i \leq c$. 这证明了对任意 $x \in X$ 都有 $x \leq c$.

又对任意 $y \in Y$, 若 $y > b$, 则 $y > b > c$. 若 $y \leq b$, 则由 $a < y$ 知 $y \in [a, b]$. 而由 X, Y 的性质知 $x_i < y$ for all $i = 1, 2, \dots, N$, 因此 $y \notin \bigcup_{i=1}^N (a-1, x_i)$. 所以存在 $j \in \{1, 2, \dots, M\}$ 使得 $y \in (y_j, b+1)$ 从而有 $y > y_j > c$. 这证明了对任意 $y \in Y$ 都有 $y > c$.

以上证明了 c 是 $[a, b]$ 中的满足要求的分割点, 这与这种分割点不存在矛盾. $\square$

7 (见卓里奇第一卷p.55 习题16). 证明戴德金定理与实数完备性公理等价.

【证】首先叙述戴德金定理:

设 X, Y 是 $\mathbb{R}$ 的两个非空子集满足 $X \cup Y = \mathbb{R}$ 并且对任意 $x \in X$, 对任意 $y \in Y$ 都有 $x \leq y$. 则或者 $\max X$ 存在, 或者 $\min Y$ 存在 (即或者 X 有最大元, 或者 Y 有最小元).

“ $\implies$ ” 用戴德金定理推导实数完备性公理: 设 X, Y 是 $\mathbb{R}$ 的两个非空子集, 满足对任意 $x \in X$, 对任意 $y \in Y$ 都有 $x \leq y$. 要证明存在 $c \in \mathbb{R}$ 使得对任意 $x \in X$, 对任意 $y \in Y$ 都有 $x \leq c \leq y$.

为了应用戴德金定理, 需要把 X, Y 扩大以便满足戴德金定理的条件. 做集合

$$X^* = \{x \in \mathbb{R} \mid \forall y \in Y \text{ 都有 } x \leq y\}, \quad Y^* = \{y \in \mathbb{R} \mid \forall x \in X^* \text{ 都有 } x \leq y\}.$$

则易见 $X \subset X^*$, 从而有 $Y \subset Y^*$. 因此 X^*, Y^* 皆非空. 需证明 $X^* \cup Y^* = \mathbb{R}$. 只需证明 $X^* \cup Y^* \supset \mathbb{R}$. 反证法, 假设存在 $a \in \mathbb{R}$ 使得 $a \notin X^*$ 且 $a \notin Y^*$. 则由 X^*, Y^* 的定义知存在 $y_a \in Y$ 使得 $a > y_a$; 存在 $x_a \in X^*$ 使得 $x_a > a$. 这导致 $y_a < a < x_a$ 因此 $y_a < x_a$. 但由 $x_a \in X^*$ 和 $y_a \in Y$ 又应有 $x_a \leq y_a$, 这就与 $y_a < x_a$ 矛盾. 这矛盾证明了 $X^* \cup Y^* \supset \mathbb{R}$. 所以 $X^* \cup Y^* = \mathbb{R}$.

其次对任意 $x \in X^*$, 对任意 $y \in Y^*$, 据 Y^* 的定义知 $x \leq y$.

以上证明了 X^*, Y^* 满足戴德金定理的条件, 因此 $\max X^*$ 和 $\min Y^*$ 中至少有一个存在. 若 $c := \max X^*$ 存在, 则对任意 $x \in X$, 对任意 $y \in Y$, 由 $X \subset X^*, Y \subset Y^*$, 和 $c \in X^*$ 是 X^* 的最大元得知 $x \leq c \leq y$. 若 $c := \min Y^*$ 存在, 则对任意 $x \in X$, 对任意 $y \in Y$, 由 $X \subset X^*, Y \subset Y^*$, 和 $c \in Y^*$ 是 Y^* 的最小元得知 $x \leq c \leq y$. 这就证明了 X, Y 具有实数完备性公理中的性质, 所以实数完备性公理成立.

“ $\Leftarrow$ ”用实数完备性公理推导戴德金定理: 设 X, Y 是 $\mathbb{R}$ 的两个非空子集满足 $X \cup Y = \mathbb{R}$ 并且对任意 $x \in X$, 对任意 $y \in Y$ 都有 $x \leq y$. 据实数完备性公理, 存在 $c \in \mathbb{R}$ 使得对任意 $x \in X$, 对任意 $y \in Y$ 都有 $x \leq c \leq y$. 因 $\mathbb{R} = X \cup Y$, 故易见当 $c \in X$ 时, c 是 X 的最大元, 即 $\max X$ 存在; 当 $c \in Y$ 时, c 是 Y 的最小元, 即 $\min Y$ 存在. 所以 $\max X$ 和 $\min Y$ 二者至少有一个存在. 所以戴德金定理成立. $\square$

6. 证明: 即便不使用实数完备性公理(等价地, 不使用确界原理), 仍可以证明阿基米德性质(即自然数集 $\mathbb{N}$ 无上界)与阿基米德原理 等价.

【证】假设阿基米德性质成立. 我们在讲义pp.61-62的注2 中已经证明了“阿基米德性质”蕴含“自然数集 $\mathbb{N}$ 的非空的有界集必有最大元.”然后利用这个性质我们在第二章讲义p.68中证明了“整数集 $\mathbb{Z}$ 的每个非空的有上(下)界的子集必有最大(小)元.”这两个证明都不使用实数的完备性公理. 应用这第二个性质, 我们定义了实数的整数部分并在讲义p.69(第二章)中证明了阿基米德原理: 即对任意 $h > 0$, 对任意 $x \in \mathbb{R}$, 存在唯一的 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $kh \leq x < (k+1)h$. 所以阿基米德性质蕴含阿基米德原理.

反之假设阿基米德原理成立, 则对任意 $M > 0$, 在阿基米德原理中取 $h = 1$, 则存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $M < k + 1$. 取 $n = k + 1$, 则 $n > 0$ 即 n 是正整数, 因此 $n \in \mathbb{N}$ 且 $n > M$. 所以自然数集 $\mathbb{N}$ 无上界. 这证明了阿基米德原理蕴含阿基米德性质. $\square$

5.(联系卓里奇第一卷p.55 中的习题21 b)). 参见教学讲义第二章pp.62-63.

4.(联系卓里奇第一卷p.55 中的习题21 a)). 设自然数 n 满足 $\sqrt{n}$ 不是整数(例如 $n = 2$). 应用算数基本定理不难证明, $\sqrt{n}$ 必是无理数. 考虑集合

$$\mathbb{Q}(\sqrt{n}) = \{a + b\sqrt{n} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

证明: $\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 是一个数域, 即它关于加减乘除运算封闭, 且有加法零元0 和乘法单位元1. 此外证明按照实数集中通常的序 $\leq$, $\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 是一个序域(即满足序公理(III)), 且阿基米德原理成立, 但 $\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 不满足完备性公理(IV).

【证】首先注意, 本题中的集合和问题是在实数域 $\mathbb{R}$ (作为全序域和完备数域)已经存在的基础上提出的, 因此 $\mathbb{R}$ 中的数和性质都可以使用.

$\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 是一个数域的证明完全是计算, 这里只指出关键点: 因 $\sqrt{n}$ 是无理数, 故有

$$a, b \in \mathbb{Q}, a + b\sqrt{n} = 0 \implies a = b = 0.$$

于是在 $\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 中有:

$$a_1 + b_1\sqrt{n} = a_2 + b_2\sqrt{n} \iff a_1 = a_2, b_1 = b_2.$$

由此可知当 $a + b\sqrt{n} \in \mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 且 $a + b\sqrt{n} \neq 0$ 时, 有 $a - b\sqrt{n} \neq 0$ 从而有

$$\frac{1}{a + b\sqrt{n}} = \frac{a - b\sqrt{n}}{(a + b\sqrt{n})(a - b\sqrt{n})} = \frac{a - b\sqrt{n}}{a^2 - b^2n} = \frac{a}{a^2 - b^2n} + \frac{-b}{a^2 - b^2n}\sqrt{n} \in \mathbb{Q}(\sqrt{n}).$$

$\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 满足序公理(III)是明显的, 证明省略.

阿基米德原理的证明与实数域 $\mathbb{R}$ 的情形一样: 首先注意我们有

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{n}).$$

任取 $0 < h \in \mathbb{Q}(\sqrt{n}), x \in \mathbb{Q}(\sqrt{n})$. 令 $k = [x/h]$, 则 $k \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{n})$, 因此 $kh, (k+1)h \in \mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 且 $\frac{x}{h} - 1 < k = [\frac{x}{h}] \leq \frac{x}{h}$, 所以 $kh \leq x < (k+1)h$. 所以阿基米德原理成立.

下证 $\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 不满足完备性公理(IV).

先做技术准备: 因素数无限多, 故可取一素数 p 满足 $p > n$. 则 $\sqrt{p}$ 也是无理数. 此时断定 $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{n})$. 否则, $\sqrt{p} \in \mathbb{Q}(\sqrt{n})$, 则存在有理数 a, b 使得 $\sqrt{p} = a + b\sqrt{n}$. 这蕴含 $p = a^2 + b^2n + 2ab\sqrt{n}$. 因 $\sqrt{n}$ 是无理数, 故得 $2ab = 0$. 因 $\sqrt{p}$ 也是无理数, 故得知 $a = 0$, 从而得到 $\sqrt{p} = b\sqrt{n}, b > 0$. 写 $b = \frac{l}{k}$, 其中 $l, k \in \mathbb{N}$, 且 l, k 互质. 这导出 $p = \frac{l^2}{k^2}n$ 即 $pk^2 = l^2n$. 因 p 是素数且 $p > n$, 故必有 p 整除 l^2 . 同样因为 p 是素数知 p 整除 l , 所以可写 $l = pm, m \in \mathbb{N}$. 于是有 $pk^2 = p^2m^2n$ 即 $k^2 = pm^2n$. 同理得知 p 整除 k . 于是 l, k 有公因子 p , 这与 l, k 互质矛盾. 所以 $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{n})$.

令

$$X = \{a - \frac{1}{k}\sqrt{n} \mid a \in \mathbb{Q}, k \in \mathbb{N}, a < \sqrt{p}\}, \quad Y = \{a + \frac{1}{k}\sqrt{n} \mid a \in \mathbb{Q}, k \in \mathbb{N}, a > \sqrt{p}\}.$$

则易见 $X, Y \subset \mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 且

$$x < \sqrt{p} < y \quad \forall x \in X, \forall y \in Y.$$

来证明, 不存在 $c \in \mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 使得

$$x \leq c \leq y \quad \forall x \in X, \forall y \in Y.$$

反证法: 假设存在 $c \in \mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 使这上面不等式成立. 则对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $k \in \mathbb{N}$ 充分大使得 $\frac{\sqrt{n}}{k} < \varepsilon$, 再由有理数的稠密性, 存在有理数 a_1, a_2 使得

$$\sqrt{p} - \varepsilon < a_1 < \sqrt{p} < a_2 < \sqrt{p} + \varepsilon.$$

此时有 $a_1 - \frac{\sqrt{n}}{k} \in X, a_2 + \frac{\sqrt{n}}{k} \in Y$ 因而有

$$\begin{aligned} a_1 - \frac{\sqrt{n}}{k} < \sqrt{p} < a_2 + \frac{\sqrt{n}}{k}, \quad a_1 - \frac{\sqrt{n}}{k} \leq c \leq a_2 + \frac{\sqrt{n}}{k}, \\ \implies |\sqrt{p} - c| \leq a_2 - a_1 + 2\frac{\sqrt{n}}{k} < 2\varepsilon + 2\varepsilon = 4\varepsilon. \end{aligned}$$

因 $\varepsilon > 0$ 可以任意小, 这就迫使 $|\sqrt{p} - c| = 0$, 从而导出 $\sqrt{p} = c \in \mathbb{Q}(\sqrt{n})$, 与 $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 矛盾. 这个矛盾证明了上述集合 X, Y 不具有完备性公理(IV)中的性质. 所以 $\mathbb{Q}(\sqrt{n})$ 不满足完备性公理(IV). $\square$

3(卓里奇第一卷p.54, 习题7). 设自然数 m, n 的乘积 mn 可被素数 p 整除, 即存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $mn = pk$, 则 m 或 n 也可被 p 整除.

【证】 我们将使用卓里奇第一卷p.54, 习题6的结果, 即最大公因子的存在性及其线性组合关系. 设 $d \in \mathbb{N}$ 为 n, k 的最大公因子, 即存在 $n', k' \in \mathbb{N}$ 使得

$$n = n'd, \quad k = k'd.$$

则由卓里奇第一卷p.54, 习题6的结果还知存在 $l, s \in \mathbb{Z}$ 使得

$$ln + sk = d.$$

将 $n = n'd, k = k'd$ 代入上式然后消去 d 得到

$$ln' + sk' = 1.$$

再将 $n = n'd, k = k'd$ 代入 $mn = pk$ 中并消去 d 得到

$$mn' = pk'.$$

对等式 $1 = ln' + sk'$ 两边乘以 p 并注意 $pk' = mn'$ 得到

$$p = lpn' + spk' = lpn' + smn' = (lp + sm)n'.$$

因 p 是素数, n' 是自然数, 故整数 $lp + sm > 0$ 且

$$\text{或者 } lp + sm = 1 \quad \text{或者 } n' = 1.$$

当 $lp + sm = 1$ 时 $\implies p = n'$ 从而得知 $n = pd$, 因此 p 整除 n ;

当 $n' = 1$ 时, 由 $mn' = pk'$ 得知 $m = pk'$, 因此 p 整除 m . $\square$

2 (卓里奇p.54, 第10题, 关于有理数 q -进表示的习题).

证明: 一个实数 x 是有理数当且仅当对任意 $2 \leq q \in \mathbb{N}$, x 的 q 进制表示从某一位之后是循环的, 即存在 $M, N \in \mathbb{N}$ 使得

$$x = [x] + 0.a_1a_2\dots a_Mb_1b_2\dots b_Nb_1b_2\dots b_Nb_1b_2\dots b_N\dots$$

这里 $[x]$ 是 x 的整数部分, $a_i, b_j \in \{0, 1, \dots, q-1\}$.

【证】需要提前使用关于无穷级数的性质, 例如使用“正项级数重排后其值不变”这一重要性质.

先证明循环小数必是有理数: 这是因为, 根据正项级数的运算性质(正项级数重排后其值不变) 有

$$\begin{aligned} x - [x] &= 0.a_1a_2\dots a_Mb_1b_2\dots b_Nb_1b_2\dots b_Nb_1b_2\dots b_N\dots \\ &= \sum_{i=1}^M \frac{a_i}{q^i} + \sum_{j=1}^N \frac{b_j}{q^{M+j}} + \sum_{j=1}^N \frac{b_j}{q^{M+N+j}} + \dots + \sum_{j=1}^N \frac{b_j}{q^{M+kN+j}} + \dots \\ &= \sum_{i=1}^M \frac{a_i}{q^i} + \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=1}^N \frac{b_j}{q^{M+kN+j}}, \\ \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=1}^N \frac{b_j}{q^{M+kN+j}} &= \sum_{j=1}^N \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{b_j}{q^{M+kN+j}} \right) = \sum_{j=1}^N \frac{b_j}{q^{M+j}} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{q^{kN}} \right) = \sum_{j=1}^N \frac{b_j}{q^{M+j}} \cdot \frac{1}{1 - q^{-N}}. \end{aligned}$$

所以

$$x - [x] = \sum_{i=1}^M \frac{a_i}{q^i} + \sum_{j=1}^N \frac{b_j}{q^{M+j}} \cdot \frac{1}{1 - q^{-N}} \quad \text{是有理数.}$$

所以 x 是有理数.

反之假设 x 是有理数. 则其小数部分 $x - [x] \in [0, 1)$ 也是有理数. 设 $2 \leq q \in \mathbb{N}$. 不妨设 $x - [x] > 0$, 则存在 $n, m \in \mathbb{N}, m < n$, 使得 $x - [x] = \frac{m}{n}$. 把通常的10进制除法的算法写出来, 然后把10 换成 q , 我们得到算法:

确定唯一的 $a_1 \in \{0, 1, \dots, q-1\}$ 使得 $qm = a_1n + r_1$, 其中 $r_1 \in \{0, 1, \dots, n-1\}$,

确定唯一的 $a_2 \in \{0, 1, \dots, q-1\}$ 使得 $qr_1 = a_2n + r_2$, 其中 $r_2 \in \{0, 1, \dots, n-1\}$,

.....

确定唯一的 $a_i \in \{0, 1, \dots, q-1\}$ 使得 $qr_{i-1} = a_in + r_i$, 其中 $r_i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$,
 $i = 2, 3, 4, \dots$

由此得到

$$m = \frac{a_1}{q}n + \frac{r_1}{q}, \quad \frac{r_1}{q} = \frac{a_2}{q^2}n + \frac{r_2}{q^2}, \quad \dots \quad \frac{r_{i-1}}{q^{i-1}} = \frac{a_i}{q^i}n + \frac{r_i}{q^i},$$

$$i = 2, 3, 4, \dots$$

逐层代入得到

$$m = n\left(\frac{a_1}{q} + \frac{a_2}{q^2} + \dots + \frac{a_i}{q^i}\right) + \frac{r_i}{q^i}, \quad i = 1, 2, 3, \dots$$

即

$$\frac{m}{n} = \frac{a_1}{q} + \frac{a_2}{q^2} + \dots + \frac{a_i}{q^i} + \frac{r_i}{nq^i}, \quad i = 1, 2, 3, \dots$$

令 $i \rightarrow \infty$ 得到

$$\frac{m}{n} = \frac{a_1}{q} + \frac{a_2}{q^2} + \frac{a_3}{q^3} + \dots = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{q^i} = 0.a_1a_2a_3\dots$$

同时还有关系式:

$$r_{i-1}q = a_in + r_i \quad \text{即} \quad a_i = \frac{r_{i-1}q - r_i}{n}, \quad i = 2, 3, 4, \dots \quad (1)$$

由此可见, 若 r_i 是循环的, 则 a_i 也是循环的(证明见下面). 下证 r_i 是循环的.

为证 r_i 是循环的, 只需注意所有 $r_i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ ($i = 1, 2, 3, \dots$). 特别有

$$r_1, r_2, \dots, r_{n+1} \in \{0, 1, \dots, n-1\} = \{0\} \cup \{1\} \cup \{2\} \cup \dots \cup \{n-1\}.$$

据 **鸽笼原理**, 存在 $i_0 \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ 和下标 $L, M \in \{1, 2, \dots, n+1\}, L < M$, 使得 $r_L, r_M \in \{i_0\}$, 即 $r_L = r_M = i_0$.

$$\text{令} \quad N = M - L.$$

下证循环关系式成立:

$$r_{M+kN+j} = r_{L+j}, \quad j = 0, 1, \dots, N; \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (2)$$

我们对 k 用归纳法:

先证(2)对于 $k = 0$ 成立: 此时对 j 用归纳法. 当 $j = 0$ 时有 $r_M = r_L$. 假设对于 $j \in \{0, 1, \dots, N-1\}$ 有 $r_{M+j} = r_{L+j}$, 则由(1)有

$$r_{M+j}q = a_{M+j+1}n + r_{M+j+1}, \quad r_{M+j}q = r_{L+j}q = a_{L+j+1}n + r_{L+j+1},$$

$$\implies a_{M+j+1} = a_{L+j+1}, \quad r_{M+j+1} = r_{L+j+1}.$$

据有界归纳法原理知等式 $r_{M+j} = r_{L+j}$ 对所有 $j \in \{0, 1, \dots, N\}$ 成立. 这证明了(2)对 $k = 0$ 成立.

假设(2)对某个 $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$ 成立, 看 $k+1$ 时. 此时结合(1)有

$$\begin{aligned} r_{M+kN+j}q &= a_{M+kN+j+1}n + r_{M+kN+j+1}, \quad r_{M+kN+j}q = r_{L+j}q = a_{L+j+1}n + r_{L+j+1}, \\ \implies a_{M+kN+j+1} &= a_{L+j+1}, \quad r_{M+kN+j+1} = r_{L+j+1}, \quad j = 0, 1, \dots, N. \end{aligned}$$

取 $j = N-1, N$ 得知

$$r_{M+(k+1)N} = r_{M+kN+N} = r_M = r_L, \quad r_{M+(k+1)N+1} = r_{M+kN+N+1} = r_{M+1} = r_{L+1}.$$

这表明等式 $r_{M+(k+1)N+j} = r_{L+j}$ 对 $j = 0, 1$ 成立. 假设等式 $r_{M+(k+1)N+j} = r_{L+j}$ 对 $j \in \{0, 1, \dots, N-1\}$ 成立. 则结合(1)有

$$\begin{aligned} r_{M+(k+1)N+j}q &= a_{M+(k+1)N+j+1}n + r_{M+(k+1)N+j+1}, \\ r_{M+(k+1)N+j}q &= r_{L+j}q = a_{L+j+1}n + r_{L+j+1}, \\ \implies a_{M+(k+1)N+j+1} &= a_{L+j+1}, \quad r_{M+(k+1)N+j+1} = r_{L+j+1}. \end{aligned}$$

这表明把 j 换成 $j+1$ 时所证等式也成立, 因此由有界归纳法原理知等式 $r_{M+(k+1)N+j} = r_{L+j}$ 对所有 $j = 0, 1, \dots, N$ 成立. 这就证明了等式(2) 对 $k+1$ 也成立. 所以由归纳法原理知等式(2)对每个 $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$ 成立.

由(1), (2) 可见 a_i 是循环的, 即有

$$a_{M+kN+j} = a_{L+j}, \quad j = 1, 2, \dots, N; \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (3)$$

事实上由(1), (2) 知: 对任意 $j \in \{1, 2, \dots, N\}$ 和任意 $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$, 注意 $j-1 \in \{0, 1, \dots, N-1\}$, 有

$$a_{M+kN+j} = \frac{qr_{M+kN+j-1} - r_{M+kN+j}}{n} = \frac{qr_{L+j-1} - r_{L+j}}{n} = a_{L+j}.$$

所以(3)成立. 令

$$b_j = a_{L+j}, \quad j = 1, 2, \dots, N. \quad (4)$$

由 $M < M+N < M+2N < \dots < M+kN < \dots$ 易见所有 $\geq M+1$ 的自然数可以按这些区间分组排列成

$$\{i \in \mathbb{N} \mid i \geq M+1\} = \bigcup_{k=0}^{\infty} \{M+kN+1, M+kN+2, \dots, M+kN+N\} = \bigcup_{k=0}^{\infty} \{M+kN+j\}_{j=1}^N$$

从而有(使用(3),(4))

$$\begin{aligned}
 x - [x] &= \frac{m}{n} = \sum_{i=1}^M \frac{a_i}{q^i} + \sum_{i=M+1}^{\infty} \frac{a_i}{q^i} = \sum_{i=1}^M \frac{a_i}{q^i} + \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=1}^N \frac{a_{M+kN+j}}{q^{M+kN+j}} \\
 &= \sum_{i=1}^M \frac{a_i}{q^i} + \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=1}^N \frac{a_{L+j}}{q^{M+kN+j}} = \sum_{i=1}^M \frac{a_i}{q^i} + \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=1}^N \frac{b_j}{q^{M+kN+j}} \\
 &= 0.a_1a_2\dots a_Mb_1b_2\dots b_Nb_1b_2\dots b_Nb_1b_2\dots b_N\dots
 \end{aligned}$$

所以 $x - [x]$ 可表示成循环小数. □

1. 卓里奇第一卷p.26 习题1 b)及其证明(没留为作业, 因为讲义里已有基于Banach引理的证明):

设(非空)集合 X, Y, Z 满足 $X \supset Y \supset Z$ 且 $\text{card}(X) = \text{card}(Z)$, 证明 $\text{card}(X) = \text{card}(Y)$.

【证】(以下使用卓里奇p.26的提示, 并做了小修正、补充了细节)

由假设知存在双射 $f: X \rightarrow Z$. 考虑映射 $g: X \rightarrow Y$,

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{当 } x \in \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y) \\ x & \text{当 } x \in X \setminus \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y) \end{cases}$$

这里 $f^0(x) \equiv x, x \in X$; $f^n(x) = f \circ f \circ \dots \circ f(x)$ (f 与自己的 n 次复合). 易见

$$\begin{aligned}
 f \circ f^n &= f^{n+1} \quad \text{即} \quad f(f^n(x)) = f^{n+1}(x), \quad x \in X; \\
 f\left(\bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)\right) &= \bigcup_{n=0}^{\infty} f(f^n(X \setminus Y)) = \bigcup_{n=0}^{\infty} f^{n+1}(X \setminus Y) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^n(X \setminus Y).
 \end{aligned}$$

来证明上面定义的映射 g 是 X 到 Y 的双射.

先证明 g 是映射, 即证当 $x_1 = x_2 \in X$ 时 $g(x_1) = g(x_2)$. 但这是显然的因为 f 是映射.

其次证明 g 确实把 X 映入 Y , 即 $g(x) \in Y$ for all $x \in X$. 事实上对任意 $x \in X$, 当 $x \in \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$ 时, 有 $g(x) = f(x) \in Z \subset Y$; 当 $x \notin \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$ 时有 $x \notin f^0(X \setminus Y) = X \setminus Y$. 因已有 $x \in X$, 故这蕴含 $x \in Y$, 所以 $g(x) = x \in Y$.

再其次证明 g 是单射: 设 $x_1, x_2 \in X$ 且 $x_1 \neq x_2$, 要证 $g(x_1) \neq g(x_2)$. 讨论四种情形: 若 $x_1, x_2 \in \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$, 则由 g 的定义和 f 是单射知 $g(x_1) = f(x_1) \neq f(x_2) = g(x_2)$; 若 $x_1 \in \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y), x_2 \notin \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$, 则由 g 的定义知 $g(x_1) = f(x_1), g(x_2) = x_2$. 假如有 $g(x_1) = g(x_2)$ 即 $f(x_1) = x_2$, 则得出

$$x_2 = f(x_1) \in f\left(\bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^n(X \setminus Y) \subset \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$$

这与 $x_2 \notin \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$ 矛盾, 因此只能有 $g(x_1) \neq g(x_2)$.

若 $x_1 \notin \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$, $x_2 \in \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$, 则同理得知 $g(x_1) \neq g(x_2)$;

若 $x_1, x_2 \notin \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$, 则由 g 的定义知 $g(x_1) = x_1 \neq x_2 = g(x_2)$.

所以 g 是单射.

最后证明 g 是满射, 即 $Y = g(X)$. 已有 $Y \supset g(X)$. 而对任意 $y \in Y$, 看两种情形:

1) 若 $y \in Z$, 则由 $Z = f(X)$ 知存在 $x \in X$ 使得 $y = f(x)$. 当 $x \in \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$ 时, 由 g 的定义知有 $y = f(x) = g(x) \in g(X)$; 当 $x \notin \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$ 时, 由 f 是单射知 $f(x) \notin f\left(\bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$ 即 $y = f(x) \notin \bigcup_{n=1}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$. 但显然有 $y \in X \setminus Y = f^0(X \setminus Y)$, 所以

$$y \notin \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y).$$

所以由 g 的定义知 $y = g(y) \in g(X)$.

2) 若 $y \in Y \setminus Z$, 则由于

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} f^n(X \setminus Y) = f\left(\bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)\right) \subset f(X) = Z$$

知 $y \notin \bigcup_{n=1}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$. 但显然 $y \in X \setminus Y = f^0(X \setminus Y)$, 所以得知

$$y \notin \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y).$$

因此再由 $Y \subset X$ 知 $y \in X \setminus \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(X \setminus Y)$. 所以再由 g 的定义知 $y = g(y) \in g(X)$.

这就证明了 $Y \subset g(X)$. 所以 $Y = g(X)$, 即 g 是满射.

综上所述我们证明了 $g: X \rightarrow Y$ 是单满射, 即 g 是双射. 所以 $\text{card}(X) = \text{card}(Y)$.

g 是满射的另一证明: 注意 $f(X) = Z \subset Y \subset X$, 因此下面的集合都是 X 的子集. 令

$$Y^c = X \setminus Y, \quad A = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^n(Y^c), \quad A^c = X \setminus A.$$

则

$$f\left(\bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(Y^c)\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^n(Y^c) = A \subset f(X) = Z \subset Y,$$

$$\begin{aligned} g(X) &= g\left(\bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(Y^c)\right) \cup g\left(X \setminus \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(Y^c)\right) \\ &= f\left(\bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(Y^c)\right) \cup \left(X \setminus \bigcup_{n=0}^{\infty} f^n(Y^c)\right) \\ &= A \cup \left(X \setminus (Y^c \cup A)\right) = A \cup \left((Y^c)^c \cap A^c\right) = A \cup (Y \cap A^c) = Y. \end{aligned}$$

所以 g 是满射. $\square$

以上是对2024级的数学分析(1,2,3)的作业题中的部分难题解答参考.