

幾何学I演習 9 多様体上のベクトル場とフロー

1. 次の多様体 M 上で定義されたベクトル場 X について, X が生成する 1 径数変換群 $\text{Exp}(tX)$ を求めよ. また, ベクトル場が完備であるかどうかを述べよ.

$$(1) \quad X = \sum_{j=1}^n a_j \frac{\partial}{\partial x_j} \quad (a_j \text{ は定数}, M = \mathbf{R}^n)$$

$$(2) \quad X = \sum_{j=1}^n b_j x_j \frac{\partial}{\partial x_j} \quad (b_j \text{ は定数}, M = \mathbf{R}^n)$$

$$(3) \quad X = \frac{\partial}{\partial x_1} \quad (M = \mathbf{R}^n \setminus \{0\})$$

2. \mathbf{R}^n 上のベクトル場

$$X = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_j \frac{\partial}{\partial x_i}$$

に対して, X が生成する 1 径数変換群を行列 $A = (a_{ij})$ の指数写像を用いて表せ.

3. M を Riemann 多様体とする. M 上の C^∞ 関数 f について, 任意のベクトル場 X に対して

$$Xf = g(X, Y)$$

を満たすベクトル場 Y を $\text{grad } f$ で表す. ここで, g は Riemann 計量とする.

(1) 上のようなベクトル場 $\text{grad } f$ は, 一意に存在することを示せ. また, $\text{grad } f$ の局所座標による表示を与えよ.

(2) $M = S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ として, \mathbf{R}^3 のユークリッド計量から導かれる Riemann 計量を入れる. 座標関数 z を S^2 上の関数とみなして, $\text{grad } z$ を座標を用いて具体的に表せ. また, $\text{grad } z = 0$ となる点を求め, その点のまわりでの $\text{grad } z$ が生成するフローの様相を図示せよ.