重尾潜伏下のランサムウェア攻撃に対する攻撃・防疫合成半マルコフモデルと最適バックアップ設計: 検知投資の相転移と最適間隔の頻度漸近独立性

（匿名査読用）

Abstract

ランサムウェアの潜伏時間が Pareto(t_m, α) 分布に従う環境において，攻撃フェーズ（感染・潜伏・発症）と防疫フェーズ（検知・隔離・復旧）を 合成半マルコフ過程として定式化し，コンテナ再デプロイを含む定常コストレートを最小化するバックアップ設計問題を扱う．

本稿の数学的貢献は次の四点である．（1）潜伏状態の平均滞在時間 $\mathbb{E}[\min(T_{\mathrm{det}}, T_d)]$ が $\beta(I) > 0$ のもとで全 $\alpha > 0$ で常に有限であることを閉形式で示し，更新報酬定理の適用を α の制限なく正当化する（補題 3.1）．（2）Tauber 展開の剰余項が $|R(\beta)| \leq \alpha t_m/(1-\alpha) \cdot \beta = O(\beta)$ であることを，$1 - e^{-x} \leq x$ のみを用いて直接証明する（定理 4.1）．（3）完全モデルの期待損失 $Q_{\mathrm{full}}(\Delta)$ の閉形式微分を直接計算し，$\partial Q_{\mathrm{full}}/\partial\Delta = 0$ の唯一解が $\Delta^*_\infty = \big(L - \eta(d_1\tau_R + d_0)\big)/(\eta d_1 \kappa_s n)$ であることを証明する（定理 5.2）．この Δ^*_∞ は尾指数 α，攻撃頻度 λ，検知レート $\beta(I)$，復旧速度 μ_c, μ_d のいずれにも依存しない．（4）λ に依存しない閉形式上界 M_0 を陽に構成してレベル集合のコンパクト性を確立し，Bolzano-Weierstrass の定理によって $\Delta^*(\lambda) \to \Delta^*_\infty$（$\lambda \to \infty$）を 厳密に証明する（定理 5.5）．

パラメータを最大許容停止時間（MTPD）30 日に基づき設定すると $\Delta^*_\infty \approx 21.7$ 日（約 3 週間）となり，実際の IT 運用慣行と整合する．また動的保持延長を，ストレージコストと残存リスクをバランスする ニュースベンダー型最適化問題として定式化し，閉形式整数最適解を与える（命題 6.2）．

Contents

1 序論 **3**

2 モデルの定式化 **4**
2.1 攻撃フェーズと防疫フェーズ 4
2.2 バックアップと復旧モデル 4
2.3 完全モデルの期待損失と費用レート 5

3 更新報酬定理の適用条件 **5**

4 Tauber 漸近展開と相転移 **6**
4.1 Tauber 展開の剰余項 6
4.2 期待損失の $\alpha = 1$ 相転移 7

5 最適バックアップ設計 **8**
5.1 完全モデルの微分と大域最小点の閉形式 8
5.2 攻撃頻度に対する頻度漸近独立性 9
5.3 重尾環境の構造的特性 11

6 動的保持延長：ニュースベンダー型最適化 **11**
6.1 問題の定式化 11
6.2 閉形式の整数最適解 12

7 数値例 **12**
7.1 パラメータ設定 12
7.2 補題 3.1 の数値確認：全 (α, β) で有限 13
7.3 定理 4.1 の数値確認：$C(\beta) \leq$ 上界 13
7.4 定理 5.2 の数値確認：$\Delta^*_\infty = 21.66$ 日での唯一の零点 13
7.5 定理 5.5 の数値確認：λ 非依存 M_0 と収束 14
7.6 系 5.7 の数値確認：Taylor 近似の精度 14
7.7 命題 6.2 の数値確認：重尾ほど多い追加保持 14

8 まとめ **15**

1　序論

ランサムウェアの潜伏時間（dwell time）には強い重尾性が報告されており [1, 2, 3]，中央値が数十日に達する事例も存在する．この重尾性がバックアップ設計と検知投資の最適化に与える影響は理論的に十分解析されていない．

既存研究との関係　信頼性工学の予防保全モデル [9, 10] は 寿命分布の有限モーメントを前提とするが，$\alpha \le 1$ のとき $\mathbb{E}[T_d] = \infty$ であり，そのままでは更新報酬定理が適用できない．本稿は，この問題を補題 3.1 によって解決する：検知レート $\beta(I) > 0$ が正であれば，潜伏フェーズの平均滞在時間 $\mathbb{E}[\min(T_{\mathrm{det}}, T_d)]$ は 任意の $\alpha > 0$ で有限となる．

Gordon–Loeb (2002) [4] の情報セキュリティ投資モデルは 静的・一期間の侵害確率最小化問題として定式化されており，本稿の連続時間・定常コストレートモデルとは構造が異なる．両者を直接比較することは枠組みの相違から適切でない（注 5.4 参照）．

本稿の主要な貢献　本稿が導く中心的な結果は次の二点である．

1. **最適バックアップ間隔の閉形式**：$\Delta^*_\infty = (L - \eta(d_1\tau_R + d_0))/(\eta d_1 \kappa_s n)$ が完全モデルの唯一の大域最小点であり（定理 5.2），これは尾指数 α，攻撃頻度 λ，検知レート等に依存しない．パラメータを MTPD=30 日基準（$d_1 = 100$万円/日，$L = 3000$万円）に設定すると $\Delta^*_\infty \approx 21.7$ 日となり，実運用の週次〜月次バックアップと整合する．

2. **頻度漸近独立性の厳密証明**：固定費を込んだ最適間隔 $\Delta^*(\lambda)$ が $\lambda \to \infty$ で Δ^*_∞ に収束することを，λ 非依存の閉形式上界 M_0 によるコンパクト性と Bolzano-Weierstrass 定理を用いて厳密に証明する（定理 5.5）．

論文の構成　第 2 節でモデルを定式化する．第 3 節で更新報酬定理の適用条件を確立する．第 4 節で Tauber 漸近展開と相転移を論じる．第 5 節で最適バックアップ設計の主定理を証明する．第 6 節でニュースベンダー型保持延長問題を扱う．第 7 節で数値確認を行う．

2　モデルの定式化

2.1　攻撃フェーズと防疫フェーズ

ランサムウェア感染から被害確定までの過程を，攻撃側と防疫側の並行する確率過程として定式化する．

定義 2.1 (攻撃フェーズ)**.** 状態空間 $\{A_0, A_1, A_2, A_3\}$： A_0（無感染），A_1（潜伏感染），A_2（発症中），A_3（破壊完了）．攻撃到着は強度 $\lambda > 0$ の Poisson 過程；$A_0 \to A_1$ は各攻撃到着時，$A_1 \to A_2$ は潜伏時間 T_d 経過後，$A_2 \to A_3$ は $T_e \sim \mathrm{Exp}(\mu_e)$ 後に生起する．

仮定 2.2 (Pareto 潜伏時間)**.** $T_d \sim \mathrm{Pareto}(t_m, \alpha(I))$：生存関数 $\mathbb{P}(T_d > t) = (t_m/t)^{\alpha(I)}$（$t \geq t_m > 0$），尾指数 $\alpha(I) > 0$は投資 I の関数（仮定 2.4）．$\alpha(I) \leq 1$ のとき $\mathbb{E}[T_d] = \infty$ であり，既存の予防保全理論の直接適用が困難となる．

定義 2.3 (防疫フェーズ)**.** 状態空間 $\{D_0, D_1, D_2, D_3\}$： D_0（通常），D_1（検知），D_2（隔離），D_3（復旧中）．早期検知：$T_{\mathrm{det}} \sim \mathrm{Exp}(\beta(I))$（$T_d$ と独立）が T_d に先行した場合（$T_{\mathrm{det}} < T_d$）．症状検知：発症後に確率 $\eta \in (0, 1]$ で検知される．

仮定 2.4 (投資応答関数)**.** $\alpha(I), \beta(I) : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ はともに C^2，単調増加，凹型であり，$\lim_{I\to\infty} \alpha(I) = \alpha_{\max} < \infty$，$\lim_{I\to\infty} \beta(I) = \beta_{\max} < \infty$（飽和仮定）．$\alpha(0) > 0$，$\beta(0) > 0$.

合成状態空間は $\mathcal{S} = \{S_N, S_L, S_E, S_S, S_I, S_R, S_F\}$： S_N（正常），S_L（潜伏・未検知），S_E（早期検知済），S_S（発症後・症状検知待ち），S_I（隔離済），S_R（復旧中），S_F（全損）．

2.2　バックアップと復旧モデル

定義 2.5 (バックアップスケジュールと汚染範囲)**.** 間隔 $\Delta > 0$ で $n \in \mathbb{Z}_+$ 世代のバックアップを保持する．侵入後の全バックアップは汚染される：汚染世代数は $k = \lceil T_{\mathrm{det}}/\Delta \rceil$（早期検知時）または $k = \lceil T_d/\Delta \rceil$（症状検知時）．$k \geq n$ のとき全損（S_F），$k < n$ のとき復旧可能（S_R）．

定義 2.6 (コンテナ復旧時間)**.** 全停止時間 $T_{\mathrm{down}} = T_{\mathrm{iso}} + T_{\mathrm{rec}}$，$T_{\mathrm{rec}} = T_{\mathrm{scan}} + T_{\mathrm{clone}} + T_{\mathrm{deploy}}$，ここで $T_{\mathrm{scan}} = \kappa_s T_{\mathrm{det}}$（$\kappa_s > 0$：スキャン係数），$T_{\mathrm{clone}} \sim \mathrm{Exp}(\mu_c)$，$T_{\mathrm{deploy}} \sim \mathrm{Exp}(\mu_d)$，$T_{\mathrm{iso}} \sim \mathrm{Exp}(\mu_{\mathrm{iso}})$．平均復旧時間を $\tau_R := \mu_{\mathrm{iso}}^{-1} + \mu_c^{-1} + \mu_d^{-1}$ と書く．

クローンおよびデプロイを指数分布とするのは解析上の便宜であり，実環境（Kubernetes 等）での決定論的拡張は今後の課題である．

2.3 完全モデルの期待損失と費用レート

更新サイクルあたりの期待損失 Q_{full} を次のように分解する：

$$Q_{\text{full}}(\Delta;\alpha) := (1-p_{\text{e}})\big[\eta(d_1\tau_R + d_0)(1-F) + \eta d_1 \kappa_s E_T + F\cdot L\big]. \tag{1}$$

ここで各項の意味を以下で説明する：

p_{e}	$:= \mathbb{P}(T_{\text{det}} < T_d)$	早期検知確率（解析式は §4）
$F(\Delta;\alpha)$	$:= (t_m/(n\Delta))^{\alpha}$	発見前に全損する確率 $\mathbb{P}(T_d > n\Delta)$
$E_T(\Delta;\alpha)$	$:= \mathbb{E}[T_d\,\mathbf{1}(T_d \le n\Delta)]$	症状検知時の期待潜伏時間の寄与
L		全損時損失（定数）
d_1		単位時間停止コスト
d_0		固定復旧コスト
η		症状検知確率

E_T の閉形式（$\alpha \neq 1$）：Pareto 密度 $f_{T_d}(t) = \alpha t_m^{\alpha} t^{-(\alpha+1)}$ の積分より

$$E_T(\Delta;\alpha) = \int_{t_m}^{n\Delta} t\cdot \alpha t_m^{\alpha} t^{-(\alpha+1)}\,dt = \frac{\alpha t_m}{1-\alpha}\left[\left(\frac{n\Delta}{t_m}\right)^{1-\alpha} - 1\right]. \tag{2}$$

$\alpha = 1$ のときは $E_T = t_m \ln(n\Delta/t_m)$（対数積分）．

更新報酬定理（定理 3.3）のもとで，長期平均費用レートは：

$$C(I,n,n_{\text{ext}},\Delta) = C_I(I) + \frac{c_b}{\Delta} + c_n(n+n_{\text{ext}}) + \lambda Q_{\text{full}}(I,n,\Delta). \tag{3}$$

c_b/Δ はバックアップ固定費（間隔が短いほど高コスト），c_n は世代あたりストレージコストである．

パラメータ設定の根拠　停止損失を線形コストでモデル化する際の係数 d_1 と全損損失 L は，MTPD（最大許容停止時間：ISO 22301 [14]）を基準に設定する．$d_1 = 100$ 万円/日，$L = 3000$ 万円 とすると $L/d_1 = 30$ 日（MTPD）：「1 か月の停止で実質的全損に至る」という事業継続基準と整合する．線形停止コストは MTPD 以前の損害拡大を1次近似したものであり，非線形拡張は今後の課題である．

3 更新報酬定理の適用条件

重尾分布 $\alpha \le 1$ では $\mathbb{E}[T_d] = \infty$ となるため，更新報酬定理の適用に先立ち，合成半マルコフ過程の正再帰性を確立する必要がある．鍵となるのは，$\mathbb{E}[\min(T_{\text{det}}, T_d)]$ の有限性である．

補題 3.1 (潜伏状態の平均滞在時間の有限性)**.** $t_m > 0$，$\beta(I) > 0$，$\alpha(I) > 0$ の任意の組合せに対して，

$$\mathbb{E}[\min(T_{\mathrm{det}}, T_d)] = \frac{1 - e^{-\beta(I)t_m}}{\beta(I)} + \beta(I)^{\alpha(I)-1}\,\Gamma(1-\alpha(I),\, \beta(I)t_m) < \infty. \tag{4}$$

ここで $\Gamma(a,x) := \int_x^\infty u^{a-1}e^{-u}\,du$ は上不完全ガンマ関数である．特に $\alpha(I) \le 1$（$\mathbb{E}[T_d] = \infty$）の場合でも，$\beta(I) > 0$ が正であれば右辺は有限である．

Proof. 生存関数を用いた期待値の表現：

$$\mathbb{E}[\min(T_{\mathrm{det}}, T_d)] = \int_0^\infty \mathbb{P}(\min(T_{\mathrm{det}}, T_d) > t)\,dt = \int_0^{t_m} e^{-\beta(I)t}\,dt + \int_{t_m}^\infty e^{-\beta(I)t}\left(\frac{t_m}{t}\right)^{\alpha(I)} dt.$$

第一積分：$(1 - e^{-\beta(I)t_m})/\beta(I) < \infty$（明らか）．

第二積分：置換 $u = \beta(I)t$ により

$$t_m^{\alpha(I)} \int_{t_m}^\infty t^{-\alpha(I)} e^{-\beta(I)t}\,dt = \beta(I)^{\alpha(I)-1} \int_{\beta(I)t_m}^\infty u^{-\alpha(I)} e^{-u}\,du = \beta(I)^{\alpha(I)-1}\Gamma(1-\alpha(I),\, \beta(I)t_m).$$

$x_0 := \beta(I)t_m > 0$ に対し，$u^{-\alpha(I)}e^{-u} \le C_{\alpha(I)}e^{-u/2}$ （$C_{\alpha(I)} := \sup_{u>0} u^{-\alpha(I)}e^{-u/2} < \infty$）より $\int_{x_0}^\infty u^{-\alpha(I)}e^{-u}\,du \le C_{\alpha(I)} \cdot 2e^{-x_0/2} < \infty$．よって (4) の右辺は有限である． □

注 3.2. $\alpha(I) > 1$（$\mathbb{E}[T_d] < \infty$）のとき $\mathbb{E}[\min(T_{\mathrm{det}}, T_d)] \le \mathbb{E}[T_d] < \infty$（自明）．補題 3.1 の主な意義は $\alpha(I) \le 1$ の重尾ケースへの適用にある．

定理 3.3 (更新報酬定理の適用可能性)**.** 仮定 2.2，2.4 のもとで，任意の $\lambda > 0$，$\beta(I) > 0$，$n \ge 1$，$\Delta > 0$ に対して：

(i) 補題 3.1 より $\mathcal{S}$ の全状態の平均滞在時間が有限である．$\lambda > 0$ より非吸収部分の既約性が成立し，合成半マルコフ過程は正再帰的 [8].

(ii) L は定数，T_{down} の各成分は有限期待値を持ち，$\mathbb{E}[T_{\mathrm{det}} | T_{\mathrm{det}} < T_d] \le 1/\beta(I) < \infty$ より サイクルあたり期待費用が有限である．

(iii) 以上より，更新報酬定理 [12] を適用でき，(3) が長期平均費用レートと一致する．

4 Tauber 漸近展開と相転移

4.1 Tauber 展開の剰余項

早期検知確率 $p_{\mathrm{e}}(\beta) = 1 - \mathcal{L}_{T_d}(\beta)$（$\mathcal{L}_{T_d}$：Laplace 変換）の $\beta \to 0^+$ 漸近を求める．これは低投資域（$\beta(I) \to 0$）での費用挙動の分析に用いる．

定理 4.1 (Tauber 展開の剰余項と相対誤差)**.** $T_d \sim \mathrm{Pareto}(t_m, \alpha)$，$\alpha \in (0,1)$，$\beta > 0$ のとき：

$$p_{\mathrm{e}}(\beta) = t_m^{\alpha}\,\Gamma(1-\alpha)\,\beta^{\alpha} - C(\beta), \tag{5}$$

ここで補正項 $C(\beta) := \alpha t_m^{\alpha} \int_0^{t_m} (1-e^{-\beta t}) t^{-(\alpha+1)}\,dt \geq 0$ は：

$$0 \leq C(\beta) \leq \frac{\alpha t_m}{1-\alpha} \cdot \beta. \tag{6}$$

したがって剰余項 $R(\beta) := p_{\mathrm{e}}(\beta) - t_m^{\alpha}\Gamma(1-\alpha)\beta^{\alpha} = -C(\beta)$ は $O(\beta)$ であり，相対誤差は：

$$\frac{|R(\beta)|}{t_m^{\alpha}\Gamma(1-\alpha)\beta^{\alpha}} = O(\beta^{1-\alpha}) \to 0 \quad (\beta \to 0^+).$$

Proof. $p_{\mathrm{e}}(\beta) = \alpha t_m^{\alpha} \int_{t_m}^{\infty} (1-e^{-\beta t}) t^{-(\alpha+1)}\,dt$ を $\int_0^{\infty} - \int_0^{t_m}$ の差として表す.

主要項（$[0,\infty)$ 上の積分）：置換 $u = \beta t$ により，$\alpha t_m^{\alpha} \int_0^{\infty} (1-e^{-\beta t}) t^{-(\alpha+1)}\,dt = \alpha t_m^{\alpha} \beta^{\alpha} \int_0^{\infty} (1-e^{-u}) u^{-(\alpha+1)}\,du = t_m^{\alpha}\Gamma(1-\alpha)\beta^{\alpha}$，ここで $\int_0^{\infty} (1-e^{-u}) u^{-(\alpha+1)}\,du = \Gamma(1-\alpha)/\alpha$（$\alpha \in (0,1)$ で収束する標準積分 [5]）を用いた.

補正項（$[0, t_m]$ 上の積分）：$C(\beta) = \alpha t_m^{\alpha} \int_0^{t_m} (1-e^{-\beta t}) t^{-(\alpha+1)}\,dt \geq 0$（被積分関数が非負）．不等式 $1 - e^{-x} \leq x$（$x \geq 0$）を適用すると：

$$C(\beta) \leq \alpha t_m^{\alpha} \beta \int_0^{t_m} t^{-\alpha}\,dt = \alpha t_m^{\alpha} \beta \cdot \frac{t_m^{1-\alpha}}{1-\alpha} = \frac{\alpha t_m}{1-\alpha} \cdot \beta.$$

相対誤差：$C(\beta)/[t_m^{\alpha}\Gamma(1-\alpha)\beta^{\alpha}] \leq [\alpha t_m/((1-\alpha)\Gamma(1-\alpha)t_m^{\alpha})] \cdot \beta^{1-\alpha} \to 0$（$\beta \to 0^+$，$1-\alpha > 0$）. □

4.2 期待損失の $\alpha = 1$ 相転移

検知レート β が低いとき（低投資域）に期待損失がどう振る舞うかを，尾指数 α を基準に分類する.

補題 4.2 (Pareto Laplace 変換の漸近)**.** $T_d \sim \mathrm{Pareto}(t_m, \alpha)$，$\beta \to 0^+$ において：

（i）$\alpha \in (0,1)$：$\mathbb{E}[T_d e^{-\beta T_d}] = \alpha t_m^{\alpha} \beta^{\alpha-1} \Gamma(1-\alpha, \beta t_m) \sim \alpha t_m^{\alpha} \Gamma(1-\alpha) \beta^{\alpha-1} \to \infty$.

（ii）$\alpha = 1$：$\mathbb{E}[T_d e^{-\beta T_d}] = t_m E_1(\beta t_m) \sim -t_m \ln(\beta t_m) \to \infty$（$E_1$：指数積分 [7]）.

（iii）$\alpha > 1$：$\mathbb{E}[T_d e^{-\beta T_d}] \to \mathbb{E}[T_d] = \alpha t_m/(\alpha-1) < \infty$（Abel 定理 [5]）.

Proof. 置換 $u = \beta t$ より $\mathbb{E}[T_d e^{-\beta T_d}] = \alpha t_m^{\alpha} \beta^{\alpha-1} \Gamma(1-\alpha, \beta t_m)$. (i)：$x \to 0^+$ で $\Gamma(1-\alpha, x) \to \Gamma(1-\alpha) > 0$. (ii)：$\Gamma(0,x) = E_1(x) \sim -\ln x$（$x \to 0^+$）[7]. (iii)：$e^{-\beta T_d} \leq 1$ かつ $\mathbb{E}[T_d] < \infty$ より優収束定理が適用できる. □

定理 4.3 (純粋検知費用の相転移)**.** バックアップ世代境界なし（$n\Delta \to \infty$）の極限での期待損失 $Q_{\infty}(\beta) := d_1(\tau_R \mathcal{L}_{T_d}(\beta) + \mathbb{E}[T_d e^{-\beta T_d}])$（$\tau_R := \mu_c^{-1} + \mu_d^{-1} + \mu_{\mathrm{iso}}^{-1}$）の $\beta \to 0^+$ における漸近：

（i）$\alpha \in (0,1)$：$Q_\infty(\beta) \sim d_1 \alpha t_m^\alpha \Gamma(1-\alpha)\beta^{\alpha-1} \to \infty$；
（ii）$\alpha = 1$：$Q_\infty(\beta) \sim -d_1 t_m \ln(\beta t_m) \to \infty$；
（iii）$\alpha > 1$：$Q_\infty(\beta) \to d_1(\tau_R + \mathbb{E}[T_d]) < \infty$.

Proof. $\mathcal{L}_{T_d}(\beta) \in (0,1)$ は有界なので $d_1 \tau_R \mathcal{L}_{T_d}(\beta) = O(1)$. 主要な漸近挙動は $d_1 \mathbb{E}[T_d e^{-\beta T_d}]$ に支配され，補題 4.2 の各ケースを適用して従う. □

注 4.4 (相転移の工学的意義). $\alpha \le 1$ では $Q_\infty \to \infty$（$\beta(I) \to 0$）：低投資（低 $\beta(I)$）域では検知のみに依存する設計は費用が無限大になる．バックアップによる補完が不可欠である．$\alpha > 1$ では Q_∞ が有限極限を持つが，依然として Δ_∞^* へのバックアップ間隔の設計が費用最小化に必要である（第 5 節）.

定理 4.5 (早期検知確率の漸近). $p_{\mathrm{e}}(\beta) = 1 - \mathcal{L}_{T_d}(\beta)$ の $\beta \to 0^+$ 漸近：（i）$\alpha \in (0,1)$：定理 4.1 の式 (5)；（ii）$\alpha = 1$：$p_{\mathrm{e}}(\beta) \sim -\beta t_m \ln(\beta t_m) \to 0$；（iii）$\alpha > 1$：$p_{\mathrm{e}}(\beta) \sim \beta \mathbb{E}[T_d] = \beta \alpha t_m/(\alpha - 1) \to 0$（Abel 定理）.

5 最適バックアップ設計

費用レート (3) において，投資 I（したがって $\alpha(I), \beta(I)$）および n_{ext} を固定したとき，Δ に関する最適化は $\lambda Q_{\mathrm{full}}(\Delta) + c_b/\Delta$ の最小化に帰着する．本節では $Q_{\mathrm{full}}(\Delta;\alpha)$ の大域最小点の閉形式と，攻撃頻度 $\lambda \to \infty$ での収束を証明する.

5.1 完全モデルの微分と大域最小点の閉形式

仮定 5.1 ($\Lambda > 0$). $\Lambda := L - \eta(d_1 \tau_R + d_0) > 0$：全損時損失が期待復旧費用を超える．事業継続の文脈では $L \gg d_1 \tau_R$ が自然であり，常に成立する仮定である.

定理 5.2 ($Q_{\mathrm{full}}(\Delta)$ の閉形式微分と唯一の大域最小点). $Q_{\mathrm{full}}(\Delta;\alpha)$ を (1)–(2) で定義する（$\alpha > 0$；$\alpha = 1$ は注 5.3 参照）．仮定 5.1 のもとで以下が成立する：
（閉形式微分）

$$\frac{\partial Q_{\mathrm{full}}}{\partial \Delta} = (1 - p_{\mathrm{e}})\, \alpha\, F(\Delta;\alpha) \left[\eta d_1 \kappa_s n - \frac{\Lambda}{\Delta} \right]. \tag{7}$$

（唯一の大域最小点） $\partial Q_{\mathrm{full}}/\partial \Delta = 0$ の解は：

$$\Delta_\infty^* = \frac{\Lambda}{\eta d_1 \kappa_s n} = \frac{L - \eta(d_1 \tau_R + d_0)}{\eta d_1 \kappa_s n}, \tag{8}$$

の一点のみであり，$\partial Q_{\mathrm{full}}/\partial \Delta < 0$（$\Delta < \Delta_\infty^*$），$> 0$（$\Delta > \Delta_\infty^*$）.
（厳密な凸性）

$$\left. \frac{\partial^2 Q_{\mathrm{full}}}{\partial \Delta^2} \right|_{\Delta_\infty^*} = (1 - p_{\mathrm{e}})\, \alpha\, \frac{F(\Delta_\infty^*;\alpha)}{\Delta_\infty^*} \cdot \eta d_1 \kappa_s n > 0. \tag{9}$$

（α **非依存性**） Δ^*_∞ は α，λ，$\beta(I)$，μ_c，μ_d のいずれにも依存せず，コストパラメータ L，d_1，τ_R，d_0，η，κ_s，n のみで決まる．

Proof. $\partial F/\partial\Delta$ と $\partial E_T/\partial\Delta$ の計算： $F = (t_m/(n\Delta))^\alpha$ を微分すると $\partial F/\partial\Delta = -\alpha F/\Delta$． E_T については，微積分の基本定理から：

$$\frac{\partial E_T}{\partial\Delta} = n\Delta\cdot f_{T_d}(n\Delta) = n\Delta\cdot\alpha t_m^\alpha(n\Delta)^{-(\alpha+1)} = \alpha\, n\, F(\Delta;\alpha).$$

$\partial Q_{\text{full}}/\partial\Delta$ の計算： (1) を Δ で微分し，上の結果を代入する：

$$\begin{aligned}\frac{\partial Q_{\text{full}}}{\partial\Delta} &= (1-p_{\text{e}})\left[-\eta(d_1\tau_R+d_0)\frac{\partial F}{\partial\Delta}+\eta d_1\kappa_s\frac{\partial E_T}{\partial\Delta}+L\frac{\partial F}{\partial\Delta}\right]\\ &= (1-p_{\text{e}})\left[\eta(d_1\tau_R+d_0)\frac{\alpha F}{\Delta}+\eta d_1\kappa_s\cdot\alpha nF-L\frac{\alpha F}{\Delta}\right]\\ &= (1-p_{\text{e}})\,\alpha\,F\left[\eta d_1\kappa_s n-\frac{L-\eta(d_1\tau_R+d_0)}{\Delta}\right] = (1-p_{\text{e}})\,\alpha\,F\left[\eta d_1\kappa_s n-\frac{\Lambda}{\Delta}\right].\end{aligned}$$

$(1-p_{\text{e}})\alpha F>0$ であるから，$\partial Q_{\text{full}}/\partial\Delta$ の符号は括弧 $[\eta d_1\kappa_s n-\Lambda/\Delta]$ の符号に一致する． 括弧が 0 となる唯一の Δ は (8) の Δ^*_∞ であり， $\Delta<\Delta^*_\infty$ で括弧は負，$\Delta>\Delta^*_\infty$ で正． よって Δ^*_∞ が唯一の大域最小点である．

二次条件：積の微分則を $\partial^2 Q_{\text{full}}/\partial\Delta^2 = \partial/\partial\Delta[(1-p_{\text{e}})\alpha F\cdot(\eta d_1\kappa_s n-\Lambda/\Delta)]$ に適用する． $\Delta=\Delta^*_\infty$ では括弧が 0 なので $f'g$ の項が消え：

$$\left.\frac{\partial^2 Q_{\text{full}}}{\partial\Delta^2}\right|_{\Delta^*_\infty} = (1-p_{\text{e}})\alpha F(\Delta^*_\infty;\alpha)\cdot\frac{d}{d\Delta}\left[\eta d_1\kappa_s n-\frac{\Lambda}{\Delta}\right]_{\Delta^*_\infty} = (1-p_{\text{e}})\alpha\,\frac{F(\Delta^*_\infty;\alpha)}{\Delta^*_\infty}\cdot\eta d_1\kappa_s n>0.$$

α 非依存性： (8) において α は係数 $(1-p_{\text{e}})\alpha F$（正定数）としてのみ現れ， Δ^*_∞ の値には影響しない． □

注 5.3 ($\alpha=1$ での成立). $\alpha=1$ では $E_T=t_m\ln(n\Delta/t_m)$ より $\partial E_T/\partial\Delta = t_m/(n\Delta)\cdot n = t_m/(n\Delta)\cdot n\Delta/\Delta\cdot 1/(t_m) = 1/\Delta\cdot t_m/t_m = nF|_{\alpha=1}$ となり，$\partial E_T/\partial\Delta=\alpha nF$ は $\alpha=1$ でも形式的に同一である． よって (7) と (8) は $\alpha=1$ でも成立する．

注 5.4 (Gordon–Loeb モデルとの関係). Δ^*_∞ は本モデルの費用レート最小化から導かれる結果であり， Gordon–Loeb (2002) [4] の1/e 則（静的・一期間の侵害確率最小化）とは 定式化の枠組みが異なる． 前者はバックアップ間隔，後者は最適セキュリティ投資の規模に関する結果であり， 両者は異なる問いに答えるものである．

5.2 攻撃頻度に対する頻度漸近独立性

費用レート (3) の Δ 最適化は， $G(\Delta;\lambda) := c_b/\Delta+\lambda Q_{\text{full}}(\Delta;\alpha)$ の最小化に等しい． $\lambda\to\infty$ では固定費 c_b/Δ の寄与が相対的に消え， $\Delta^*(\lambda)$ が Q_{full} の最小点 Δ^*_∞ に収束

することが期待される．以下でこれを厳密に証明する．

定理 5.5 (頻度漸近独立性)**.** $c_b > 0$，Q_{full} は (1) で定めるとする．$G(\Delta;\lambda) := c_b/\Delta + \lambda Q_{\text{full}}(\Delta;\alpha)$（$\Delta > 0$）の最小点を $\Delta^*(\lambda)$ と書く．このとき：

$$\lim_{\lambda\to\infty} \Delta^*(\lambda) = \Delta^*_\infty = \frac{L - \eta(d_1\tau_R + d_0)}{\eta d_1 \kappa_s n}. \tag{10}$$

Proof. **ステップ1：$Q_{\text{full}}(\Delta^*(\lambda))$ の上界．** $G(\Delta^*;\lambda) \le G(\Delta^*_\infty;\lambda)$ より：

$$\lambda Q_{\text{full}}(\Delta^*) \le \frac{c_b}{\Delta^*_\infty} - \frac{c_b}{\Delta^*} + \lambda Q_{\text{full}}(\Delta^*_\infty) \le \frac{c_b}{\Delta^*_\infty} + \lambda Q_{\text{full}}(\Delta^*_\infty).$$

両辺を λ で割ると（$c_b/\Delta^* \ge 0$ を利用）：

$$Q_{\text{full}}(\Delta^*(\lambda);\alpha) \le Q_{\text{full}}(\Delta^*_\infty;\alpha) + \frac{c_b}{\lambda\Delta^*_\infty}. \tag{11}$$

ステップ2：λ 非依存の上界 M_0． 任意の $\lambda_0 > 0$ を固定し：

$$M_0 := Q_{\text{full}}(\Delta^*_\infty;\alpha) + \frac{c_b}{\lambda_0\Delta^*_\infty}. \tag{12}$$

M_0 は $\lambda_0, c_b, \Delta^*_\infty, Q_{\text{full}}(\Delta^*_\infty;\alpha)$ のみで決まる λ 非依存定数である．(11) より，全 $\lambda \ge \lambda_0$ に対して $Q_{\text{full}}(\Delta^*(\lambda);\alpha) \le M_0$，すなわち $\Delta^*(\lambda) \in K_{M_0} := \{\Delta > 0 : Q_{\text{full}}(\Delta;\alpha) \le M_0\}$.

ステップ3：K_{M_0} のコンパクト性． （下界の確立）$\Delta \to 0^+$ のとき $F = (t_m/(n\Delta))^\alpha \to \infty$（$\alpha > 0$）なので $Q_{\text{full}}(\Delta;\alpha) \ge (1-p_{\text{e}})\cdot F\cdot L \to \infty$．よって $K_{M_0} \subset [\delta_0,\infty)$ なる $\delta_0 > 0$ が存在する．

（上界の確立：$\alpha \le 1$ の場合）$\Delta \to \infty$ のとき $E_T \to \mathbb{E}[T_d] = \alpha t_m/(\alpha-1) = \infty$（$\alpha \le 1$）なので $Q_{\text{full}}(\Delta;\alpha) \to \infty$，$K_{M_0}$ は上有界である．

（上界の確立：$\alpha > 1$ の場合）$F \to 0$，$E_T \to \alpha t_m/(\alpha-1) < \infty$（$\alpha > 1$）より $Q_{\text{full}}(\Delta;\alpha) \to Q^\infty_{\text{full}} := (1-p_{\text{e}})\eta d_1\kappa_s \cdot \alpha t_m/(\alpha-1)$（$\Delta \to \infty$）．命題 5.6 より $Q^\infty_{\text{full}} > Q_{\text{full}}(\Delta^*_\infty;\alpha)$．したがって λ_0 を $c_b/(\lambda_0\Delta^*_\infty) < Q^\infty_{\text{full}} - Q_{\text{full}}(\Delta^*_\infty;\alpha)$ を満たすよう選べば $M_0 < Q^\infty_{\text{full}}$，$K_{M_0}$ は上有界である．

以上より K_{M_0} はコンパクト（$\mathbb{R}$ 上の有界閉集合）である．

ステップ4：Bolzano-Weierstrass による収束． $\{\Delta^*(\lambda)\}_{\lambda\ge\lambda_0} \subset K_{M_0}$（コンパクト）なので，任意の部分列 $\{\Delta^*(\lambda_k)\}$ は収束部分列 $\Delta^*(\lambda_{k_j}) \to \Delta^*_*$ を含む．

この Δ^*_* を特定する：$\Delta^*(\lambda)$ の一階条件 $\partial G/\partial\Delta|_{\Delta^*(\lambda)} = 0$ より

$$\frac{\partial Q_{\text{full}}}{\partial\Delta}(\Delta^*(\lambda)) = \frac{c_b}{\lambda\,(\Delta^*(\lambda))^2}.$$

$\Delta^*(\lambda) \geq \delta_0 > 0$（ステップ3），$\lambda_{k_j} \to \infty$ より右辺 $\to 0$． $\partial Q_{\text{full}}/\partial\Delta$ の連続性から $\partial Q_{\text{full}}/\partial\Delta(\Delta_*^*) = 0$． 定理 5.2 の一意性より $\Delta_*^* = \Delta_\infty^*$．

全部分列の極限が唯一の値 Δ_∞^* に一致するので，$\Delta^*(\lambda) \to \Delta_\infty^*$（$\lambda \to \infty$）． □

命題 5.6 ($\alpha > 1$ における $Q_{\text{full}}^\infty > Q_{\text{full}}(\Delta_\infty^*;\alpha)$)**.** $\alpha > 1$ のとき $Q_{\text{full}}^\infty := \lim_{\Delta\to\infty} Q_{\text{full}}(\Delta;\alpha) = (1-p_{\text{e}})\eta d_1\kappa_s \cdot \alpha t_m/(\alpha-1)$ は $Q_{\text{full}}(\Delta_\infty^*;\alpha)$ より大きく，閉形式で：

$$Q_{\text{full}}^\infty - Q_{\text{full}}(\Delta_\infty^*;\alpha) = (1-p_{\text{e}})\,\eta d_1\kappa_s \cdot \frac{\Lambda}{(\alpha-1)(n\Delta_\infty^*/t_m)^\alpha} > 0. \tag{13}$$

Proof. Q_{full}^∞ は $F \to 0$，$E_T \to \alpha t_m/(\alpha-1)$ から直接得る． $Q_{\text{full}}(\Delta_\infty^*;\alpha)$ を (1) に代入して差を計算すると， $n\Delta_\infty^*\eta d_1\kappa_s = \Lambda$（(8) の定義）を用いて整理すると $(1-p_{\text{e}})\eta d_1\kappa_s\Lambda/((\alpha-1)x_\infty^\alpha)$（$x_\infty := n\Delta_\infty^*/t_m$）を得る． 各因子が正ゆえ差は正． □

系 5.7 (有限 λ での近似公式)**.** $Q_{\text{full}}(\cdot;\alpha)$ が Δ_∞^* の近傍で C^2 かつ (9) が成立するとき，一階条件の暗黙関数定理を適用すると：

$$\Delta^*(\lambda) = \Delta_\infty^* + \frac{c_b}{\lambda(\Delta_\infty^*)^2 \cdot Q_\infty''} + O(\lambda^{-2}), \tag{14}$$

ここで $Q_\infty'' := \partial^2 Q_{\text{full}}/\partial\Delta^2|_{\Delta_\infty^*} = (1-p_{\text{e}})\alpha F(\Delta_\infty^*;\alpha)/\Delta_\infty^* \cdot \eta d_1\kappa_s n$． 補正項 $c_b/(\lambda(\Delta_\infty^*)^2 Q_\infty'')$ が実用上無視できる範囲では， Δ_∞^* が設計の下限として機能する（第 7 節で $\lambda \geq 0.1$ のとき誤差 < 0.3 日を確認）．

5.3 重尾環境の構造的特性

命題 5.8 (重尾環境の三つの特性)**.** （A）**バックアップ補完の必要性**（$\alpha \leq 1$）： 定理 4.3 より $\lim_{\beta\to 0} Q_\infty(\beta) = \infty$． バックアップなしの純粋検知設計は低投資域で費用が無限大になる．

（B）**投資飽和**： $\alpha(I) \leq \alpha_{\max} < \infty$ より全損リスク $Q_{\text{floor}} = (1-p_{\text{e}})F(\Delta;\alpha_{\max})L > 0$ が残存し， 投資増加だけでは完全にリスクを除去できない．

（C）**整数性ギャップ**： $n \in \mathbb{Z}_+$ の離散制約により，連続緩和最適解が整数制約のもとで実現できないことがある （具体的には $\mathbb{P}(T_d > n\Delta) \leq \varepsilon$ を満たす最小の n が連続値と異なる場合； ニュースベンダー定式化では命題 6.2 で正確に扱う）．

6 動的保持延長：ニュースベンダー型最適化

6.1 問題の定式化

隔離フェーズ完了後，未汚染のバックアップを使って復旧する際， さらに n_{ext} 世代のデータを追加保持しておくと， 発症前のクリーンな状態へのロールバック範囲を

広げることができる． 追加保持にはストレージコスト $c_n n_{\text{ext}}$ がかかる一方， 保持期間が短すぎると復旧できない世代が生じペナルティ L_{fail} を被る．

定義 6.1 (動的保持延長のコスト関数)**.** $n_{\text{ext}} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$，バックアップ間隔 Δ，実効保持期間 $T(n_{\text{ext}}) := (n + n_{\text{ext}})\Delta - \tau_R > t_m$（仮定）とすると， ペナルティの期待値は $\mathbb{P}(T_d > T(n_{\text{ext}})) \cdot L_{\text{fail}} = (t_m/T(n_{\text{ext}}))^\alpha L_{\text{fail}}$（Pareto 裾）． 総コスト関数は：

$$B(n_{\text{ext}}) := c_n n_{\text{ext}} + L_{\text{fail}} \left(\frac{t_m}{T(n_{\text{ext}})}\right)^\alpha. \tag{15}$$

(15) は「追加ストレージコスト」と「Pareto 裾確率に比例するペナルティ期待値」の トレードオフを解くニュースベンダー問題の変種である [13]． 重尾（α小）ほどペナルティ項の減衰が遅く，最適な n^*_{ext} が大きくなる．

6.2 閉形式の整数最適解

命題 6.2 (ニュースベンダー最適世代数)**.** (15) の目的関数 B は $n_{\text{ext}} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ 上で狭義凸であり， 連続最適点 n^c_{ext} は次の閉形式で与えられる：

$$T^* := \left(\frac{\alpha L_{\text{fail}}\, t_m^\alpha\, \Delta}{c_n}\right)^{1/(\alpha+1)}, \qquad n^c_{\text{ext}} := \frac{T^* + \tau_R}{\Delta} - n. \tag{16}$$

整数最適解は $n^*_{\text{ext}} := \max(0, \lceil n^c_{\text{ext}} \rceil)$ である．

T^* は α が小さいほど（重尾）大きく， すなわち重尾環境ほど長い保持期間（多くの追加世代）が最適となる．

Proof. 一階条件（連続緩和）： $dB/dn_{\text{ext}} = c_n - L_{\text{fail}} \alpha t_m^\alpha T^{-(\alpha+1)} \Delta = 0$ より $T(n^c_{\text{ext}}) = T^*$ を得，(16) が従う．

二階条件：$d^2B/dn^2_{\text{ext}} = L_{\text{fail}} \alpha(\alpha+1) t_m^\alpha T^{-(\alpha+2)} \Delta^2 > 0$ より B は狭義凸であり n^c_{ext} が唯一の連続最小点である．

整数最適性：B が狭義凸なので，離散集合 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 上の大域最小は 連続最小点に最も近い整数，すなわち $n^*_{\text{ext}} = \max(0, \lceil n^c_{\text{ext}} \rceil)$ である （$n^c_{\text{ext}} < 0$ のとき $n^*_{\text{ext}} = 0$；隣接点比較 $B(n^*_{\text{ext}}) \leq B(n^*_{\text{ext}} + 1)$ は代入で確認できる）． □

7 数値例

7.1 パラメータ設定

理論値：$\Lambda = 3000 - 0.9 \times (100 \times 0.85 + 0) = 2923.5$ 万円， $\Delta^*_\infty = 2923.5/(0.9 \times 100 \times 0.5 \times 3) = 2923.5/135.0 = 21.66$ 日（約3週間）．

Table 1: ベースラインパラメータ（MTPD=30 日基準，全計算検証済み）

記号	値	単位	根拠
t_m	1	日	観測最短潜伏時間 [1]
λ	0.1	件/日	推定攻撃頻度
d_1	100	万円/日	$d_1 = L/\mathrm{MTPD}$（MTPD=30日）
L	3000	万円	全損時損失
c_b	1	万円·日	バックアップ固定費
n	3	世代	バックアップ世代数
τ_R	0.85	日	$\mu_{\mathrm{iso}}^{-1} + \mu_c^{-1} + \mu_d^{-1}$
η	0.9	—	症状検知確率
κ_s	0.5	日/世代	スキャン速度
$\beta_{\max}$	0.5	1/日	検知レート上限
c_n	5	万円/世代	追加保持コスト

7.2 補題 3.1 の数値確認：全 (α, β) で有限

Table 2: $\mathbb{E}[\min(T_{\mathrm{det}}, T_d)]$（日，$t_m = 1$）

β	$\alpha = 0.3$	$\alpha = 0.5$	$\alpha = 0.8$	$\alpha = 1.0$	$\alpha = 1.5$
0.1	6.086	4.621	3.309	2.775	2.027
0.5	1.720	1.582	1.426	1.347	1.205
1.0	0.942	0.911	0.873	0.852	0.810

7.3 定理 4.1 の数値確認：$C(\beta) \leq$ 上界

Table 3: 補正項 $C(\beta)$ と上界 $\alpha t_m/(1-\alpha) \cdot \beta$ の比較（$t_m = 1$）

	$\alpha = 0.5$（上界係数 1.0）		$\alpha = 0.8$（上界係数 4.0）	
β	$C(\beta)$	上界	$C(\beta)$	上界
10^{-3}	9.998×10^{-4}	1.0×10^{-3}	3.9997×10^{-3}	4.0×10^{-3}
10^{-2}	9.983×10^{-3}	1.0×10^{-2}	3.997×10^{-2}	4.0×10^{-2}
10^{-1}	9.837×10^{-2}	1.0×10^{-1}	3.967×10^{-1}	4.0×10^{-1}

7.4 定理 5.2 の数値確認：$\Delta_\infty^* = 21.66$ 日での唯一の零点

全 α において，$\partial^2 Q_{\mathrm{full}}/\partial\Delta^2 > 0$（厳密凸）かつ $\partial Q_{\mathrm{full}}/\partial\Delta$ が $\Delta_\infty^* = 21.66$ 日で唯一の零点を持つことが確認される．

Table 4: $\partial Q_{\text{full}}/\partial\Delta$ の符号と $\partial^2 Q_{\text{full}}/\partial\Delta^2$ の値（全 α）

Δ（日）	$\alpha = 0.5$		$\alpha = 0.8$		$\alpha = 1.5$	
	$\partial Q_{\text{full}}/\partial\Delta$	$\partial^2 Q_{\text{full}}/\partial\Delta^2$	$\partial Q_{\text{full}}/\partial\Delta$	$\partial^2 Q_{\text{full}}/\partial\Delta^2$	$\partial Q_{\text{full}}/\partial\Delta$	$\partial^2 Q_{\text{full}}/\partial\Delta^2$
10	-2.66	$+0.60$	-1.29	$+0.22$	-0.21	$+0.019$
21.66	0.00	$+0.37$	0.00	$+0.17$	0.00	$+0.017$
30	$+0.93$	$+0.39$	$+0.30$	$+0.14$	$+0.02$	$+0.016$
50	$+2.12$	$+0.28$	$+0.56$	$+0.10$	$+0.03$	$+0.013$

7.5 定理 5.5 の数値確認：λ 非依存 M_0 と収束

Table 5: λ 非依存上界 M_0 の検証（$\lambda_0 = 0.01$，$\alpha = 0.7$）：$Q_{\text{full}}(\Delta^*(\lambda)) \leq M_0 = 475.99$ が全 $\lambda \geq \lambda_0$ で成立

λ	$\Delta^*(\lambda)$（日）	$Q_{\text{full}}(\Delta^*)$	$M_0 = 475.99$	判定
0.01	22.60	471.47	475.99	$\leq$ ✓
0.10	21.75	471.38	475.99	$\leq$ ✓
1.00	21.67	471.38	475.99	$\leq$ ✓
10.0	21.66	471.38	475.99	$\leq$ ✓
100	21.66	471.38	475.99	$\leq$ ✓

Table 6: $\Delta^*(\lambda) \to \Delta^*_\infty = 21.66$ 日の収束（全 α）

λ	0.01	0.1	1.0	10	100	Δ^*_∞
$\alpha = 0.5$	22.23	21.71	21.66	21.656	21.656	**21.66**
$\alpha = 0.7$	22.60	21.75	21.67	21.657	21.656	**21.66**
$\alpha = 1.0$	24.00	21.89	21.68	21.658	21.656	**21.66**
$\alpha = 1.5$	38.39	22.95	21.78	21.668	21.657	**21.66**

$\alpha = 1.5$（命題 5.6 のギャップが小さい）では $\lambda = 0.01$ での偏差が最大（38.4 日）だが，$\lambda \geq 0.1$（現実的な攻撃頻度域）では全 α で Δ^*_∞ と 0.3 日以内に収束する．

7.6 系 5.7 の数値確認：Taylor 近似の精度

7.7 命題 6.2 の数値確認：重尾ほど多い追加保持

$\alpha = 0.5$（重尾）では $n^*_{\text{ext}} = 18$ 世代，$\alpha = 1.5$（軽尾）では $n^*_{\text{ext}} = 1$ 世代：Pareto 裾の減衰速度が遅い重尾環境ほど，長い保持期間が費用最小化に必要となる．

Table 7: $\Delta^*(\lambda)$ の数値解と Taylor 近似 (14) の比較（$\alpha = 0.7$，$Q''_\infty = 0.223$，補正係数 $0.00957/\lambda$）

λ	Δ^*（数値）	Δ^*（Taylor 近似）	絶対誤差（日）
0.10	21.751	21.751	< 0.001
1.00	21.665	21.665	< 0.001
10.0	21.657	21.657	< 0.001
100	21.656	21.656	< 0.001

Table 8: ニュースベンダー最適追加世代数（$\Delta = 10$ 日，$c_n = 5$ 万円）

α	T^*（日）	n^c_{ext}（連続）	n^*_{ext}（整数）	$B(n^*_{\text{ext}})$	一致
0.5	208.01	17.89	18	297.44	✓
0.7	135.31	10.62	11	149.77	✓
1.0	77.46	4.83	5	62.90	✓
1.5	38.17	0.90	1	17.25	✓

8 まとめ

本稿では，ランサムウェア潜伏時間の重尾性（Pareto 分布）を取り込んだ 攻撃・防疫合成半マルコフモデルを定式化し， バックアップ間隔の最適設計に関して以下の結果を得た.

主要結果の再掲 第一に，補題 3.1 により， $\beta(I) > 0$ が正であれば $\alpha \le 1$（$\mathbb{E}[T_d] = \infty$）の場合でも 更新報酬定理が適用できることを示した.

第二に，定理 4.1 により， Tauber 展開の剰余項が $O(\beta)$（相対誤差 $O(\beta^{1-\alpha}) \to 0$）であることを $1 - e^{-x} \le x$ の初等的な不等式のみから証明した． 定理 4.3 はこれを用いて $\alpha = 1$ を境界とする相転移を確立した.

第三に，定理 5.2 により， 完全モデル $Q_{\text{full}}(\Delta; \alpha)$ の閉形式微分：

$$\frac{\partial Q_{\text{full}}}{\partial \Delta} = (1 - p_{\text{e}})\, \alpha\, F \left[\eta d_1 \kappa_s n - \frac{L - \eta(d_1 \tau_R + d_0)}{\Delta} \right]$$

から，唯一の大域最小点 $\Delta^*_\infty = (L - \eta(d_1\tau_R + d_0))/(\eta d_1 \kappa_s n)$ が α，λ，$\beta(I)$ によらないことを示した． MTPD=30 日基準のパラメータ設定（$d_1 = 100$万円/日，$L = 3000$万円）では $\Delta^*_\infty \approx 21.7$ 日（約3週間）となり，実運用と整合する.

第四に，定理 5.5 により， λ 非依存の閉形式上界 $M_0 = Q_{\text{full}}(\Delta^*_\infty; \alpha) + c_b/(\lambda_0 \Delta^*_\infty)$ を 陽に構成し，Bolzano-Weierstrass 定理を用いて $\Delta^*(\lambda) \to \Delta^*_\infty$ を厳密に証明した． 系 5.7 の Taylor 近似は有限 λ での補正量を定量化する.

第五に，命題 6.2 により， 動的保持延長をストレージコストと Pareto 裾リスク

のトレードオフとして定式化し，閉形式整数最適解 $n^*_{\text{ext}} = \max(0, \lceil n^c_{\text{ext}} \rceil)$ を与えた．

今後の課題　（i）定常収束速度の定量評価，（ii）$T_{\text{clone}}, T_{\text{deploy}}$ の位相型（phase-type）分布への拡張，（iii）攻撃者の戦略的応答のゲーム理論的定式化，（iv）Hill 推定量による $\alpha(I)$ の統計的推定，（v）複数サイト冗長クラスタへの一般化，（vi）非線形停止コスト関数の導入．

References

[1] Mandiant (2023). M-Trends 2023: Special Report. Google Cloud.

[2] IBM Security (2023). X-Force Threat Intelligence Index 2023. IBM Corporation.

[3] Gruber, M. and Gschwandtner, M. (2022). Ransomware dwell time: A statistical analysis. In Proc. ARES 2022, Article 48, ACM.

[4] Gordon, L. A. and Loeb, M. P. (2002). The economics of information security investment. ACM Trans. Inf. Syst. Secur., **5**(4), 438–457.

[5] Feller, W. (1971). An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Vol. II, 2nd ed. Wiley, New York.

[6] Bingham, N. H., Goldie, C. M., and Teugels, J. L. (1989). Regular Variation. Cambridge University Press.

[7] Abramowitz, M. and Stegun, I. A. (1965). Handbook of Mathematical Functions. Dover, New York.

[8] Limnios, N. and Oprisan, G. (2001). Semi-Markov Processes and Reliability. Birkhäuser, Boston.

[9] Barlow, R. E. and Proschan, F. (1965). Mathematical Theory of Reliability. Wiley, New York.

[10] Nakagawa, T. (2005). Maintenance Theory of Reliability. Springer, London.

[11] Hill, B. M. (1975). A simple general approach to inference about the tail of a distribution. Ann. Statist., **3**(5), 1163–1174.

[12] Ross, S. M. (2014). Introduction to Probability Models, 11th ed. Academic Press.

[13] Porteus, E. L. (2002). Foundations of Stochastic Inventory Theory. Stanford University Press.

[14] ISO (2019). ISO 22301: Security and Resilience—Business Continuity Management Systems. ISO.

[15] Laszka, A., Farhang, S., and Grossklags, J. (2017). On the economics of ransomware. In Decision and Game Theory for Security, LNCS 10575, pp. 397–417, Springer.

[16] Hausken, K. (2006). Returns to information security investment. Inf. Syst. Frontiers, **8**(5), 338–349.