

Smooth Peel

สมูท พีล

น้ำยาช่วยละลายการวนพลาสเตอร์ปิดแผล

- อ่อนโยน
- ปลอดภัย
- เหมาะสมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

วิธีใช้: สเปรย์ สมูท พีล ลงบริเวณขอบของพลาสเตอร์ปิดแผล จนทั่ว เพื่อช่วยละลายการวนและทำให้พลาสเตอร์ปิดแผลหลอกออกจากร่างกาย สมูท พีล บรรเทาการ ระคายเคือง และการเจ็บปวดจาก การลอกพลาสเตอร์ปิดแผล

คำเตือน: ไม่ควรสเปรย์ สมูท พีล ลงบนแผลโดยตรง

ส่วนประกอบ: Paraffinum Liquidum, Tocopheryl Acetate, และ Oil of Melaleuca Alternifolia

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ:

NAPP PHARM CO., LTD โทร: 08-3547-4415



อย่าใช้การลอกพลาสเตอร์ปิดแผล เพิ่มรอยแผลให้กับผิวที่บอบบาง...



NAPP PHARM
Innovate for delicate people

Smooth Peel

สมูท พีล

น้ำยาช่วยละลายการวนพลาสเตอร์ปิดแผล

- อ่อนโยน
- ปลอดภัย
- เหมาะสมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

วิธีใช้: สเปรย์ สมูท พีล ลงบริเวณขอบของพลาสเตอร์ปิดแผล จนทั่ว เพื่อช่วยละลายการวนและทำให้พลาสเตอร์ปิดแผลหลอกออกจากร่างกาย สมูท พีล บรรเทาการ ระคายเคือง และการเจ็บปวดจาก การลอกพลาสเตอร์ปิดแผล

คำเตือน: ไม่ควรสเปรย์ สมูท พีล ลงบนแผลโดยตรง

ส่วนประกอบ: Paraffinum Liquidum, Tocopheryl Acetate, และ Oil of Melaleuca Alternifolia

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ:

NAPP PHARM CO., LTD โทร: 08-3547-4415



อย่าใช้การลอกพลาสเตอร์ปิดแผล เพิ่มรอยแผลให้กับผิวที่บอบบาง...



NAPP PHARM
Innovate for delicate people

71% ของคนไข้ เกิด MARSI จาก การลอกพลาสเตอร์ปิดแผล¹

4 กลุ่มคน เสี่ยงเกิด MRSI²

(Medical-Adhesive Removal Skin Injury)




Newborns

การเริ่มต้นของผิวหนังชั้น epidermis กับ dermis ของเด็กแรกเกิดยังไม่แข็งแรงเท่าผู้ใหญ่ ผิวหนังจึงถูกออกได้ง่าย



Older adults

โครงสร้างผิวหนังของผู้สูงอายุนั้นอ่อนแอ และเมื่อมีการดึงพลาสเตอร์อาจทำให้ผิวหนังชั้นบนหลุดติดพลาสเตอร์ออกมาได้




Medications

ยาบางชนิด เช่น สเตียรอยด์ทำให้ผิวหนังบางลง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงการเกิด MRSI และทำให้แผลหายช้า



Malnutrition and dehydration

ผู้ป่วยที่ขาดสารอาหาร หรือขาดน้ำ ผิวหนังจะแห้งหยาบ และสภาวะของผิวหนังมีความผิดปกติไป



IV Securement Dressing



EKG Sticky Patch



Foley Catheter Dressing



Pressure Dressing

ใช้ สมูท พิล ในคนไข้กลุ่มใด ?

Sources:

1. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. *Wound UK*. 2008, Vol 4, No 1.
2. Taroc, A M. A guide for adhesive removal: Principles, practice, and products. *American Nurse Today*. 2007, Vol 12, No. 10.

71% ของคนไข้ เกิด MRSI จาก การลอกพลาสเตอร์ปิดแผล¹

4 กลุ่มคน เสี่ยงเกิด MRSI²

(Medical-Adhesive Removal Skin Injury)




Newborns

การเริ่มต้นของผิวหนังชั้น epidermis กับ dermis ของเด็กแรกเกิดยังไม่แข็งแรงเท่าผู้ใหญ่ ผิวหนังจึงถูกออกได้ง่าย



Older adults

โครงสร้างผิวหนังของผู้สูงอายุนั้นอ่อนแอ และเมื่อมีการดึงพลาสเตอร์อาจทำให้ผิวหนังชั้นบนหลุดติดพลาสเตอร์ออกมาได้




Medications

ยาบางชนิด เช่น สเตียรอยด์ทำให้ผิวหนังบางลง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงการเกิด MRSI และทำให้แผลหายช้า



Malnutrition and dehydration

ผู้ป่วยที่ขาดสารอาหาร หรือขาดน้ำ ผิวหนังจะแห้งหยาบ และสภาวะของผิวหนังมีความผิดปกติไป



IV Securement Dressing



EKG Sticky Patch



Foley Catheter Dressing



Pressure Dressing

ใช้ สมูท พิล ในคนไข้กลุ่มใด ?

Sources:

1. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. *Wound UK*. 2008, Vol 4, No 1.
2. Taroc, A M. A guide for adhesive removal: Principles, practice, and products. *American Nurse Today*. 2007, Vol 12, No. 10.