「離散数学・オートマトン」演習問題 04 (解答例)

2023/10/30

1 関係

課題 1 N 上の関係 R と S を

$$R = \{ (m, n) \mid m = 2n \} \tag{1.1}$$

$$S = \{(m, n) \mid m = n + 3\}$$
(1.2)

とするとき、 $R \circ S$ 、 R^2 、 R^{-1} を求めなさい。

解答例

• $R \circ S = \{(x,y) \mid \exists z, xSz \land zRy\}$ it

$$R \circ S = \{(x,y) \mid \exists z, x = z + 3 \land z = 2y\}$$

である。これより以下を得る。

$$R \circ S = \{(m,n) \mid m = 2n+3\}$$

• $R^2 = \{(x,y) \mid \exists z, xRz \land zRy\}$ it

$$R^2 = \{(x,y) \mid \exists z, \underline{x = 2z} \land \underline{z = 2y}\}$$

である。これより以下を得る。

$$R \circ R = \{(m, n) \mid m = 4n\}$$

$$R^{-1} = \{(m, n) \mid 2m = n\}$$

課題 2 $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ 上の関係を考える。

$$R = \{(a, a), (a, b), (b, d), (c, d), (d, b)\}$$
(1.3)

 $R^i=R^j$ となる最小の $i\neq j$ の組を求めよ。また、 R^* を求めよ。 解答例 R^2 を求める。

$$aRa \wedge aRa \Rightarrow aR^{2}a$$

 $aRa \wedge aRb \Rightarrow aR^{2}b$
 $aRb \wedge bRd \Rightarrow aR^{2}d$
 $bRd \wedge dRb \Rightarrow bR^{2}b$
 $cRd \wedge dRb \Rightarrow cR^{2}b$
 $dRb \wedge bRd \Rightarrow dR^{2}d$

同様に R^3 と R^4 を求める。

$$aR^{2}a \wedge aRa \Rightarrow aR^{3}a$$

 $aR^{2}a \wedge aRb \Rightarrow aR^{3}b$
 $aR^{2}b \wedge bRd \Rightarrow aR^{3}d$
 $bR^{2}b \wedge bRd \Rightarrow bR^{3}d$
 $cR^{2}b \wedge bRd \Rightarrow cR^{3}d$
 $dR^{2}d \wedge dRb \Rightarrow dR^{3}b$

$$aR^{3}a \wedge aRa \Rightarrow aR^{4}a$$

$$aR^{3}a \wedge aRb \Rightarrow aR^{4}b$$

$$aR^{3}b \wedge bRd \Rightarrow aR^{4}d$$

$$aR^{3}d \wedge dRb \Rightarrow aR^{4}b$$


$$bR^{3}d \wedge dRb \Rightarrow bR^{4}b$$


$$cR^{3}d \wedge dRb \Rightarrow cR^{4}b$$

$$dR^{3}b \wedge bRd \Rightarrow dR^{4}d$$

以上から $R^2=R^4$ を得る。従って、 $R^*=R^0\cup R\cup R^2\cup R^3$ となる。しかし、 R^3 の要素は $R^0\cup R\cup R^2$ に含まれているため、 $R^*=R^0\cup R\cup R^2$ で十分である。

$$\begin{split} R^* &= \{(a,a),(b,b),(c,c),(d,d)\} \cup \{(a,a),(a,b),(b,d),(c,d),(d,b)\} \\ &\quad \cup \{(a,a),(a,b),(a,d),(b,b),(c,b),(d,d)\} \\ &= \{(a,a),(b,b),(c,c),(d,d),(a,b),(a,d),(b,d),(c,b),(c,d),(d,b)\} \end{split}$$





この課題に対応するコードは、以下の Github から取得できます。

https://github.com/discrete-math-saga/RelationsAndOrder/

順序 2

課題3 全体集合 U を考える。その部分集合 $A\subseteq U$ に対する関係 \subseteq は、半順序であっ て全順序でないことを示せ。

解答例 はじめに、反射律、推移律、反対称律を示し、半順序であることを示す。

• 反射律:ある集合 A について、 $A \subseteq A$ は明らか

・ 推移律: $C\subseteq B\land B\subseteq A$ ならば、 $C\subseteq A$ である。 ・ 反対称律: $B\subseteq A\land A\subseteq B$ ならば、A=B である。

次に、二つの集合 $A \subset U$ と $B \subset U$ を考える。 $A \cap B$ が A または B と等しくない場合、 A と B の間には関係 \subseteq は成り立たない。つまり、関係 \subseteq は全順序ではない。