

# สัตว์ป่าสงวน

กวางเขา  
*Naemorhedus gmelini*



เขียงเขา  
*Capreolus sumatrensis*



หมัน  
*Cervus schomburgki*



แรดขาว  
*Binodens binnendicus*



กระซู่  
*Didymoceros sumatrensis*



ละมั่งหรือละมั่ง  
*Cervus eldi*



เก้งหม้อ  
*Moschus moschiferus*



ควายป่า  
*Bubalus bubalis*



สมเสร็จ  
*Tapirus indicus*



กูปรี  
*Bos sauveli*



นกกระเรียนพันธุ์ไทย  
*Grus japonensis*



นกเงือกหัวทองดำ  
*Ptilinopus gurneyi*



นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร  
*Pseudochalcophaps sirintha*

วาฬโอมูระ  
*Balaenoptera omurai*



ปลาดาววาฬ  
*Rhincodon typus*



เต่ามะเฟือง  
*Dermodochelys coriacea*



วาฬบรูด้า  
*Balaenoptera edeni*



พะยูน  
*Dugong dugong*





# นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

## WHITE EYED RIVER MARTIN

*Eurochelidon sirintarae* (Kitti, 1968)

CR IUCN  
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

● ส่วนของหัว  
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรทรงบริเวณหน้ามาก  
มีขนสีดำคล้ายกำมะหยี่ มีปากสีเหลือง  
มีขนที่และแผ่นทาสี มีสีขนฟูริ้ว ๆ  
รอบตาเป็นวงสีขาว

● ส่วนของตัว  
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรทรงบริเวณ  
ตาและหน้ายังมีสีเหลืองอ่อน คีบและเก็บ  
ของนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรมีขนาดใหญ่และแข็งแรง

● ส่วนของลำตัว  
มีสีลำตัวทึบดำเป็นสีดำ มีลายทาสีขาวที่คอโพกหลัง  
ขนปีกด้านล่างมีสีน้ำตาลอีก ๆ

ความยาวของขนหางคู่กลาง  
8.75 ซม.

### พฤติกรรมและที่อยู่อาศัย :

อาศัยอยู่ตามป่าจูด ป่ากอก ป่าหญ้า ในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ เป็นนกที่ค่อนข้างเชื่อง ไม่ปราดเปรียว มักเกาะนิ่งเฉยอยู่บนพื้นดิน

### อาหาร :

กินแมลงเป็นอาหาร มักจะจับเหยื่อโดยการโฉบจับในอากาศ หลังจากการสังเกตทางกายภาพเบื้องต้น มีการสันนิษฐานว่า นกชนิดนี้อาจหากินทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน

### การสืบพันธุ์ :

ยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรอย่างแน่ชัด

### พื้นที่ที่ค้นพบ :

ยังไม่ทราบสถานภาพที่แท้จริงของนกชนิดนี้ อาจจะเป็นนกประจำถิ่นหรือนกที่อพยพมายังประเทศไทย ในช่วงฤดูหนาว แต่หาพบได้ยากมาก หรืออาจจะสูญพันธุ์ไปแล้ว สถานที่ที่มีรายงานว่าพบนกชนิดนี้ คือ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์

### เกร็ดความรู้ : การทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานชื่อ

“ชื่อชนิด” เป็นคำที่มาจากพระนาม “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร” ครั้นดำรงพระยศเดิม ของ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ ซึ่งทรงสนพระทัยในธรรมชาติศึกษามาตั้งแต่เยาว์วัย

ชื่อไทย : นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร / นกนางแอ่นตาพอง

ชื่อสามัญ : White-eyed River Martin

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Eurochelidon sirintarae* (Kitti, 1968)

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Subphylum : Vertebrata

Class : Aves

Order : Passeriformes

Family : Hirundinidae

Genus : *Eurochelidon*

Species : *Eurochelidon sirintarae*

# แรดชวา

## JAVAN RHINOCEROS

*Rhinoceros sondaicus* (Desmarest, 1822)

CR

IUCN


ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

### • ส่วนหัว

แรดชวามีเขาบริเวณจมูก 1 เขาเรียกว่า “นอ” ซึ่งจะเห็นได้ชัดในแรดชวาตัวผู้ ถ้าแรดชวาตัวเมีย “นอ” จะเป็นเพียงปุ่มเล็ก ๆ ผลิตน้ำมัน นอกจากนี้แรดชวา ยังได้รับนิยามว่าเป็นละมั่งซึ่งจะคำเพ้าใช้ในการหาอาหาร และป้องกันตัว ผู้ที่สามารถเอาตัวรอดได้ไว้ชม

### • ลำตัว

มีรอบเส้นรอบลำตัว 5 จุด ได้แก่ บริเวณช่วงคอ-ไหล่ โคนขาหน้า รอบเอวโคนหาง และโคนหางสัง ทำให้ดูเหมือนว่าแรดชวาจะมีได้ 6 จุดหรือมองเหมือนคนมี 6 ขา



### รอยตีน



24 - 25 ซม.

### น้ำหนักของแรดชวา

1,500 - 2,000 กก.

### • ส่วนของตีน

แรดชวาเป็นสัตว์ที่เดินบนตีนกีบ คือ เท้าทั้ง 4 ด้าน มีกีบตีนด้านละ 3 กีบ ที่กีบมีร่องลึกใช้ใช้ในการแสดงอาณาเขต ซึ่งกีบนี้จะสึกตามรอยตีนของแรดชวา

### พฤติกรรมและที่อยู่อาศัย :

ชอบป่าดงดิบ พื้นที่ราบต่ำ ที่ชื้น และมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้นแรดชวามีนิสัยชอบนอนแช่ปลักโคลน เป็นเวลานาน ๆ แสดงอาณาเขตที่อยู่อาศัยด้วยการฉุดตัวกับต้นไม้ ปัสสาวะ และกลั่นตามรอยตีน

### อาหาร :

จำพวกใบไม้ ต้นอ่อนของพืช ต้นหญ้า พืชผักที่เป็นต้นเดี่ยว ๆ รวมทั้งพืชที่ขึ้นริมน้ำ และผลไม้ที่หล่นบนพื้นดิน

### การสืบพันธุ์ :

แรดชวาสามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี ช่วงการตั้งครรภ์จะใช้ระยะเวลา 16-18 เดือน ตกูกครั้งละ 1 ตัว ลูกแรดชวาหนักประมาณ 50 กก.

### ปัจจัยคุกคาม :

1) การบุกรุกป่าเพื่อการเกษตร การบุกรุกป่าจากการทำไม้และการถางป่าเพื่อทำการเกษตร ทำให้แรดชวาสูญเสียพื้นที่อาศัยและหากิน ส่งผลให้จำนวนประชากรของแรดชวา “สูญพันธุ์ จากถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย”

2) การล่าเพื่อเอา “นอ” มีความเชื่อผิด ๆ ว่า “นอ แรด” สามารถเอาไปทำยาเสริมสมรรถภาพทางเพศของคนได้ หรือเอาไปทำเป็นเครื่องรางของขลัง วัดมณฑล เครื่องประดับ

3) พฤติกรรมที่เชื่องช้า เนื่องจากแรดชวามีนิสัยชอบนอนแช่ปลักโคลน ถ่ายมูลที่เดิมประจำ และไม่ค่อยมีศัตรูตามธรรมชาติ จึงเป็นสัตว์ที่เชื่องช้าไม่ปราดเปรียว จึงทำให้ถูกพบตัว และถูกล่าได้ง่าย

ชื่อไทย : แรดชวา

ชื่อสามัญ : Javan Rhinoceros

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Rhinoceros sondaicus* (Desmarest, 1822)

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Subphylum : Vertebrata

Class : Mammalia

Order : Perissodactyla

Family : Rhinocerotidae

Genus : Rhinoceros

Species : Rhinoceros sondaicus



# กระซู่

CR IUCN  
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

## SUMATRAN RHINOCEROS

*Dicerorhinus sumatrensis* (G. Fischer, 1814)

### ส่วนหัว

กระซู่มีเขากับบริเวณงู 2 เข เรียกว่า “นอ” จะเห็นได้ชัดในกระซู่ตัวผู้  
ส่วนหัวเป็นมันจะนิ่มกว่าส่วนอื่นที่มันมีเข  
ส่วนนอจะแข็งเป็นเหมือนหินปูน ๆ  
นอกจากนี้ กระซู่ยังมีเขานิปากที่มันจะเป็นจะงอย  
ซึ่งทำหน้าที่ในการหาอาหาร

### ส่วนลำตัว

กระซู่เป็นสัตว์ที่มีหนังหนาหรือมัน กลายกับช้างและแรด  
โดยหนังของกระซู่มีสีน้ำตาลหรือสีเหลืองเข้ม 3 เข  
คือ บริเวณโคนหน้าอาหารจากด้านหนึ่งพาดไปโคนหน้าอีกด้านหนึ่ง  
บริเวณรอบคอ และบริเวณโคนขาหลังพาดไปทางสะโพกซ้าย  
ทั้งโคนขาหลังอีกด้าน

240 - 260 ซม.

ความยาวลำตัว  
(วัดจากปลายหางถึงปลายหัว)

112 - 145 ซม.

ส่วนสูงของกระซู่  
(วัดจากส่วนหัวถึงส่วนหลัง)

60 - 65 ซม.  
ความยาวหางของกระซู่

### ระบบประสาทสัมผัส

กระซู่มีประสาททางสายตาที่ค่อนข้างไม่ดีนัก  
แต่จะมีประสาทสัมผัสทางการได้ยินเสียง  
และประสาททางการรับกลิ่นที่ค่อนข้างดี

### รอยตีน



### ส่วนของตีน

กระซู่เป็นสัตว์ที่มีตีนเป็นคืบคืบ  
คือ คืบทั้ง 4 ด้าน มีคืบกับนิ้วเท้า 3 คืบ

### ส่วนของขน

กระซู่มีขนปกคลุมตามลำตัวสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลทอง  
ส่วนลูกกระซู่จะมีขนปกคลุมตามลำตัวสีน้ำตาลเข้ม  
มีขนขึ้นปกคลุมที่คอและต้นขาทำให้มันดูเหมือนว่ามีการลอกคราบ  
และการเปลี่ยนสีก็จะมี กระซู่มีขนขึ้นตามบริเวณรอบคอ  
และปกคลุมบริเวณหลังไปจนถึงปลายหาง

น้ำหนักของกระซู่  
700 - 1000 กก.

### พฤติกรรมและที่อยู่อาศัย :

เป็นสัตว์หากินตัวเดียว (ยกเว้นช่วงฤดูสืบพันธุ์) กระซู่ตัวเมียมีพื้นที่ครอบครองอย่างชัดเจน ส่วนตัวผู้ไม่มีอาณาเขตที่แน่นอน อาศัยอยู่ได้ในป่าดงดิบหรือที่ราบที่มีแหล่งน้ำลำธาร ชอบแช่ปลักโคลน

### อาหาร :

กินพืช อาหารหลัก คือ ใบไม้ ต้นหญ้า พืชผัก ต้นอ่อนของพืช หรือต้นไม้นานาชนิด รวมทั้งพืชที่ขึ้นริมน้ำและผลไม้

### การสืบพันธุ์ :

กระซู่ตัวเมียสืบพันธุ์ได้เมื่ออายุ 4 ปีขึ้นไป ส่วนตัวผู้สืบพันธุ์ได้เมื่อเข้าสู่ปีที่ 7 กระซู่ตัวเมียตั้งท้องประมาณ 14-17 เดือน คลอดลูกครั้งละ 1 ตัว หลังจากคลอดลูกแล้วจะตั้งท้องประมาณ 4 ปี จึงจะตั้งท้องอีก

### ปัจจัยคุกคาม :

- 1) การบุกรุกป่า การบุกรุกตัดไม้ในพื้นที่ที่มีกระซู่อาศัยอยู่ ทำให้กระซู่สูญเสียพื้นที่อาศัยและหากินส่งผลให้จำนวนของกระซู่ในประเทศไทยลดลงจนสูญพันธุ์จากถิ่นอาศัย
- 2) การล่าเพื่อเอา “นอ” มีความเชื่อผิด ๆ ว่า สามารถเอาไปทำยาเสริมสมรรถภาพทางเพศของคนได้หรือเอาไปทำเป็นเครื่องรางของขลัง
- 3) พฤติกรรมที่เชื่องช้า เนื่องจากกระซู่มีนิสัยชอบนอนแช่ปลักโคลนถ่ายมูลที่เดิมประจำ และไม่คอยมีศัตรูตามธรรมชาติจึงเป็นสัตว์ที่เชื่องช้าไม่ปราดเปรียวจึงทำให้ถูกล่าได้ง่าย

ชื่อไทย : กระซู่ / แรดสุมาตราตะวันตก

ชื่อสามัญ : Sumatran Rhinoceros

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Dicerorhinus sumatrensis*

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Subphylum : Vertebrata

Class : Mammalia

Order : Perissodactyla

Family : Rhinocerotidae

Genus : Dicerorhinus

Species : Dicerorhinus sumatrensis

# กูปรี / โคไพร

CR

IUCN  
สูญพันธุ์

## KOUPREY

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Bos sauveli* Urbain, 1937

### รอยตีน



- ส่วนของลำตัวมีขนออกสีเป็นสีนวลบาง ๆ มีเหนียงคอเป็นแผงหนังห้อยยาวอยู่ใต้คอ โดยเฉพาะกูปรีที่มีอายุมาก ๆ เหนียงคอจะห้อยยาวเกือบถึงพื้นดิน สามารถใช้บอกไปมาระบายความร้อน


- ส่วนหัวมีลักษณะหัวโต โคนเขาใหญ่ รูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมเกือบเป็นรูปกลมสั้น ไม่มีสันกระดูกที่หน้าผาก

- เขากูปรีมีลักษณะกลวง โคนเขาใหญ่ ปลายเรียวแหลม เป็นเขาคงอกติดกระดูกอยู่ถาวร ปลายเขาของตัวผู้จะแตกเป็นพู่

- กูปรีมีลักษณะหางยาว เป็นพู่ความยาวของหาง ถือว่าเป็นวัวป่าที่หางยาวที่สุดในประเทศไทย

- กูปรีมีกีบตีนเป็นลักษณะกับคู่ ช่วงตีนขาทั้ง 4 ข้างมีสีดำ แต่ช่วงหน้าแข้งลงไปถึงปลายกีบ ตีนมีสีขาวคล้ายสวมนกเขา

- กูปรีเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง อาหารที่กินจะเป็นพวกหญ้าต่าง ๆ เวลาหากินจะปะปนไปกับฝูงสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดอื่น ๆ



### พฤติกรรมและที่อยู่อาศัย :

ชอบใช้เขาขุดดินไม้ กิ่งไม้ตามเส้นทางที่เดินผ่าน หรือใช้ขุดดินเพื่อหาน้ำหรือดินโป่งกินตามป่าโปร่ง

### อาหาร :

หญ้าชนิดต่าง ๆ โดยมักหากินปะปนกับฝูงสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดอื่น ๆ

### การสืบพันธุ์ :

ฤดูผสมพันธุ์อยู่ในช่วงเดือน เมษายน ระยะตั้งท้องประมาณ 9 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ช่วงใกล้คลอด กูปรีแม่ลูกอ่อนจะแยกตัวออกจากฝูงเพื่อคลอดลูก และเลี้ยงลูกตามลำพังประมาณ 1 เดือนจึงจะพาลูกกลับเข้าฝูง

### ปัจจัยคุกคาม :

- 1) สภาวะสงคราม ( ในอดีต ) เนื่องจากพื้นที่ที่กูปรีอาศัยเป็นรอยต่อของชายแดน 3 ประเทศ
- 2) การบุกรุกพื้นที่ป่า ( ทำให้กูปรีเสียถิ่นอาศัย และหากิน )
- 3) การล่าสัตว์ป่า ( นำชิ้นส่วนไปบริโภค และอุปโภค )

ชื่อไทย : กูปรี / โคไพร

ชื่อสามัญ : Koupri

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Bos sauveli* (Urbain, 1937)

อาณาจักร : Animalia

ไฟลัม : Chordata

ชั้นไฟลัม : Vertebrata

ชั้น : Mammalia

ลำดับ : Cetartiodactyla

วงศ์ : Bovidae

วงศ์ย่อย : Bovinae

สกุล : Bos

ชนิด : *Bos sauveli*



# ควายป่า

## WILD WATER BUFFALO

*Bubalus arnee* (Kerr, 1792)


IUCN  
EN  
ใกล้สูญพันธุ์

### ส่วนของหัว

ควายป่าตัวผู้และตัวเมียมีขนาดหัว 2 ด้าน มีขนาดใหญ่ วงกว้างโค้งไปด้านหลังคล้ายเขี้ยวพระจันทร์ ไม่มีการแตกกิ่งงาใหญ่ มีเขี้ยวบริเวณคอตัวผู้ เขี้ยวของควายป่าเป็นลักษณะเป็นปล้องๆ ซึ่งส่วนบนบนของกระดูกที่งอกติดกับกระดูก ทำหน้าที่ควายเป็นลักษณะสามเหลี่ยม ปล้องเหล่านี้ลักษณะเรียบเรียบ

### ส่วนของลำตัว

ควายป่ามีขนตามลำตัวสีเทา หรือสีน้ำตาลดำ มีขนสีน้ำตาลดำ (V) ที่บริเวณหน้าอกควายป่าเป็น มีระบบย่อยอาหาร 4 ช่อง ทำให้ควายป่าสามารถย่อยอาหารชิ้นมาจากส่วนกระเพาะอาหาร ป่าขึ้นมาย่อยให้ละเอียดใช้ไฟ



น้ำหนักของควายป่า  
900 - 1,200 กก.

รอยตีนของควายป่า



1.4 ซม.

### ส่วนของตีน

ควายป่าเป็นสัตว์กินหญ้า 4 ข้าง ของควายป่าจะมีลักษณะเป็นขนสีขาวตั้งแต่หน้าถึงหางไม่ถึงกับสั้น ถูกเรียกว่า "ควายป่าขนฟูเพ้า"



### พฤติกรรมและที่อยู่อาศัย :

นิสัยคู่ร้าย มีความปราดเปรียว ว่องไว มีการสังเกตและรู้ถึงอันตรายที่เข้าใกล้ได้รวดเร็ว ตัวผู้และตัวเมียที่ยังไม่โตเต็มวัยจะอาศัยรวมอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ ส่วนตัวผู้ที่โตเต็มวัยมักจะอาศัยอยู่ตามลำพัง ตามป่าทุ่ง ป่าโปร่ง พื้นที่ที่มีหนองบึงและลำห้วยลำธาร

### อาหาร :

ออกหากินในเวลาเช้าและเย็น อาหารได้แก่ หญ้าต่าง ๆ ใบไม้ หน่อไม้ และลูกไม้ต่าง ๆ หลังจากกินอาหารอิ่มแล้ว ควายป่าจะนอนเฝ้าฝูงอยู่ตามทุ่งไม้ หรือ พงหญ้าสูง ๆ มักนอนแช่ปลักโคลนตอนกลางวัน เพื่อให้โคลนติดตามตัวเพื่อป้องกันความร้อนและแมลง

### การสืบพันธุ์ :

ควายป่าตัวผู้จะกลับเข้ามาอาศัยรวมฝูงกับพวกควายป่าตัวเมียเพื่อผสมพันธุ์ในช่วงเดือน (ตุลาคม-พฤศจิกายน) ถ้าในฝูงมีตัวผู้ที่ขนาดใหญ่มากกว่า 1 ตัว จะมีการต่อสู้เพื่อแย่งชิงตัวเมีย ระยะตั้งท้องประมาณ 10 เดือน

### ปัจจัยคุกคาม :

- 1) การบุกรุกพื้นที่ป่า
- 2) การปล่อยสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะวัวและควายเข้ามาหากินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างอิสระ ซึ่งวัวและควายเป็นสัตว์ที่อยู่ในวงศ์เดียวกับ ควายป่า หากผู้เลี้ยงขาดการควบคุมโรคระบาด วัวและควายที่เข้ามาอาจนำโรคระบาดมาติดควายป่าได้
- 3) สูญเสียลูกเกิดใหม่ ควายป่าที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีจำนวนประชากรไม่มากนักเนื่องจากลูกของควายป่าที่เกิดใหม่ตกเป็นเหยื่อของเสือโคร่ง หรือจมน้ำ เมื่อเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่

ชื่อไทย : ควายป่า / มหิงสา

ชื่อสามัญ : Wild Water Buffalo

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bubalus arnee

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Subphylum : Vertebrata

Class : Mammalia

Order : Cetartiodactyla

Family : Bovidae

Genus : Bubalus

Species : Bubalus arnee



# ละอง / ละมั่ง

## ELD'S DEER

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Rucervus eldii* (M'Clelland, 1842)

EN IUCN  
ใกล้สูญพันธุ์

- ละมั่งจะมีเขาเฉพาะตัวผู้เท่านั้นลักษณะเขาเป็นรูปแบบ "เขาสู่" เมื่อเขาแก่เต็มที่ ละมั่งจะผลัดเขากิ่งจากนั้นจะงอกเขาใหม่ขึ้นมาแทนเขาเดิม

- ชื่อเรียกละอง / ละมั่ง  
ละองละมั่ง เป็นสัตว์พื้นเมืองของไทยโดย  
"ละอง" ใช้เรียกตัวผู้ที่มีเขาแล้ว  
"ละมั่ง" ใช้เรียกตัวเมีย และตัวผู้ที่ยังไม่มีเขา

- ละมั่งตัวผู้ และตัวเมีย  
จะมีจุดสีขาวขึ้นตามลำตัว  
แต่จุดจะจางหายไปเมื่อโตเต็มวัย  
สีขนละมั่งพันธุ์ไทย มีสีน้ำตาลอมส้ม  
สีกว่าพันธุ์พม่า ที่เป็นสีน้ำตาลเข้ม



### รอยตีน



- การสืบพันธุ์ อยู่ในช่วง เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน  
ระยะตั้งท้องประมาณ 240 - 244 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว  
ลูกแรกเกิดมีจุดลายสีขาวตามลำตัว

- พฤติกรรมและที่อยู่อาศัย ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่  
ตามป่าเต็งรังป่าโปร่ง หรือทุ่งหญ้าใกล้ ๆ แหล่งน้ำ  
กลางวันที่มีอากาศร้อนจะหลบไปอยู่ใต้ร่มไม้ชายป่า  
หรือเข้ปลักโคลน

- มีนิสัยการกินละมั่งชอบกินหญ้า และลูกไม้ต่าง ๆ  
ตามพื้นที่สูงหรือป่าโปร่ง

### พฤติกรรมและที่อยู่อาศัย :

ชอบอยู่กันเป็นฝูงใหญ่ตามป่าเต็งรัง ป่าโปร่ง หรือทุ่งหญ้าใกล้ ๆ แหล่งน้ำตอนกลางวันจะหลบอยู่ใต้ร่มไม้ หรือ  
เข้ปลักโคลนเพราะแดดร้อน ตัวผู้ไม่ชอบอยู่ในป่าทึบเนื่องจากเขาของมันมันขัดกับกิ่งไม้

### อาหาร :

กินหญ้า และลูกไม้ต่าง ๆ ตามทุ่งหญ้าโล่ง

### การสืบพันธุ์ :

ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน ระยะตั้งท้องประมาณ 240 - 244 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ลูกแรกเกิดจะมีจุดลาย  
สีขาว ๆ ตามลำตัว ซึ่งจะจางหายไปตอนโต แต่ตัวเมียจะยังคงมีลายให้เห็น วัยเจริญพันธุ์ตัวผู้ อายุ 1 ปีขึ้นไป ส่วนตัวเมีย  
อายุ 2 ปีขึ้นไป

### ปัจจัยคุกคาม :

- 1) การบุกรุกเพื่อการเกษตร
- 2) การลักลอบค้าสัตว์ป่า

\*\* ละอง/ละมั่ง ที่พบในไทยมีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ ละอง/ละมั่ง พันธุ์ไทย *C.e.siamensis* และพันธุ์พม่า *C.e.thamin*

ชื่อ ละอง/ละมั่ง

ชื่อสามัญ : Eld's Deer

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Rucervus eldii* (M'Clelland, 1842)

Kingdom : Animalia

Family : Cervidae

Phylum : Chordata

Subphylum : Vertebrata

Genus : *Rucervus*

Class : Mammalia

Species *Rucervus eldii*

Order : Cetartiodactyla



*Rucervus schomburgki* (Blyth, 1863)

Species : *Rucervus schomburgki*



# เลียงผา

## SEROW

*Capricornis sumatraensis* (Reichstein, 1799)

**VU** IUCN  
มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

### • ส่วนหัว

เลียงผามีลักษณะรูปร่างยาว คอยาว ใบหูเล็ก มีดวงตาโต ใช้ในการมองจากเงาที่สะท้อน อยู่บริเวณผืนป่า โดยจะดูน้ำขึ้นน้ำลง มีอายุถึง 15 ปีและตัวเมีย ยาวประมาณ 32 ซม. เติบโตจนโตเต็มที่ 15 ซม.

### • ส่วนของลำตัว

เลียงผามีขนปกคลุมทั่วทั้งตัว มีสีเทา มีจุดขาวบนลำตัวและคอ ขนสั้นและนุ่ม

### • ส่วนของตีน

เลียงผามีตีนที่แข็งแรง ลักษณะของเท้าที่กว้าง ไม่สามารถวิ่งเร็วเหมือนสัตว์อื่น เลียงผามีสีเทาเข้มบนลำตัวและคอ มีจุดขาวบนลำตัว ส่วนของเท้าที่กว้างและนุ่มมาก ใช้สำหรับปีนต้นไม้และปีนเขา

140 - 155 ซม.

ความยาวลำตัวของเลียงผาวัดจากปลายจมูกถึงโคนหาง

น้ำหนักของเลียงผา  
85 - 140 กก.



### พฤติกรรมและที่อยู่อาศัย :

อาศัยอยู่ตามภูเขาที่มีหน้าผาสูงชัน อยู่ตามเขตภูเขา ซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าดิบ สามารถปรับตัวอยู่ในพื้นที่หลายแบบ เช่น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ รวมทั้งป่าดิบชื้น

### อาหาร :

หากินตัวเดียว เว้นแต่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์และช่วงเลี้ยงลูกอ่อน อาจพบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง ออกหากินตอนเย็น และเช้ามืด เลียงผาชอบกินใบอ่อน เปลือกไม้ หน่อไม้ โดยเฉพาะรากไม้ที่มีกลิ่นหอม

### การสืบพันธุ์ :

เลียงผาตัวเมียสามารถเริ่มสืบพันธุ์ เมื่ออายุตั้งแต่ 3 ปี ระยะตั้งท้อง 200 - 300 วัน ตกไข่ครั้งละ 1 ตัว ลูกอาศัยอยู่กับแม่จนกระทั่งอายุ 1 ปี

### ปัจจัยคุกคาม :

1) สภาพแวดล้อมของป่าที่เป็นที่อาศัยที่เปลี่ยนไปด้วยมลภาวะต่าง ๆ ส่งผลให้สัตว์ป่าเปลี่ยนแปลงที่อาศัยอาจทำให้จำนวนของเลียงผาลดลงไปตามสภาพแวดล้อม

2) การบุกรุกป่าเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรทำให้เลียงผาถูกไล่ต้อนให้อยู่ตามภูเขาสูง นอกจากนี้การทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยบริเวณเขาหินปูนทำให้พื้นที่หากินลดลง และถูกล่าได้ง่ายขึ้น

3) การล่าเลียงผาเลียงผาถูกล่าเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีความเชื่อผิด ๆ ว่า ส่วนประกอบของเลียงผานั้นสามารถเอาไปใช้ในการทำยารักษาโรคได้

ชื่อไทย : เลียงผา เขื่อง กูรา โคร่า

ชื่อสามัญ : Sumatran Serow

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Capricornis sumatraensis*

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Subphylum : Vertebrata

Class : Mammalia

Order : Cetartiodactyla

Family : Bovidae

Genus : Capricornis

Species : Capricornis sumatraensis




# กวางผา

## BURMESE GORAL

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Naemorhedus evansi*

อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความสูง  
600 - 4,000 ม.

VU IUCN  
มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์



รอยเท้า



**ส่วนของตีน**  
กวางผาเป็นสัตว์ป่าที่มีกีบเท้าที่แข็งแรงและใช้สำหรับขุดโพรงดินเพื่อหาอาหารและใช้สำหรับขุดโพรงดินเพื่อหาอาหาร

### พฤติกรรมและที่อยู่อาศัย :

อาศัยอยู่เดี่ยว ๆ ตามลำพัง หรือบางครั้งจะอาศัยอยู่กันเป็นคู่หรือกลุ่มเล็ก ๆ (2-6 ตัว) หากินในช่วงเช้า และเย็น ในที่โล่งตามทุ่งหญ้า ที่ลาดชันน้อย ส่วนช่วงกลางวันมักจะนอนพักผ่อนบนลานหินตามหน้าผา ชะง่อนหิน

### อาหาร :

กินยอดไม้ และกินหญ้าเป็น ส่วนอาหารหลักนั้นส่วนใหญ่จะเป็นหญ้า รองลงมาเป็นไม้ล้มลุก ผลไม้ ยอดไม้ และใบไม้พุ่มเตี้ย ๆ อาหารโปรดของกวางผา คือยอดอ่อนของหญ้าระบัด

### การสืบพันธุ์ :

กวางผาเข้าสู่วันเจริญพันธุ์ตอนอายุ 2-3 ปี ผสมพันธุ์ในช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ระยะเวลาในการตั้งท้องประมาณ 6 - 7 เดือน

### ปัจจัยคุกคาม :

- 1) การบุกรุกพื้นที่ป่า การบุกรุกถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยทำให้กวางผาสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย
- 2) การปล่อยสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะวัวควาย ซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่ในวงศ์เดียวกับกวางผา จะสามารถนำมาซึ่งโรคระบาดที่สามารถติดกวางผาได้
- 3) การล่ากวางผา
- 4) ภาวะเลือดชิด (inbreeding)

ชื่อไทย : กวางผา, ม้าเทวดา

ชื่อสามัญ : Burmese Goral

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Naemorhedus evansi*

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Subphylum : Vertebrata

Class : Mammalia

Order : Cetartiodactyla

Family : Bovidae

Genus : *Naemorhedus*

Species : *Naemorhedus evansi*



# นกแต้วแร้วท้องดำ

## GURNEY'S PITTA

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Hydrornis gurneyi* (Hume, 1875)

**ตัวผู้** บริเวณส่วนหัวและส่วนท้ายทอย  
จะมีสีน้ำตาลเข้มแกมฟ้าสลับไล่ตึกกับหน้ามาก  
ที่มีสีดำสนิท ช่วงคอเป็นสีครีม

**ตัวเมีย** บริเวณส่วนหัว และท้ายทอย  
มีสีน้ำตาลเหลืองบริเวณหัว ตา หลังตา  
ขนกลุ่มหูสีดำ และบริเวณช่วงคอมีสีเหลืองครีม

**CR** IUCN  
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

**ตัวผู้** ปีกสีน้ำตาลเข้ม อาจมีสีเข้มกว่าลำตัวเล็กน้อย  
หางและขนกลุ่มหางด้านบนเป็นสีฟ้าอมเขียว  
กลางหางเป็นสีดำ

**ตัวเมีย** ส่วนปีกเป็นสีน้ำตาลแดง

101 - 109 มม.  
ความยาวของปีก

ขนกลุ่มส่วนหางด้านบนมีสีฟ้าอ่อน  
กลางหางเป็นสีดำ

45.5 - 52 มม.  
ความยาวของหาง

อาหารส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม้เห็ด หนอน นก ปลวก  
แมลง และสัตว์ที่ีขนาดเล็ก ที่อยู่บนพื้นดิน  
วิธีหาอาหาร จะใช้ปากจิกเหนือหรือข้างครึ่ง  
จะใช้ปากขยิบลงในดินเพื่อหาเหยื่อ

**ตัวผู้** ส่วนลำตัวของตัวผู้มีสีน้ำตาลส่วนบน  
เป็นสีเหลืองสด อกส่วนล่าง  
จะมีสีดำเป็นมัน ก้องและกันมีสีดำ  
ด้านข้างของลำตัว เป็นสีเหลือง  
และมีลายสีดำสลับ ๆ ทั่วทั้งตัว  
ตลอดแนวลำตัวด้านบนเป็นสีน้ำตาล

**ตัวเมีย** บริเวณส่วนล่างของลำตัวมีสีขาวอมเหลือง  
และมีลายสีดำสลับ ๆ ทั่วทั้งตัว  
ลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลแดง



### พฤติกรรมและที่อยู่อาศัย :

พบในป่าดงดิบชื้นหากินส่วนใหญ่ตามพื้นดิน เมื่อมีสิ่งรบกวนหรือมีภัย จะกระโดดเข้าหลบซ่อนตัวตามพุ่มไม้  
ถ้าหากจวนตัวจริง ๆ จะบินหนีแต่บินในระยะที่ไม่ไกล และระดับไม่สูงมาก

### อาหาร :

ไม้เห็ด หนอน และแมลงเล็ก ๆ

### การสืบพันธุ์ :

จะอยู่ในช่วงฤดูฝน ออกไข่ครั้งละ 3-4 ฟอง ลูกนกจะอยู่ในรังกับพ่อแม่ 8-14 วัน ขณะที่ขึ้นขึ้นก็จะออกตามพ่อแม่  
ไปหาอาหาร และจะไม่กลับรังอีกเลย

### ปัจจัยคุกคาม :

- 1) การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อการเกษตร
- 2) การลักลอบค้าสัตว์
- 3) ภัยจากนักท่องเที่ยว
- 4) ภัยจากศัตรูตามธรรมชาติ ได้แก่ งูเห่าหางม้า

ชื่อไทย : นกแต้วแล้วท้องดำ หรือ นกแต้วแร้วท้องดำ

ชื่อสามัญ : Gurney's Pitta

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Hydrornis gurneyi*

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Subphylum : Vertibrata

Class : Aves

Order : Passeriformes

Family : Pittidae

Genus : Hydrornis

Species : *Hydrornis gurneyi*



# นกกระเรียนพันธุ์ไทย

## EASTERN SARUS CRANE

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Grus antigone sharpii* (R. B sharpe, 1895)

VU IUCN

มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

180 - 220 ซม.

220 - 250 ซม.

นกกระเรียนพันธุ์ไทย  
มีน้ำหนัก 5 - 12 กก.

เครื่องหมายห่วงยาง  
กรมอุทยานฯ ร่วมกันองค์การสวนสัตว์  
จัดทำเครื่องหมายห่วงยางนกกระเรียนพันธุ์ไทย  
ที่ปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติ เพื่อติดตามผล  
การปล่อยนก และเป็นการระบุตัวของ  
นกกระเรียนที่ปล่อย

ส่วนของขาและหาง  
นกกระเรียนพันธุ์ไทยมีหางสั้นเป็นสีเทา  
ส่วนขาเป็นสีเทา มีขนาดเล็กเรียว แต่ยาว  
โคนขาเป็นสีขาว ส่วนหน้ายังลงไปในมือปกคลุม  
ตั้งแต่หน้าลงไปถึงครึ่งเป็นสีเทา

ที่อยู่อาศัย  
อาศัยหากินตามพื้นที่ชุ่มน้ำ เช่น หนอง บึง  
ทุ่งนา ทุ่งหญ้าที่มีน้ำขัง หรือทุ่งหญ้าโล่ง ๆ

### พฤติกรรมและที่อยู่อาศัย :

ดำรงชีวิตอยู่เป็นคู่ บางครั้งพบอยู่รวมกันเป็นฝูง หากินตอนกลางวันอยู่ตามชายน้ำ หนอง บึง ทะเลสาบ ทุ่งนา ทุ่งหญ้าที่มีน้ำขัง หรือทุ่งหญ้าโล่ง ๆ

### อาหาร :

กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร ได้แก่ วัชพืช เมล็ดหญ้า ราก และต้นอ่อนของพืช หนอน แมลง หอย ปู ปลา กบ เขียด สัตว์เลื้อยคลานตัวเล็กๆ เช่น งูน้ำ เป็นต้น

### การสืบพันธุ์ :

แสดงพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีเพศตรงข้ามด้วยการส่งเสียงร้องดังกังวาน และกางปีกชูคอขึ้น แหงนหน้าและกระโดดไปมาคล้ายเต้นรำ เมื่อผสมพันธุ์แล้วทั้งตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันสร้างรังบนพื้นดิน ลักษณะรังทำด้วยหญ้าแห้งและใบไม้ นำมาผสมรวมกันคล้ายกับกระจาดขนาดใหญ่ ในรังอาจมีไข่ประมาณ 1-3 ฟอง ไข่มีลักษณะรี ขาว ๆ ขนาดของไข่เฉลี่ย ยาว 104 มม. กว้าง 64 มม. น้ำหนัก 238 กรัม

### ปัจจัยคุกคาม :

- 1) การใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงในพื้นที่เกษตรกรรม
- 2) ไข่มักถูกนำไปจากรัง หรือถูกทำลาย โดยสัตว์ชนิดอื่น และมนุษย์

ชื่อไทย : นกกระเรียนพันธุ์ไทย / นกกระเรียนอินโดจีน

ชื่อสามัญ : Eastern Sarus Crane

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Grus antigone sharpii*

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Subphylum : Vertebrata

Class : Aves

Order : Gruiformes

Family : Gruidae

Genus : Grus

Species : Grus antigone



# แมวลายหินอ่อน

## MARBLED CAT


*Pardofelis marmorata* (Martin, 1837)

● ส่วนของหัว  
แมวลายหินอ่อนมีลักษณะเด่น  
เป็นวงรีบนหน้าผาก ภายนอกใหญ่  
ช่วยในการมองเห็นภาพได้ชัด  
และมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว  
เพื่อจับเหยื่อที่เคลื่อนไหว

NT IUCN  
ใกล้สูญพันธุ์

● ส่วนของลำตัว

มีขนปกคลุมลำตัวสีน้ำตาลปนเหลือง  
บริเวณลำตัวด้านหลังมีลายเส้นสีน้ำตาล  
มีลายเส้นสีน้ำตาลปนขาว ๆ ภายนอกใหญ่  
ถูกทำลายลายหินอ่อน



35 - 54 ซม.

ความยาวหางของแมวลายหินอ่อน

45 - 61 ซม.

ความยาวลำตัวของแมวลายหินอ่อนวัดจากปลายจมูกถึงโคนหาง

● ส่วนของหาง

หางของแมวลายหินอ่อนมีความยาวเกือบ  
เท่า หรือยาวกว่าลำตัวเล็กน้อย ทำหน้าที่  
รักษาสมดุลการทรงตัวเมื่อปีนต้นไม้

● ส่วนของเท้า

มีขนนิ้วและปุ่มฝ่าเท้า  
ใช้สำหรับเกาะยึดเมื่อปีนต้นไม้และซ่อนตัว  
จะนิยมนักล่าเหยื่อที่เคลื่อนไหวช้าๆ และตัว  
รวดเร็ว และเงียบ

### พฤติกรรมและที่อยู่อาศัย :

นิสัยค่อนข้างดุร้ายออกหากินทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน มีความว่องไว และปีนต้นไม้เก่ง มักอาศัยอยู่ใน  
ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา และป่าเบญจพรรณ

### อาหาร :

เป็นสัตว์กินเนื้อ ได้แก่ กระแต กระรอก ลิงลม และลิงขนาดเล็ก ตลอดจนนก สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

### การสืบพันธุ์ :

จากการศึกษาในกรงเลี้ยง แมวลายหินอ่อนตั้งท้องนานประมาณ 81 วัน ออกลูกครั้งละ 1-4 ตัว ลูกแมวแรกเกิด  
หนักประมาณ 100-115 กรัม เริ่มตั้งเมื่ออายุได้ 5 วัน ลืมตาได้เมื่ออายุ 14 วัน เมื่ออายุได้ 21 เดือนก็เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์  
แมวลายหินอ่อนในกรงเลี้ยงที่อายุยืนที่สุดมีอายุ 12 ปี

### ปัจจัยคุกคาม :

- 1) สภาพแวดล้อม ป่าที่อยู่อาศัยเปลี่ยนไปด้วยมลภาวะต่างๆ ส่งผลให้สัตว์ป่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยทำให้จำนวน  
ของแมวลายหินอ่อนลดลงไปตามสภาพเสื่อมโทรมของป่า
- 2) การบุกรุกป่าเพื่อลักลอบตัดไม้เถื่อน การถางป่าเพื่อการเกษตร การเผาป่า ส่งผลให้แมวลายหินอ่อนสูญเสียที่อยู่อาศัย
- 3) การลักลอบล่าสัตว์

ชื่อไทย : แมวลายหินอ่อน

ชื่อสามัญ : Marbled Cat

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Pardofelis marmorata*

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Subphylum : Vertebrata

Class : Mammalia

Order : Carnivora

Family : Felidae

Genus : *Pardofelis*

Species : *Pardofelis marmorata*



# สมเสร็จ

## MALAYAN TAPIR

*Tapirus indicus* (Desmarest, 1819)

EN IUCN  
ใกล้สูญพันธุ์

### • ส่วนของหัว

ลักษณะเด่น คือ จมูกและริมฝีปากยื่นออกมาทั้งยาวทั้งกว้างสามารถฉีกและกัดได้ จมูกใช้ในการดมกลิ่นได้ หักกิ่งไม้และฟันน้ำใต้ มีรูตึง และตาขนาดเล็ก

### • ส่วนของลำตัว

สมเสร็จมีสีตัวเข้มสีน้ำตาลหรือดำบริเวณลำตัวโดยมีสีที่ต่างกันที่ส่วนหัว หินขาวและส่วนขาหลังสีเข้ม ส่วนสีขาวกลางลำตัวบริเวณคอจะมีแผ่นหนังที่มีความหนาช่วยป้องกันอันตราย

• น้ำหนักของสมเสร็จ  
150 - 300 กก.

### • อาหาร

สมเสร็จกินพืชเป็นอาหาร ได้แก่ ใบอ่อน ยอดไม้ กิ่งไม้ที่แตกใหม่ หรือผลไม้ สมเสร็จจะเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวของพืชแต่ละชนิดเพียงเล็กน้อยสลับกันไป

### • ส่วนของกิน

สมเสร็จเป็นสัตว์กินที่ กินละอองกินน้ำ 3 กิน ส่วนกินน้ำกินน้ำ 4 กิน ลักษณะกับก่อนเข้าพิธี

220 - 240 ซม.

ความยาวลำตัวของสมเสร็จวัดจากปลายจมูกถึงโคนหาง

รอยเท้า  
ของสมเสร็จ

### พฤติกรรมและที่อยู่อาศัย :

อาศัยอยู่โดดเดี่ยวตามลำพัง ในป่าดงดิบ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง และป่าผสมผลัดใบ แต่จะอยู่เป็นคู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์

### อาหาร :

ออกหากินเวลากลางวันและกลางคืน ใช้จมูกดมกลิ่นเพื่อค้นหาอาหารจำพวก ใบไม้อ่อน ยอดไม้ที่แตกกิ่งใหม่ หรือผลไม้ มักชอบเดินเล็มกินยอดไม้ของพืชแต่ละชนิดเพียงเล็กน้อย ไปเรื่อย ๆ สลับกันไป

### การสืบพันธุ์ :

ระยะตั้งท้องประมาณ 390-407 วัน สมเสร็จตัวเมีย ตกไข่ครั้งละ 1 ตัว ทุก 2 ปี ลูกที่เกิดใหม่มีขนสีน้ำตาลมีลายแถบสีขาวเป็นแนวตามยาวลำตัวคล้ายลายเตงไทยลายตามตัวจะหายไปและเปลี่ยนเป็นสีดำสลับขาวเหมือนพ่อแม่เมื่ออายุ 6-8 เดือน

### ปัจจัยคุกคาม :

1) สภาพแวดล้อม สภาพของป่าเปลี่ยนไปด้วยมลภาวะต่าง ๆ ส่งผลให้สัตว์ป่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย อาจทำให้จำนวนของสมเสร็จลดลงไปตามสภาพแวดล้อม

2) การบุกรุกป่า

3) การลักลอบล่าสัตว์ป่า เนื่องจากสมเสร็จมีรูปร่างที่น่าสนใจอาจทำให้มีผู้ต้องการครอบครองหรือตัวเป็น ๆ จึงทำให้มีการลักลอบ ดักหรือล่าสมเสร็จ นำมาขายอยู่เสมอ

ชื่อไทย : สมเสร็จ

ชื่อสามัญ : Malayan Tapir

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Topirus indicus*

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Subphylum : Vertebrata

Class : Mammalia

Order : Perissodactyla

Family : Tapiridae

Genus : Tapirus

Species : Tapirus indicus



# แก้งหม้อ

## FEA'S MUNTJAC


*Muntiacus feae* (Thomas & Doria, 1889)

DD IUCN  
ข้อมูลไม่เพียงพอ



### • ส่วนหัว

แก้งหม้อมีเขาเป็นเกล็ดกระดูกที่ติดกับส่วนกะโหลกโดยจะมีเกล็ดทุกปี เขาของแก้งหม้อมี 2 คู่ แก้งหม้อในและแก้งหม้อยาว หนักมากจนเป็นอันตรายต่อเขาทั้งสองในบางครั้งเป็นรูปตัววี แก้งหม้อในและแก้งหม้อเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีต่อมปากใหญ่โตได้ชัดเจน



### • ส่วนของลำตัว

แก้งหม้อมีเขาคือตัวเป็นป็นเกล็ดของกระดูกที่ติดกับส่วนกะโหลกโดยจะมีเกล็ดทุกปี เขาของแก้งหม้อมี 2 คู่ แก้งหม้อในและแก้งหม้อยาว หนักมากจนเป็นอันตรายต่อเขาทั้งสองในบางครั้งเป็นรูปตัววี แก้งหม้อในและแก้งหม้อเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีต่อมปากใหญ่โตได้ชัดเจน

7.6 ซม.  
ความยาวของแก้งหม้อ

50 - 55 ซม.  
ความสูงของแก้งหม้อ  
วัดจากพื้นถึงไหล่

ความสูงของแก้งหม้อ  
วัดจากพื้นถึงไหล่

ภาพ : Paul Thompson

### • ส่วนตีนและหาง

ขนของแก้งหม้อเหมือนกับขนอื่น ๆ มีสีดำ ด้านหน้าของหางถึงกับมีขนยาวไป มีขนสีขาว ส่วนหางมีขนปกคลุมด้านบนเป็นสีดำ และด้านล่างของหางมีสีขาว

88 ซม.  
ความยาวลำตัวของแก้งหม้อ  
(โดยประมาณ)

ความยาวลำตัวของแก้งหม้อ  
(โดยประมาณ)

### พฤติกรรมและที่อยู่อาศัย :

ชอบอาศัยอยู่เดี่ยว ๆ ถ้าพึ่งในป่าดงดิบบนที่ราบสูง หรือภูเขา มีอาณาเขตครอบครอง ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร

### อาหาร :

ออกหากินเวลากลางวัน กินยอดไม้ และกินหญ้า ใบไม้อ่อน ยอดไม้ เปลือกไม้ ยอดหญ้า หน่อไม้อ่อน และหญ้าระบัด

### การสืบพันธุ์ :

แก้งหม้อจะอยู่เป็นคู่ช่วงฤดูผสมพันธุ์ ตั้งท้องประมาณ 6 เดือน ตกไข่ครั้งละ 1 ตัว ลูกแก้งหม้อจะมีจุดสีขาวตามลำตัว

### ปัจจัยคุกคาม :

1) สภาพแวดล้อม สภาพของป่าเปลี่ยนไปด้วยมลภาวะต่าง ๆ ส่งผลให้สัตว์ป่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย อาจทำให้จำนวนของสมเสร็จลดลงไปตามสภาพแวดล้อม

2) การบุกรุกป่า และการสร้างเขื่อน

อไทย : แก้งหม้อ แก้งดำ กวางเขาจุก

ชื่อสามัญ : Fea's Muntjac

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Muntiacus feae*

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Subphylum : Vertebrata

Class : Mammalia

Order : Cetartiodactyla

Family : Cervidae

Genus : Muntiacus

Species : Muntiacus feae



# พะยูน DUGONG

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Dugong dugon* (Müller, 1776)

VU IUCN

มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

- พะยูนมีหนังตาบาง ๆ เปิด-ปิดได้ จะขยับตาเพื่อรับแสงเพื่อรักษาสมดุลในร่างกายออกมาเป็นน้ำเมือกทางลูกตาทางรูจมูก
- พะยูนเป็นสัตว์ที่ตื่นตกใจง่าย

3.15 - 3.31 เมตร

- อาหารของพะยูนได้แก่ พืชทะเลชนิดต่างๆ ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ อยู่บริเวณที่มีพืชมะพร้าวและอวนสมบุรณ์

- ริมฝีปากของพะยูน เป็นก้อนเนื้อใหญ่เหนียวมีลักษณะเป็นเหลี่ยมๆ คล้ายงูปากหนใช้รวม พืชทะเลเข้าปากกลืนกินอาหาร เพดานปากสร้างเป็นแท่งไทรอยด์ช่วย ในการบดเคี้ยวเพื่อหาอาหาร

- ตัวน้ำได้ลึกถึง 39 เมตร แต่ส่วนใหญ่จะดำน้ำอยู่ระดับ 10 เมตร เพราะพะยูนจะต้องมาหายใจทุก 2 -3 นาที โดยการโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำเล็กน้อย

- ครีบทั้งสองข้างของพะยูน ประกอบด้วย 5 นิ้ว ครีบจะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนที่ และช่วยในการขุดหาพืชมะพร้าว

- น้ำหนักของพะยูน 200 - 300 กิโลกรัม

- วัฏจักรพันธุ์ของพะยูน อยู่ที่ 9 - 10 ปี พะยูนตั้งท้องนาน 13 -14 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว และทั้งระยะการตั้งท้องนานถึง 3 - 7 ปี

## พฤติกรรมและที่อยู่อาศัย :

เป็นสัตว์ที่ตื่นตกใจง่าย ดำน้ำได้ลึกถึง 39 เมตร แต่ส่วนใหญ่จะดำน้ำอยู่ในระดับ 10 เมตร พะยูนต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำทุก ๆ 2-3 นาที โดยโผล่จมูกขึ้นมาเหนือผิวน้ำเล็กน้อย บางครั้งอาจจะโผล่ส่วนหลังและหางว่ายน้ำได้เร็วระดับ 1.8-2.2 กม/ชม. อาศัยบริเวณพื้นที่ที่มีแนวหญ้าทะเล ในทะเลเขตร้อน และทะเลเขตกึ่งร้อน

## อาหาร :

หญ้าทะเลชนิดต่าง ๆ ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการกิน และจะอาศัยอยู่ใกล้ ๆ บริเวณที่มีหญ้าทะเลขึ้นอุดมสมบูรณ์ สามารถกินอาหารได้ตลอดเวลา เนื่องจากการมองเห็นที่ไม่ชัดเจนนักเท่าไร พะยูนจะใช้จมูกดมกลิ่นในการหาอาหาร และใช้หนวดในการสัมผัสสิ่งรอบ ๆ ตัว

## การสืบพันธุ์ :

เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ประมาณอายุ 9-10 ปี พะยูนตัวเมียตั้งท้องนาน 13-14 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว และทั้งระยะในการตั้งท้องนาน 3-7 ปี

## ปัจจัยคุกคาม :

- 1) การสร้างมลพิษทางทะเล โดยเฉพาะ ขยะพลาสติก
- 2) อันตรายจากเรือประมง
- 3) การล่าพะยูน

ชื่อไทย : พะยูน พยูน พยूर ดูหยง ดูหยง หมูทะเล หมูน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Dugong dugon* (Müller, 1776)

อาณาจักร : Animalia

ไฟลัม : Chordata

ชั้น : Mammalia

อันดับ : Sirenia

วงศ์ : Dugongidae Gray, 1821

วงศ์ย่อย : Dugonginae Simpson, 1932

สกุล : *Dugong* Lacépède, 1799

สปีชีส์ : *D. dugon*



# วาฬบรูด้า

## BRYDE'S WHALE

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Balaenoptera edeni*

LC

IUCN

ไม่ถูกคุกคาม

จัดอยู่ในกลุ่ม : สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

กินแพลงก์ตอน

ของสัตว์จำพวกกุ้ง

และปลาขนาดเล็ก 590 kg / วัน

วาฬบรูด้าไม่มีฟัน

แต่มีซี่กรองเล็ก ๆ สีเทา

จำนวน 250 - 370 คู่

ด้านบนมี 3 เส้น

พฤติกรรมใช้อัตินแบบอำปาก

ขยายร่องใต้คางให้ใหญ่ขึ้นและพุ่งเข้าสูบน้ำ

โดยมีทั้งแบบตึงส่วนหัวขึ้นมาเหนือผิวน้ำ

หรือแค่ยกตัวด้านข้าง

ใต้คางมีร่อง 40 - 70 ร่อง  
ร่องใต้คางนี้จะขยายออก  
ขณะที่กำลังกินอาหาร  
เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับเหยื่อ

วัยเจริญพันธุ์ 8 - 13 ปี

ตั้งท้องนาน 11 - 12 เดือน

ออกลูกครั้งละ 1 ตัว

14 - 15.5 เมตร

• วาฬบรูด้าเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวน พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พบวาฬชนิดนี้แพร่กระจายอยู่ทั่วโลก โดยเฉพาะในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน ในเขตละติจูด 40 องศาเหนือถึงใต้ ไม่พบการอพยพย้ายถิ่นฐานเป็นระยะทางไกล

• ในประเทศไทยมีรายงานการพบวาฬบรูด้าทั้งฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน พบหากินในบางฤดูบริเวณเกาะสุรินทร์ จ.พังงา และนอกชายฝั่งทับละมุ จ.พังงา ซึ่งพบห่างจากฝั่งเพียงแค่ 4-30 กิโลเมตร และประชากรที่พบในอ่าวไทยจัดเป็นวาฬประจำถิ่น

• มีบันทึกข้อมูลการเกยตื้นแบบยังมีชีวิตที่ อ่าวสิเกา จ.ตรัง และที่ จ.สตูล และพบซากเกือบทุกจังหวัดชายทะเลทั้งสองฝั่ง ส่วนฝั่งอ่าวไทยพบแพร่กระจายเกือบตลอดทั้งปีในอ่าวไทยตอนบน ในพื้นที่ชายทะเลของ จ.ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี และเคยพบเข้ามาหากินใกล้ฝั่งที่บ้านบ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์

### ---- สถานภาพการอนุรักษ์ ----

• สถานภาพการอนุรักษ์ในระดับโลก โดยการจัดอันดับของ IUCN (2018) คือ Least Concern (LC) หรือ ไม่ถูกคุกคาม/สถานภาพยังไม่น่าเป็นกังวลเท่าที่ควร

• สถานภาพการอนุรักษ์ในประเทศไทยเป็นสัตว์ป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

ชื่อไทย : วาฬบรูด้า

ชื่อสามัญ : Bryde's whale, Eden's whale

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Balaenoptera edeni*

อาณาจักร: Animalia

ไฟลัม: Chordata

ชั้น: Mammalia

อันดับ: Artiodactyla

วงศ์: Balaenopteridae

สกุล: Balaenoptera

สปีชีส์: *B. edeni*



# วาฬโอมูระ

## OMURA'S WHALE

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Balaenoptera omurai*

IUCN

ข้อมูลไม่เพียงพอ

จัดอยู่ในกลุ่ม : สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

DD



ด้านบนมีเส้น 1 เส้น

10 - 11.5 เมตร

ชื่อรองตามชายขวา  
ด้านละ 180 - 210 ซี

รอยจับได้คือ 80 - 90 รอยจับ

มีน้ำหนักรวมประมาณ 20 ตัน

วัยเจริญพันธุ์ 8 - 13 ปี

กินปลาขนาดเล็ก  
และเคย เป็นอาหาร

พฤติกรรมใช้วิธีกินแบบอ้าปาก

ขยายช่องใต้คางให้ใหญ่ขึ้น และพุ่งเข้าสู่มหาสมุทร  
โดยมีทั้งแบบตึงส่วนหัวขึ้นมาเหนือผิวน้ำ  
หรือตะแคงตัวด้านข้าง หรือหงายท้อง

• เป็นวาฬสายพันธุ์ที่หายากที่มีความคล้ายคลึงกับวาฬบรูด้า แต่มีความแตกต่างกันตรงโดยวาฬโอมูระนั้นมีขนาดเล็กกว่า แต่มีรอยจับได้ค้อมีจำนวนมากกว่า มีครีบหลังที่สูงกว่าและมีความโค้งที่น้อยกว่าวาฬบรูด้า

• ส่วนใหญ่พบการกระจายในมหาสมุทรแปซิฟิก สำหรับในประเทศไทยมีรายงานการพบวาฬโอมูระทั้งฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน

### ---- สถานภาพการอนุรักษ์ ----

• สถานภาพการอนุรักษ์ในระดับโลก โดยการจัดอันดับของ IUCN (2018) คือ Data Deficient (DD) หรือยังมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการจัดอันดับ

• สถานภาพการอนุรักษ์ในประเทศไทย เป็นสัตว์ป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

ชื่อไทย : วาฬโอมูระ

ชื่อสามัญ : Omura's whale

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Balaenoptera omurai*

อาณาจักร: Animalia

ไฟลัม: Chordata

ชั้น: Mammalia

อันดับ: Artiodactyla

Parvorder: Mysticeti

วงศ์ใหญ่: Balaenopteroidea

วงศ์: Balaenopteridae

สกุล: Balaenoptera

สปีชีส์: 'B. omurai'



# เต่ามะเฟือง

## LEATHERBACK TURTLE

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Dermochelys coriacea*

ไข่เต่าในหลุมฟักเริ่มมีการแบ่งเซลล์  
และเริ่มพัฒนาเป็นตัวอ่อน  
ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 55 - 65 วัน  
ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

**VU** IUCN มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์  
จัดอยู่ในกลุ่ม สัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์

เต่ามะเฟืองเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  
โตเต็มที่มียาว 210 ซม.หนัก 90 กิโลกรัม

กระดองเป็นหนังหนาสีดำ  
ที่มีจุดประสีขาว  
มีร่องสันบนตามยาว 7 สัน

45 - 55 วัน



25 - 30 วัน



20 วัน



15 วัน



เริ่มวางไข่



♂  
31°C  
กลุ่มไข่  
เล็กประมาณ  
60 - 80  
เซนติเมตร  
28°C  
♀

ไม่สามารถหลบหัวเข้ากระดองได้

กินแมงกะพรุน แพลงก์ตอน  
และสาหร่ายเป็นอาหาร

1.5 - 2.5 เมตร

• เต่ามะเฟือง จัดเป็นสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับความสำคัญจากนานาชาติ เนื่องจากอพยพ  
ย้ายถิ่นระยะไกล จึงมีแหล่งอาศัยในพื้นที่ทางทะเลระหว่างประเทศ จัดเป็นทรัพยากรร่วมของภูมิภาคและระดับโลก

• เป็นเต่าทะเลที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับเต่าทะเลที่มีอยู่ 7 ชนิดทั่วโลก จำนวน  
ประชากรพ่อแม่พันธุ์เต่ามะเฟืองที่มาผสมพันธุ์และวางไข่ในประเทศไทย ลดลงอย่างต่อเนื่อง “เหลือเพียงปีละไม่ถึง  
10 ตัวในปัจจุบัน”

• ทำให้ต้องมีการทบทวนแนวทางการอนุรักษ์เต่ามะเฟือง เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการคุ้มครองเต่าทะเลที่มี  
ขนาดใหญ่ที่สุดของโลกชนิดนี้ ให้เป็นสัตว์สงวนแห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

### ---- กัยคุกคาม ----

• ไม่พบการค้าจับเต่ามะเฟืองในน่านน้ำไทยเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการค้า แต่พบการติดเครื่องมือประมง  
โดยบังเอิญ ซึ่งอาจนำไปสู่การส่งออกเพื่อขายสำหรับการอุปโภคและบริโภคในตลาดต่างประเทศ

• การลักลอบเก็บไข่เต่ามะเฟืองเพื่อการบริโภค และลักลอบขาย

• ถูกรบกวนจากกิจกรรมในทะเล

• การสูญเสียสภาพชายหาดที่เหมาะสมต่อการวางไข่

• ถูกรบกวนจากกิจกรรมบนชายฝั่ง

• ขยะทะเล

ชื่อไทย : เต่ามะเฟือง

ชื่อสามัญ : Leatherback, Leatherback Sea Turtle,  
Leathery Turtle, Luth, Trunkback Turtle,  
Trunk Turtle, Coffin-back, Leatherback Turtle

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Dermochelys coriacea* (Vandelli, 1761)

อาณาจักร: Animalia

ไฟลัม: Chordata

ชั้น: Reptilia

วงศ์: Dermochelyidae



# ปลาฉลามวาฬ

## WHALE SHARK

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Rhincodon typus*

EN

IUCN

ใกล้สูญพันธุ์

จัดอยู่ในกลุ่ม ปลา

ฉลามวาฬนับเป็นปลากินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

วัยเจริญพันธุ์ของฉลามวาฬคือช่วงอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป

โดยฉลามวาฬอาจมีอายุยืนยาว 60 - 120 ปี

5.5 - 12 เมตร

หางฉลามวาฬอยู่ในแนวตั้งฉาก

มีน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่ 20 ตัน

ใช้เหงือกในการหายใจ  
มีช่องเหงือก 5 ช่อง

อยู่ตามแนวปะการัง

ในความลึกไม่เกิน 700 เมตร

ในไทยสามารถพบฉลามวาฬ

ได้ทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน

ฉลามวาฬหากินด้วยการกรองแพลงก์ตอน

และสัตว์ทะเลขนาดเล็กเป็นอาหารด้วยการอ้าปากกรอง

น้ำทะเล ราวๆ 5,000 ลิตรต่อชั่วโมงผ่านซี่กรอง ( gill raker )

มีฟันซี่เล็ก ๆ ขนาด 6 มิลลิเมตรมากกว่า 3,000 ซี่

- เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัดเป็นปลาระดับอ่อน

- อาศัยอยู่ในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น ตามแนวปะการังที่ความลึกไม่เกิน 700 เมตรสำหรับในประเทศไทย มีรายงานการพบปลาฉลามวาฬทั้งฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน

- สาเหตุที่ทำให้ฉลามวาฬลดจำนวนลง เหตุหนึ่งที่ทำให้ฉลามวาฬลดจำนวนลงคือจากการทำการประมง แม้ว่าตัวฉลามวาฬเองจะไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่มันก็ติดเครื่องมือประมงบ่อและครีบกุ้งของมันก็มีขนาดใหญ่และราคาดี อีกสาเหตุหนึ่งคือการนิยมนำฉลามวาฬซึ่งทำให้เรือเข้าไปใกล้ฉลามวาฬและถูกเรือชนเป็นประจำ

- นอกจากนี้แล้วปัญหาเรื่องไมโครพลาสติกที่ติดมากับแพลงก์ตอน นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสารพิษที่สะสมอยู่ในไมโครพลาสติกจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางชีวภาพ และส่งผลเสียต่อชีววิทยาการสืบพันธุ์ของฉลามวาฬได้

### ---- สถานภาพการอนุรักษ์ ----

- สถานภาพการอนุรักษ์ในระดับโลก โดยการจัดอันดับของ IUCN (2018) คือ Endangered (EN) หรือ ใกล้สูญพันธุ์

- สถานภาพการอนุรักษ์ในประเทศไทย เป็นสัตว์ป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

ชื่อไทย : ฉลามวาฬ

ชื่อสามัญ : whale shark

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Rhincodon typus*

อาณาจักร: Animalia

ไฟลัม: Chordata

ชั้น: Chondrichthyes

อันดับ: Orectolobiformes

วงศ์: Rhincodontidae

สกุล: Rhincodon

สปีชีส์: 'R. typus'





สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช



<https://www.facebook.com/DNP.Wildlife>