


БИФЛУРИН

Вориконазол

*Создавая
лекарства,
сохраняем
жизни!*



Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, 200 мг №14
Международное непатентованное наименование: Вориконазол
Фармакотерапевтическая группа: Противогрибковое средство
Регистрационное удостоверение: DV/X 05580/01/19
Код АТХ: J02AC03

Адрес завода: АО «Фармасинтез» 664040, Россия, г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, д. 184.
Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии от потребителей
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истикбол 34, Бизнес центр "ARASH" офис 216
Представительство в Республике Узбекистан АО «Фармасинтез»
Тел.: +998 71 205-82-77



БИФЛУРИН

• Вориконазол – противогрибковое средство широкого спектра действия из группы триазолов. Механизм действия вориконазола связан с ингибированием деметилирования 14 α -стерола, опосредованного грибковым цитохромом Р450 – ключевого этапа биосинтеза эргостерола.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Инвазивный аспергиллез. Кандидемия у пациентов без нейтропении. Тяжелые инвазивные кандидозные инфекции (включая *C. krusei*). Кандидоз пищевода.
- Тяжелые грибковые инфекции, вызванные *Scedosporium* spp. и *Fusarium* spp. Другие тяжелые инвазивные грибковые инфекции при непереносимости или рефрактерности к другим лекарственным средствам.
- Профилактика «прорывных» грибковых инфекций у пациентов со сниженной функцией иммунной системы, лихо- радкой и нейтропенией, из группы высокого риска.
- Профилактика инвазивных грибковых инфекций у пациентов (взрослых и детей старше 12 лет) группы высокого риска, таких как реципиенты трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Повышенная чувствительность к вориконазолу или любому компоненту препарата Бифлурин. Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции (так как препарат Бифлурин содержит лактозу).
- Одновременное применение препарата Бифлурин и терфенадина, астемизола, цизаприда, пимозида, хинидина, сиролимуса, эверолимуса, рифампицина, карбамазепина и длительно действующих барбитуратов (например, фенобарбитала), алкалоидов спорыньи (эрготамина, дигидроэрготамина), эфавиренза (в дозе 400 мг и выше один раз в сутки), ритонавира в высоких дозах (400 мг и выше 2 раза в сутки), флуконазола, препаратов зверобоя продырявленного.
- Применение препарата Бифлурин в стандартной дозе (200 мг 2 раза в сутки) одновременно с рифабутином.
- Детский возраст до 3 лет (для данной лекарственной фор- мы).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

- Внутрь, за 1 ч до еды или спустя 1 ч после еды. Бифлурин следует применять с внутривенного введения в рекомендуемой насыщающей дозе, чтобы уже в первый день добиться адекватной концентрации в плазме крови, и продолжать как минимум 7 дней, после чего возможен переход на пероральный прием вориконазола.

Условия хранения: В защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности: 2 года.

ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ

Информация для специалистов Здравоохранения.