



# ТАКСЕЛЕН КОНЦЕНТРАТ 40 МГ / МЛ



РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ



РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ



РАК ЛЕГКИХ



РАК ЖЕЛУДКА



РАК ГОЛОВЫ/ШЕИ



1. РУ DV/X 10131/09/22

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ТАКСЕЛЕН

3. RESULTS OF PHASE III RANDOMIZED TRIAL FOR USE OF DOCETAXEL AS A RADIOSENSITIZER IN PATIENTS WITH HEAD AND NECK CANCER, UNSUITABLE FOR CISPLATIN-BASED CHEMORADIATION: JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 27 JANUARY 2023.

# ТАКСЕЛЕН КОНЦЕНТРАТ 40 МГ / МЛ

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ: ДОЦЕТАКСЕЛА ТРИГИДРАТ**

**СОСТАВ: ДОЦЕТАКСЕЛА ТРИГИДРАТ 21,34МГ / 1МЛ, ЭТАНОЛ 96% ДО 1МЛ, ПОЛИСОРБАТ 80.**

## **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

**ТАКСЕЛЕН (ДОЦЕТАКСЕЛ) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАКА, ВКЛЮЧАЯ: РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ:**

**МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ИЛИ МЕТАСТАТИЧЕСКИЙ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, КОГДА ДРУГИЕ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ОКАЗАЛИСЬ НЕЭФФЕКТИВНЫМИ.**

**АДЬЮВАНТНАЯ ТЕРАПИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ В СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ.**

**РАК ЛЕГКОГО: МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ИЛИ МЕТАСТАТИЧЕСКИЙ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК ЛЕГКОГО В СЛУЧАЯХ, КОГДА СТАНДАРТНАЯ ТЕРАПИЯ НЕ ДАЛА РЕЗУЛЬТАТОВ.**

**РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: МЕТАСТАТИЧЕСКИЙ КАСТРАЦИОННО-РЕЗИСТЕНТНЫЙ РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В СОЧЕТАНИИ С ПРЕДНИЗОНОМ ИЛИ ПРЕДНИЗОЛОНОМ.**

**РАК ЖЕЛУДКА: МЕТАСТАТИЧЕСКИЙ РАК ЖЕЛУДКА, ВКЛЮЧАЯ АДЕНОКАРЦИНОМУ, В СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ.**

**РАК ГОЛОВЫ И ШЕИ: МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК ГОЛОВЫ И ШЕИ В СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ И/ИЛИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИЕЙ.**

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

**ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ДОЦЕТАКСЕЛУ В АНАМНЕЗЕ;  
НЕЙТРОПЕНИЯ МЕНЕЕ 1500 /МКЛ; БЕРЕМЕННОСТЬ, ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ; ВЫРАЖЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ;  
ДЕТСКИЙ И ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ ДО 18 ЛЕТ.**

**ЛЕЧЕНИЕ ДОЦЕТАКСЕЛОМ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧА, ИМЕЮЩЕГО ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ХИМИОТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СТАЦИОНАРА.**

## **С ОСТОРОЖНОСТЬЮ: ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПРИМЕНЕНИИ**

**С СИЛЬНЫМИ ИНГИБИТОРАМИ ИЗОФЕРМЕНТА СУРЗА4 (НАПРИМЕР, КЕТОКОНАЗОЛОМ, ИНТРАКОНАЗОЛОМ, КЛАРИТРОМИЦИНОМ, ИНДИНАВИРОМ, НЕФАЗОДОНОМ, НЕЛФИНАВИРОМ, РИТОНАВИРОМ, САКВИНАВИРОМ, ТЕЛИТРОМИЦИНОМ, ВОРИКОНАЗОЛОМ); ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТОВ, ИНДУЦИРУЮЩИМИ ИЛИ ИНГИБИРУЮЩИМИ ИЗОФЕРМЕНТЫ СУРЗА, ИЛИ МЕТАБОЛИЗИРУЮЩИМИСЯ С ПОМОЩЬЮ ИЗОФЕРМЕНТОВ СУРЗА.**

**ДОЦЕТАКСЕЛ НЕ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ СОДЕРЖАНИИ БИЛИРУБИНА БОЛЕЕ ВГН В СОЧЕТАНИИ С АКТИВНОСТЬЮ ПЕЧЕНОЧНЫХ ТРАНСАМИНАЗ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ ВГН В 1.5 РАЗА, И ЩФ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ ВГН В 2.5 РАЗА.**

**МУЖЧИНАМ И ЖЕНЩИНАМ ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ ДОЦЕТАКСЕЛОМ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ НАДЕЖНЫЕ МЕТОДЫ КОНТРАЦЕПЦИИ.**

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

**В ЗАЩИЩЕННОМ ОТ СВЕТА МЕСТЕ В ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 2 ДО 8 °С  
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.**

## **СРОК ГОДНОСТИ:**

**3 ГОДА.**

**НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИЮ СРОКА ГОДНОСТИ.**

## **УСЛОВИЯ ОТПУСКА:**

**ОТПУСКАЕТСЯ ПО РЕЦЕПТУ.**



АО «Фармасинтез», Россия.

Юридический адрес: Россия, 664007, г. Иркутск, Красногвардейская, д.23, оф. 3. Адрес производственной площадки: Россия, 664040, г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, д. 184.

Организация, принимающая претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан АО «Фармасинтез», 100001, г. Ташкент, ул. Истикбол, 34. Тел.: +998 71 205 82 77

Только для распространения среди специалистов здравоохранения на профессиональных медицинских и фармацевтических мероприятиях. Подробная информация содержится в полной инструкции препарата.