

ЭТОРЕЛЕКС®

ЭТОРИКОКСИБ

Гибкое устранение боли и воспаления

28

Действует быстро
в течение
28 минут

24

Действует
длительно до
24 часов



Низкий риск
побочных эффектов
со стороны ЖКТ



Для терапии
острых и
хронических болей



Эффективность,
сопоставимая с
другими НПВП



Коррекция дозы для
пожилого возраста
не требуется

28 таблеток, покрытые пленочной оболочкой

ЭТОРЕЛЕКС®
ЭТОРИКОКСИБ



 30 Мг

 60 Мг

 90 Мг

 120 Мг

1. РУ DV/X 08601/02/21

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ЭТОРЕЛЕКС

3. ЭТОРИКОКСИБ НОВЫЙ СЕЛЕКТИВНЫЙ ИНГИБИТОР ЦИКЛООКСИГЕНАЗЫ 2. СОВРЕМЕННАЯ РЕВМАТОЛОГИЯ №2 09. А.Е. КАРАТЕЕВ. Г. МОСКВА

ЭТОРЕЛЕКС®

МНН: ЭТОРИКОКСИБ

Состав 1 таблетки: Эторикоксиб 30/60/90/120мг

Вспомогательные вещества: гипромеллоза Е15 - 1 мг, кальция гидрофосфата дигидрат - 30 мг, кроскармеллоза натрия - 2 мг, кремния диоксид коллоидный - 0.5 мг, натрия стеарилфумарат - 1.5 мг, целлюлоза микрокристаллическая 200 - 35 мг.

Состав пленочной оболочки: гипромеллоза Е15 - 2.4 мг, коповидон (Коллидон VA64) - 0.32 мг, макрогол 6000 - 0.48 мг, тальк - 0.16 мг, титана диоксид - 0.64 мг.

Эторикоксиб — это нестероидный противовоспалительный препарат, селективный ингибитор циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2). Он используется для лечения боли и воспаления, связанных с остеоартритом, ревматоидным артритом, подагрическим артритом и анкилозирующим спондилитом. Эторикоксиб снижает выработку простагландинов, что помогает уменьшить воспаление, болевые ощущения и оказывает жаропонижающее действие, при этом минимизируя влияние на желудочно-кишечный тракт, характерное для неселективных НПВП.

Показания к применению:

Симптоматическая терапия остеоартроза, ревматоидного артрита, анкилозирующего спондилита; боль и симптомы воспаления, связанные с острым подагрическим артритом; краткосрочное лечение боли, связанной с проведением стоматологической операции.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к эторикоксибу; активная пептическая язва или активное желудочно-кишечное кровотечение; бронхоспазм, острый ринит, полипы в носу, ангионевротический отек, крапивница или реакции аллергического типа; тяжелая печеночная недостаточность; воспалительные заболевания кишечника; застойная сердечная недостаточность пациенты с гипертонической болезнью, у которых АД постоянно находится на уровне выше 140/90 мм рт.ст. и не поддается фармакологическому и клиническому контролю; ИБС, заболевание периферических артерий и/или цереброваскулярное заболевание; беременность и кормление грудью; дети и подростки до 16 лет



АО «Фармасинтез», Россия.

Юридический адрес: Россия, 664007, г. Иркутск, Красногвардейская, д.23, оф. 3. Адрес производственной площадки: Россия, 664040, г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, д. 184.

Организация, принимающая претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан АО «Фармасинтез», 100001. г. Ташкент, ул. Истикбол, 34. Тел.: +998 71 205 82 77

Только для распространения среди специалистов здравоохранения на профессиональных медицинских и фармацевтических мероприятиях. Подробная информация содержится в полной инструкции препарата.