



# ЭЛГРАВИР

## ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК В БОРЬБЕ С ГЕПАТИТОМ В!

### МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Прайминг HBV полимеразы  
Обратная транскрипция негативной нити  
иРНК  
Синтез позитивной нити ДНК HBV

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Хронический Гепатит В у взрослых с:  
– Компенсированным поражением печени и  
наличием вирусной репликации, повышения уровня активности  
сывороточных трансаминаз (аланинаминотрансфераза, АЛТ  
или аспартатаминотрансфераза, АСТ) и гистологических  
признаков воспалительного процесса в печени и/или фиброза  
– декомпенсированным поражением печени.



**ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:**  
ЭЛГРАВИР УСПЕШНО  
СПРАВЛЯЕТСЯ С ГЕПАТИТОМ В,  
БЛОКИРУЯ ВИРУСНУЮ ДНК  
И ПРЕДОТВРАЩАЯ  
ЕГО РАЗМНОЖЕНИЕ



**ДОСТУПНОСТЬ:**  
ЭЛГРАВИР ДОСТУПЕН  
ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ,  
ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ  
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ



**БЕЗОПАСНОСТЬ:**  
ЭЛГРАВИР ИМЕЕТ ХОРОШИЙ  
ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ И  
ХОРОШО ПЕРЕНОСИТСЯ  
ПАЦИЕНТАМИ



**УДОБСТВО ПРИЕМА:**  
ПРЕПАРАТ ПРИНИМАЕТСЯ  
ОДИН РАЗ В ДЕНЬ,  
ЧТО ОБЛЕГЧАЕТ  
СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА

1. РУ 09/Х 06449/07/19

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ЭЛГРАВИР

3. ЭНТЕКАВИР В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В: МНОГОЦЕНТРОВЫЕ

РАНДОМИЗИРОВАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА/Д.Т. АБДУРАХМАНОВ, А.В. ОТРАШЕВСКАЯ, 2014

# ЭЛГРАВИР

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
DV/X 06449/07/19

## МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ: ЭНТЕКАВИР

### СОСТАВ 1 ТАБЛЕТКИ:

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: ЭНТЕКАВИР 0,5МГ / 1МГ

ВОСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА: ЛАКТОЗЫ МОНОГИДРАТ - 54/47МГ/108,94МГ, ЦЕЛЛЮЛОЗА МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ - 90МГ/180МГ,

ГИПРОЛОЗА НИЗКОЗАМЕЩЕННАЯ - 40МГ/80МГ, ПОВИДОН К30 - 5МГ/10МГ, КРОСПОВИДОН 8МГ/16МГ, КРЕМНИЯ ДИОКСИД КОЛЛОИДНЫЙ - 1МГ/2МГ,

МАГНИЯ СТЕАРАТ - 1МГ/2МГ

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

**ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ В У ВЗРОСЛЫХ С:- КОМПЕНСИРОВАННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ И НАЛИЧИЕМ ВИРУСНОЙ РЕПЛИКАЦИИ, ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ АКТИВНОСТИ СЫВОРОТОЧНЫХ ТРАНСАМИНАЗ (АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА, АЛТ ИЛИ АСПАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА, АСТ) И ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПЕЧЕНИ И/ИЛИ ФИБРОЗА; - ДЕКОМПЕНСИРОВАННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ.**

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ЭНТЕКАВИРУ ИЛИ ЛЮБОМУ ДРУГОМУ КОМПОНЕНТУ ПРЕПАРАТА  
ДЕТСКИЙ И ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ ДО 18 ЛЕТ  
РЕДКАЯ НАСЛЕДСТВЕННАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ЛАКТОЗЫ, ДЕФИЦИТ ЛАКТАЗЫ ИЛИ ГЛЮКОЗО-ГАЛАКТОЗНАЯ МАЛЬАБСОРБЦИЯ.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

ТЕРАПИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НАЧАТА ВРАЧОМ, ИМЕЮЩИМ ОПЫТ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В ПРЕПАРАТ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ НАТОЩАК (ТО ЕСТЬ, НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА ПОСЛЕ ЕДЫ И НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 2 ЧАСА ДО СЛЕДУЮЩЕГО ПРИЕМА ПИЩИ).  
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗА ЭНТЕКАВИРА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С КОМПЕНСИРОВАННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ СОСТАВЛЯЕТ 0,5 МГ ОДИН РАЗ В ДЕНЬ.  
РЕЗИСТЕНТНЫМ К ЛАМИВУДИНУ ПАЦИЕНТАМ (ТО ЕСТЬ, ПАЦИЕНТАМ В АНАМНЕЗЕ С ВИРЕМИЕЙ ВИРУСОВ ГЕПАТИТА В, СОХРАНЯЮЩЕЙСЯ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ ЛАМИВУДИНОМ, ИЛИ ПАЦИЕНТАМ С ПОДТВЕРЖДЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ К ЛАМИВУДИНУ) РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧАТЬ 1 МГ ЭНТЕКАВИРА ОДИН РАЗ В ДЕНЬ. ПАЦИЕНТАМ С ДЕКОМПЕНСИРОВАННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧАТЬ 1 МГ ЭНТЕКАВИРА ОДИН РАЗ В ДЕНЬ.

### ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

СО СТОРОНЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: РЕДКО - ДИАРЕЯ, ДИСПЕПСИЯ, ТОШНОТА, РВОТА; ВОЗМОЖНО - ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ ТРАНСАМИНАЗ.

СО СТОРОНЫ ЦНС: ЧАСТО - ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, УТОМЛЯЕМОСТЬ; РЕДКО - БЕССОННИЦА, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, СОНЛИВОСТЬ.

СО СТОРОНЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ: ВОЗМОЖНО - АНАФИЛАКТОИДНАЯ РЕАКЦИЯ.

### ДРУГИЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

ОБОСТРЕНИЕ ГЕПАТИТА ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ.

ОБОСТРЕНИЕ ГЕПАТИТА ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

В ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 25 ГРАДУСОВ.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

### СРОК ГОДНОСТИ:

2 ГОДА.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИЮ СРОКА ГОДНОСТИ.

### УСЛОВИЯ ОТПУСКА:

ОТПУСКАЕТСЯ ПО РЕЦЕПТУ.



АО «Фармасинтез», Россия.

Юридический адрес: Россия, 664007, г. Иркутск, Красногвардейская, д.23, оф. 3. Адрес производственной площадки: Россия, 664040, г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, д. 184.

Организация, принимающая претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан: АО «Фармасинтез», 100001, г. Ташкент, ул. Истикбол, 34. Тел.: +998 71 205 82 77

Только для распространения среди специалистов здравоохранения на профессиональных медицинских и фармацевтических мероприятиях. Подробная информация содержится в полной инструкции препарата.