

NETLOOD CITY POLICE DEPARTMENT — FORENSIC CHEMISTRY DIVISION

รายงานผลการวิเคราะห์ทางพิษวิทยาด้วยเทคนิค Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry

ข้อมูลวัตถุพยานและการจัดเก็บตัวอย่าง

- รหัสวัตถุพยาน: B-1
- ตัวอย่างวัตถุพยาน: เครื่องดื่มทดลองสูตร "สิงสุ่อาชา" ขวดที่ผู้ตายดื่ม
- สภาวะตัวอย่างก่อนวิเคราะห์:
 - ปริมาตรตั้งต้น: 350 มล.
 - ปริมาตรคงเหลือในขวด: 85 มล.
 - วิธีเตรียมตัวอย่าง: เขย่าผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนสุ่มตัวอย่างตรวจจำนวน 3 ซ้ำ

รายงานผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

รายการตรวจ / วัตถุพยาน	สารเคมีที่ตรวจพบ	ความเข้มข้นที่วัดได้
ขวดหมายเลข 7	Glipizide	114 mg/L
ขวดหมายเลข 1-6 และ 8	ไม่พบสารกลุ่ม Sulfonylureas	< 0.01 mg/L
ขวดหมายเลข 1-8	น้ำตาล / คาเฟอีน	ตามสูตรมาตรฐานปกติ

บันทึกทางกายภาพของผู้วิเคราะห์

- ลักษณะทางกายภาพของตัวอย่างขวดหมายเลข 7:
 - ของเหลวมีลักษณะ ขุ่นเล็กน้อย แตกต่างจากขวดอื่นในล็อต
 - เมื่อตั้งทิ้งไว้พบ ตะกอนละเอียดตกอยู่ที่บริเวณก้นขวด

การคำนวณปริมาณสารพิษที่ได้รับและการประเมินทางนิติพิษวิทยา

คำนวณปริมาณ Glipizide ที่ผู้ตายได้รับ :

- ปริมาตรที่ดื่มไป: 350 มล. - 85 มล.
- ปริมาณ Glipizide ที่ได้รับ: 114 mg/L × 0.265 L

การเปรียบเทียบกับขนาดด้วยยาทางการแพทย์:

- ขนาดยา Glipizide มาตรฐานทางรักษา: 2.5 – 5.0 มก./วัน (ขนาดยาปรับสูงสุดไม่เกิน 20.0 มก./วัน)

- ปริมาณที่ผู้ตายได้รับ 30.21 มก.: เทียบเท่ากับการรับประทานยา Glipizide ขนาด 5 มก. มากถึง 6 เม็ดเต็ม ในครั้งเดียว
- การประเมินทางนิติเวช : ปริมาณ 30.21 มก. เป็นขนาดที่สูงกว่าขนาดยารักษาปกติอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดการเร่งหลังอินซูลินจากตับอ่อนอย่างรุนแรงและฉับพลัน อันนำไปสู่ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำขั้นวิกฤต

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นหลักฐาน/พยานเอกสารประกอบการเล่นเกมสืบสวน TRPG NetLood City PD เท่านั้น