

Contents

1	Section 6.1	1
1.1	6.1.1	1
1.2	6.1.2	2
1.3	6.1.13	4

1 Section 6.1

1.1 6.1.1

Find the (real) eigenvalues and associated eigenvectors of the larger matrix \mathbf{A} . Find a basis of each eigenspace of dimension 2 or larger.

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & -1 \\ 2 & 1 - \lambda \end{vmatrix}$$

$$\det(\mathbf{A}) = (4 - \lambda)(1 - \lambda) - (-1)(2)$$

$$\det(\mathbf{A}) = \lambda^2 - 5\lambda + 2 = (\lambda - 2)(\lambda - 3)$$

$$\lambda = 2, 3$$

$$\lambda = 2$$

$$\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I} = \begin{bmatrix} 4 - \lambda & -1 \\ 2 & 1 - \lambda \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{v} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$2x - y = 0$$

$$x = \frac{1}{2}y$$

$$2\left(\frac{1}{2}y\right) - y = 0$$

$$0 = 0$$

$$\lambda = 2 \rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}y \\ y \end{bmatrix} = y \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda = 3$$

$$\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{v} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x = y$$

$$2x = 2y$$

$$2(y) = 2y$$

$$0 = 0$$

$$\lambda = 3 \rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ y \end{bmatrix} = y \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

1.2 6.1.2

Find the (real) eigenvalues and associated eigenvectors of the given matrix \mathbf{A} . Find a basis of each eigenspace of dimension 2 or larger.

$$\begin{bmatrix} 6 & -7 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$$

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = \begin{vmatrix} 6 - \lambda & -7 \\ 4 & -5 - \lambda \end{vmatrix}$$

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = (6 - \lambda)(-5 - \lambda) - (-7)(4)$$

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1)$$

$$\lambda_{1,2} = 2, -1$$

$$\lambda_1 = 2$$

$$[\mathbf{A} - \lambda_1] \mathbf{x} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 6 - 2 & -7 \\ 4 & -5 - 2 \end{bmatrix} \mathbf{x} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 4 & -7 \\ 4 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0$$

$$(4)x_1 + (-7)x_2 = 0$$

$$(4)x_1 + (-7)x_2 = 0$$

$$(4)x_1 = (7)x_2$$

$$x_1 = \left(\frac{7}{4}\right)x_2$$

$$\begin{aligned}
 (4)x_1 + (-7)x_2 &= 0 \\
 (4)\left(\frac{7}{4}\right)x_2 + (-7)x_2 &= 0 \\
 0 &= 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x} &= \begin{bmatrix} \left(\frac{7}{4}\right)x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} \\
 \mathbf{x} &= x_2 \begin{bmatrix} \frac{7}{4} \\ 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \lambda_2 &= -1 \\
 [\mathbf{A} - \lambda_2] \mathbf{x} &= 0 \\
 \begin{bmatrix} 6 - (-1) & -7 \\ 4 & -5 - (-1) \end{bmatrix} \mathbf{x} &= 0 \\
 \begin{bmatrix} 7 & -7 \\ 4 & -4 \end{bmatrix} \mathbf{x} &= 0 \\
 \begin{bmatrix} 7 & -7 \\ 4 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} &= 0 \\
 (7)x_1 + (-7)x_2 &= 0 \\
 (4)x_1 + (-4)x_2 &= 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (7)x_1 + (-7)x_2 &= 0 \\
 x_1 &= x_2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4)x_1 + (-4)x_2 &= 0 \\
 x_1 &= x_2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x} &= \begin{bmatrix} x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} \\
 \mathbf{x} &= x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Eigenvalues: $\lambda_{1,2} = 2, -1$

Eigenvectors: $\mathbf{x}_{1,2} = \begin{bmatrix} \frac{7}{4} \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

1.3 6.1.13

Find the (real) eigenvalues and associated eigenvectors of the larger matrix \mathbf{A} . Find a basis of each eigenspace of dimension 2 or larger.

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 6 & -2 & -2 \\ -3 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

$$|\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}| = \begin{bmatrix} 3 - \lambda & 0 & 0 \\ 7 & -2 - \lambda & -2 \\ -3 & 4 & 4 - \lambda \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = (3 - \lambda)((-2 - \lambda)(4 - \lambda) - (-2)(4)) - 0 - 0$$

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = -\lambda(\lambda - 3)(\lambda - 2)$$

$$\lambda_{1,2,3} = 0, 3, 2$$