

水稻核心病害防治

水稻稻瘟病识别与防治

稻瘟病是水稻毁灭性病害，全生育期均可发生，分为苗瘟、叶瘟、穗颈瘟三种主要类型。苗瘟表现为幼苗基部变黑褐色，上部黄褐色枯死；叶瘟典型症状为梭形病斑，中央灰白色、边缘褐色，外围有黄色晕圈；穗颈瘟危害最重，穗颈变黑褐色，导致穗子枯死、白穗。病菌以菌丝体在病稻草和病谷上越冬，借风雨传播，高温高湿（20-30℃，相对湿度 90%以上）利于发病。

防治方法：1. 农业防治：选用抗病品种，处理病稻草，合理密植，平衡施肥，避免偏施氮肥；2. 药剂防治：叶瘟在发病初期喷施 20%三环唑可湿性粉剂 1000 倍液或 40%稻瘟灵乳油 1000 倍液；穗颈瘟在破口期和齐穗期各喷一次药，药剂同上，每亩喷药液 50-60 公斤。

水稻纹枯病识别与防治

水稻纹枯病俗称"花脚秆"，主要危害叶鞘和叶片，严重时危害茎秆和穗部。发病初期在近水面的叶鞘上产生暗绿色水渍状小斑点，逐渐扩大成云纹状大斑，中央灰白色，边缘暗褐色。病菌以菌核在土壤中越冬，次年灌水后菌核漂浮在水面，附着在稻株上萌发侵染。高温高湿（25-32℃，相对湿度 90%以上）、氮肥过多、种植过密利于发病。

防治方法：1. 农业防治：合理密植，浅水勤灌，适时晒田，避免偏施氮肥；2. 药剂防治：在分蘖末期至孕穗期，当病丛率达到 10%-15%时喷施 5%井冈霉素水剂 1000 倍液或 20%噻呋酰胺悬浮剂 2000 倍液，重点喷洒稻株中下部，每隔 7-10 天喷一次，连喷 2-3 次。

水稻稻曲病识别与防治

水稻稻曲病俗称"丰收病"，主要危害稻穗，在谷粒上形成黄色至墨绿色的球状菌核。病菌以菌核在土壤中或附在种子上越冬，次年水稻抽穗扬花期，菌核萌发产生子囊孢子，借风雨传播侵染花器和幼颖。抽穗扬花期遇阴雨天气、氮肥过多、穗大粒多的品种发病重。

防治方法：1. 农业防治：选用抗病品种，种子消毒，合理施肥，避免偏施氮肥；2. 药剂防治：在水稻破口前 5-7 天喷施 30%苯醚甲环唑·丙环唑乳油 2000 倍液或 43%戊唑醇悬浮剂 3000 倍液，齐穗期再补喷一次，可有效控制病害发生。

水稻核心虫害防治

水稻二化螟识别与防治

水稻二化螟俗称"钻心虫"，是水稻主要蛀茎害虫。幼虫蛀食水稻茎秆，分蘖期造成枯心苗，孕穗期造成枯孕穗，抽穗期造成白穗，成熟期造成虫伤株。成虫为黄褐色蛾子，前翅近长方形，外缘有 7 个小黑点；幼虫淡褐色，背部有 5 条暗褐色纵线。一年发生 2-4 代，以幼虫在稻桩、稻草中越冬。

防治方法：1. 农业防治：处理稻桩和稻草，深水灭蛹，合理安排茬口；2. 物理防治：安装频振式杀虫灯诱杀成虫；3. 生物防治：释放赤眼蜂，每亩放蜂 1.5-2 万头；4. 药剂防治：在卵孵化高峰期至低龄幼虫期喷施 20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂 3000 倍液或 5%甲维盐乳油 1500 倍液，重点喷洒稻株基部。

水稻稻飞虱识别与防治

水稻稻飞虱主要有褐飞虱、白背飞虱和灰飞虱三种，以成虫和若虫群集在稻株基部刺吸汁液，导致稻株变黄、倒伏，俗称"冒穿"。褐飞虱成虫褐色，有长翅型和短翅型；白背飞虱成虫头顶突出，雄虫背面灰白色。稻飞虱具有迁飞性，每年从南方迁飞而来，高温高湿（25-30℃，相对湿度 80%

以上) 利于繁殖危害。

防治方法: 1. 农业防治: 合理密植, 浅水勤灌, 避免偏施氮肥; 2. 物理防治: 安装频振式杀虫灯诱杀成虫; 3. 生物防治: 保护利用蜘蛛、青蛙等天敌; 4. 药剂防治: 在虫口密度达到每丛 10-15 头时喷施 25%噻嗪酮可湿性粉剂 1000 倍液或 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液, 重点喷洒稻株基部, 田间保持浅水层。

水稻纵卷叶螟识别与防治

水稻纵卷叶螟俗称"卷叶虫", 以幼虫将稻叶纵卷成筒, 躲在里面啃食叶肉, 仅留表皮, 形成白色条斑。成虫为黄褐色蛾子, 前翅有两条黑色横纹, 中间有一条白色横纹; 幼虫黄绿色, 头部褐色。一年发生 4-6 代, 具有迁飞性, 幼虫共 5 龄, 3 龄后转株危害。

防治方法: 1. 农业防治: 合理施肥, 避免水稻后期贪青; 2. 物理防治: 安装频振式杀虫灯诱杀成虫; 3. 生物防治: 释放赤眼蜂, 喷施苏云金杆菌 (Bt) 制剂; 4. 药剂防治: 在卵孵化高峰期至 2 龄幼虫期喷施 20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂 3000 倍液或 1.8%阿维菌素乳油 2000 倍液, 每亩喷药液 50-60 公斤。

小麦核心病害防治

小麦锈病识别与防治

小麦锈病分为条锈病、叶锈病和秆锈病三种, 俗称"黄疸病"。条锈病病斑鲜黄色, 呈虚线状排列, 主要危害叶片; 叶锈病病斑红褐色, 圆形, 散生在叶片上; 秆锈病病斑深褐色, 长椭圆形, 主要危害茎秆和叶鞘。病菌以夏孢子在小麦上越冬越夏, 借气流传播, 具有爆发性和流行性。

防治方法: 1. 农业防治: 选用抗病品种, 合理施肥, 适时播种; 2. 药剂防治: 在发病初期喷施 20%三唑酮乳油 1500 倍液或 12.5%烯唑醇可湿性粉剂 2000 倍液, 每隔 7-10 天喷一次, 连喷 2-3 次。对于条锈病流行区, 应在拔节期至孕穗期进行全面喷药预防。

小麦白粉病识别与防治

小麦白粉病主要危害叶片, 严重时危害叶鞘、茎秆和穗部。发病初期在叶片上产生白色粉状霉点, 逐渐扩大成圆形或椭圆形霉斑, 后期霉斑变为灰白色至浅褐色, 上面散生黑色小点。病菌以闭囊壳在病残体上越冬, 次年春季释放子囊孢子侵染小麦。温暖潮湿 (15-20℃, 相对湿度 70%-80%)、氮肥过多、种植过密利于发病。

防治方法: 1. 农业防治: 选用抗病品种, 合理密植, 平衡施肥, 避免偏施氮肥; 2. 药剂防治: 在发病初期喷施 20%三唑酮乳油 1500 倍液或 40%腈菌唑乳油 3000 倍液, 每亩喷药液 40-50 公斤, 每隔 7-10 天喷一次, 连喷 2 次。

小麦赤霉病识别与防治

小麦赤霉病俗称"红头瘡", 主要危害穗部, 导致穗腐, 产生粉红色霉层, 籽粒皱缩干瘪, 含有毒素, 影响产量和品质。病菌以菌丝体在病残体上越冬, 次年小麦扬花期释放子囊孢子, 借风雨传播侵染花器。扬花期遇阴雨天气、气温 15-25℃利于发病。

防治方法: 1. 农业防治: 选用抗病品种, 处理病残体, 合理排灌; 2. 药剂防治: 在小麦扬花初期 (扬花率 10%-20%) 喷施 50%多菌灵可湿性粉剂 1000 倍液或 25%氰烯菌酯悬浮剂 1500 倍液, 若扬花期遇阴雨天气, 应在雨前喷药, 雨后补喷一次, 重点喷洒穗部。

小麦核心虫害防治

小麦蚜虫识别与防治

小麦蚜虫俗称"腻虫",主要有麦长管蚜、麦二叉蚜和禾谷缢管蚜三种,以成虫和若虫刺吸小麦叶片、茎秆和穗部的汁液,导致叶片发黄、籽粒不饱满,还能传播小麦黄矮病。麦长管蚜黄绿色,触角长于身体;麦二叉蚜淡绿色,触角短于身体。一年发生 10-20 代,以卵在杂草上越冬。

防治方法: 1. 农业防治: 清除田间杂草,合理施肥; 2. 生物防治: 保护利用瓢虫、草蛉等天敌; 3. 药剂防治: 当百株蚜量达到 500 头以上时喷施 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液或 2.5%溴氰菊酯乳油 2000 倍液,每亩喷药液 30-40 公斤。

小麦红蜘蛛识别与防治

小麦红蜘蛛主要有麦圆蜘蛛和麦长腿蜘蛛两种,以成虫和若虫刺吸小麦叶片汁液,导致叶片出现白色小点,逐渐变黄干枯。麦圆蜘蛛体圆形,深红色,足短;麦长腿蜘蛛体纺锤形,黑褐色,足长。一年发生 3-4 代,以卵或成虫在土缝中越冬,春季气温回升后开始活动危害。

防治方法: 1. 农业防治: 深耕灭虫,合理浇水,清除田间杂草; 2. 药剂防治: 在虫口密度达到每尺行长 200 头以上时喷施 1.8%阿维菌素乳油 2000 倍液或 20%哒螨灵乳油 1500 倍液,重点喷洒叶片背面,每隔 7-10 天喷一次,连喷 2 次。

小麦地下害虫识别与防治

小麦地下害虫主要有蛴螬、蝼蛄和金针虫,以幼虫咬食小麦种子、幼根和茎基部,造成缺苗断垄。蛴螬是金龟子的幼虫,乳白色,弯曲呈"C"形;蝼蛄俗称"土狗子",前足为开掘足;金针虫是叩头虫的幼虫,黄褐色,体细长坚硬。地下害虫主要在土壤中活动,春秋两季危害严重。

防治方法: 1. 农业防治: 深耕细耙,合理轮作,施用腐熟的有机肥; 2. 物理防治: 安装黑光灯诱杀成虫; 3. 药剂防治: 播种前用 50%辛硫磷乳油按种子重量的 0.2%拌种;或每亩用 3%辛硫磷颗粒剂 2-3 公斤,拌细土 20-30 公斤,撒施在播种沟内。

玉米核心病害防治

玉米大斑病与小斑病识别与防治

玉米大斑病和小斑病主要危害叶片,严重时危害叶鞘和苞叶。大斑病病斑大,呈长梭形,灰褐色,边缘暗褐色,长可达 10-20 厘米;小斑病病斑小,呈椭圆形或近圆形,黄褐色,边缘紫褐色,长 1-2 厘米。病菌以菌丝体在病残体上越冬,次年产生分生孢子,借风雨传播。高温高湿(25-30℃,相对湿度 90%以上)利于发病。

防治方法: 1. 农业防治: 选用抗病品种,合理密植,平衡施肥,及时清除病残体; 2. 药剂防治: 在发病初期喷施 50%多菌灵可湿性粉剂 1000 倍液或 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 1000 倍液,每隔 7-10 天喷一次,连喷 2-3 次。

玉米丝黑穗病识别与防治

玉米丝黑穗病俗称"乌米",主要危害果穗和雄穗,导致整个果穗变成一个黑粉包,里面充满黑色粉末。病菌以厚垣孢子在土壤中或附在种子上越冬,次年玉米播种后萌发,从幼芽鞘侵入,系统侵染。土壤带菌是主要初侵染源,连作地、播种过早、土壤温度低利于发病。

防治方法: 1. 农业防治: 选用抗病品种,实行 3 年以上轮作,及时拔除病株; 2. 药剂防治: 播种前用 15%三唑酮可湿性粉剂按种子重量的 0.4%拌种,或用 2%戊唑醇拌种剂按种子重量的 0.2%

拌种，可有效防治病害。

玉米茎腐病识别与防治

玉米茎腐病俗称“青枯病”，是一种土传病害，主要危害玉米茎基部和根系，导致植株突然青枯死亡。发病初期叶片突然失水萎蔫，呈青灰色，茎基部变软，内部空松，易倒伏，根系腐烂。病菌以菌丝体和厚垣孢子在病残体和土壤中越冬，玉米灌浆期至成熟期发病重，高温高湿、雨后暴晴利于发病。

防治方法：1. 农业防治：选用抗病品种，合理轮作，增施钾肥，及时排除田间积水；2. 药剂防治：在发病初期喷施 50%多菌灵可湿性粉剂 1000 倍液或 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 1000 倍液，重点喷洒茎基部，每隔 7 天喷一次，连喷 2 次。

玉米核心虫害防治

玉米螟识别与防治

玉米螟俗称“钻心虫”，是玉米主要害虫，以幼虫蛀食玉米茎秆、叶片和果穗。心叶期幼虫啃食心叶，展开后形成排孔；抽穗后蛀食茎秆，导致茎秆折断；穗期蛀食果穗，影响籽粒发育。成虫为黄褐色蛾子，前翅有两条褐色横纹；幼虫淡褐色，背部有 3 条纵线。一年发生 2-4 代，以老熟幼虫在玉米秸秆、穗轴中越冬。

防治方法：1. 农业防治：处理玉米秸秆和穗轴，合理轮作；2. 物理防治：安装频振式杀虫灯诱杀成虫；3. 生物防治：在玉米心叶末期释放赤眼蜂，每亩放蜂 1.5-2 万头；4. 药剂防治：在玉米心叶末期，每亩用 1%辛硫磷颗粒剂 1-1.5 公斤，撒入心叶内；穗期可用 20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂 3000 倍液喷洒果穗。

玉米蚜虫识别与防治

玉米蚜虫主要危害玉米心叶、雄穗和雌穗，以成虫和若虫刺吸汁液，导致叶片发黄、雄穗发育不良、籽粒不饱满，还能传播玉米矮花叶病。玉米蚜虫黄绿色，有翅型前翅透明。一年发生 10-20 代，夏季高温干旱利于繁殖危害。

防治方法：1. 农业防治：清除田间杂草，合理施肥；2. 生物防治：保护利用瓢虫、草蛉等天敌；3. 药剂防治：当百株蚜量达到 1000 头以上时喷施 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液或 2.5%溴氰菊酯乳油 2000 倍液，重点喷洒心叶和雄穗。

玉米地下害虫识别与防治

玉米地下害虫主要有地老虎、蛴螬和金针虫，以幼虫咬食玉米种子、幼根和茎基部，造成缺苗断垄。地老虎俗称“地蚕”，幼虫灰褐色，夜间活动，将幼苗从茎基部咬断；蛴螬和金针虫的危害特征与小麦地下害虫相同。

防治方法：1. 农业防治：深耕细耙，合理轮作，施用腐熟的有机肥；2. 物理防治：安装黑光灯诱杀成虫，用糖醋液诱杀地老虎成虫；3. 药剂防治：播种前用 50%辛硫磷乳油按种子重量的 0.2% 拌种；或每亩用 3%辛硫磷颗粒剂 2-3 公斤，拌细土撒施在播种沟内；地老虎危害期可在傍晚喷施 2.5%溴氰菊酯乳油 2000 倍液于地面。

大豆核心病害防治

大豆根腐病识别与防治

大豆根腐病是一种土传病害，主要危害大豆根系和茎基部。发病初期根系出现褐色斑点，逐渐扩大并腐烂，茎基部出现褐色凹陷病斑，严重时植株枯萎死亡。病菌以菌丝体和厚垣孢子在病残体和土壤中越冬，连作地、土壤黏重、排水不良利于发病。

防治方法：1. 农业防治：实行 3 年以上轮作，选用抗病品种，深耕细耙，及时排除田间积水；2. 药剂防治：播种前用 50%多菌灵可湿性粉剂按种子重量的 0.3%拌种，或用 2.5%咯菌腈悬浮种衣剂包衣；发病初期喷施 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 1000 倍液，重点喷洒茎基部。

大豆霜霉病识别与防治

大豆霜霉病主要危害叶片，也可危害豆荚和籽粒。发病初期叶片上出现黄绿色不规则斑点，逐渐扩大成黄褐色多角形病斑，叶背面产生灰白色霉层。病菌以卵孢子在病残体和种子上越冬，次年春季萌发产生孢子囊，借风雨传播。低温高湿（15-20℃，相对湿度 80%以上）利于发病。

防治方法：1. 农业防治：选用抗病品种，实行轮作，及时清除病残体；2. 药剂防治：在发病初期喷施 75%百菌清可湿性粉剂 600 倍液或 25%甲霜灵可湿性粉剂 800 倍液，每隔 7-10 天喷一次，连喷 2-3 次。

大豆灰斑病识别与防治

大豆灰斑病俗称"斑点病"，主要危害叶片，也可危害茎、荚和籽粒。发病初期叶片上出现红褐色小斑点，逐渐扩大成圆形或椭圆形病斑，中央灰色，边缘褐色。病菌以菌丝体在病残体和种子上越冬，次年产生分生孢子，借风雨传播。高温高湿利于发病。

防治方法：1. 农业防治：选用抗病品种，实行轮作，及时清除病残体；2. 药剂防治：在发病初期喷施 50%多菌灵可湿性粉剂 1000 倍液或 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 1000 倍液，每隔 7-10 天喷一次，连喷 2 次。

大豆核心虫害防治

大豆食心虫识别与防治

大豆食心虫俗称"豆蛀虫"，是大豆主要害虫，以幼虫蛀食豆荚，咬食豆粒，造成豆粒残缺，影响产量和品质。成虫为暗褐色蛾子，前翅有一条紫色横纹；幼虫鲜红色，头部褐色。一年发生 1 代，以老熟幼虫在土壤中越冬，次年 8 月上旬羽化产卵，8 月中下旬幼虫孵化蛀荚危害。

防治方法：1. 农业防治：选用抗虫品种，实行轮作，及时耕翻土地；2. 物理防治：安装频振式杀虫灯诱杀成虫；3. 生物防治：在成虫盛发期释放赤眼蜂，每亩放蜂 2-3 万头；4. 药剂防治：在成虫盛发期至幼虫孵化初期喷施 20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂 3000 倍液或 2.5%溴氰菊酯乳油 2000 倍液，重点喷洒豆荚。

大豆蚜虫识别与防治

大豆蚜虫俗称"蜜虫"，主要危害大豆嫩梢和叶片，以成虫和若虫刺吸汁液，导致叶片卷曲、植株矮小，还能传播大豆花叶病毒病。大豆蚜虫黄绿色，有翅型前翅透明。一年发生 10-20 代，夏季高温干旱利于繁殖危害。

防治方法：1. 农业防治：清除田间杂草，合理施肥；2. 生物防治：保护利用瓢虫、草蛉等天敌；3. 药剂防治：当百株蚜量达到 500 头以上时喷施 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液或 1.8%阿维菌素乳油 2000 倍液，每亩喷药液 30-40 公斤。

大豆豆荚螟识别与防治

大豆豆荚螟以幼虫蛀食豆荚和豆粒，造成豆粒残缺，豆荚内充满虫粪，影响产量和品质。成虫为灰褐色蛾子，前翅有一条白色横纹；幼虫淡绿色，背部有 5 条纵线。一年发生 3-4 代，以老熟幼虫在土壤中越冬，成虫产卵于豆荚上，幼虫孵化后蛀入豆荚危害。

防治方法：1. 农业防治：选用早熟品种，实行轮作，及时清除田间落花落荚；2. 物理防治：安装频振式杀虫灯诱杀成虫；3. 药剂防治：在成虫盛发期至幼虫孵化初期喷施 20% 氯虫苯甲酰胺悬浮剂 3000 倍液或 5% 甲维盐乳油 1500 倍液，重点喷洒豆荚。

马铃薯核心病害防治

马铃薯晚疫病识别与防治

马铃薯晚疫病是毁灭性病害，主要危害叶片、茎秆和块茎。叶片发病初期出现暗绿色水渍状斑点，逐渐扩大成褐色大斑，边缘不清晰，湿度大时叶背面产生白色霉层；茎秆发病出现褐色条斑；块茎发病出现褐色凹陷病斑，内部腐烂。病菌以菌丝体在种薯中越冬，次年产生孢子囊，借风雨传播。低温高湿（18-22℃，相对湿度 90% 以上）利于发病。

防治方法：1. 农业防治：选用无病种薯，实行轮作，合理密植，及时排除田间积水；2. 药剂防治：在发病初期喷施 72% 霜脲氰·锰锌可湿性粉剂 600 倍液或 68% 精甲霜灵·锰锌水分散粒剂 800 倍液，每隔 7-10 天喷一次，连喷 3-4 次，发现中心病株及时拔除并喷药封锁。

马铃薯早疫病识别与防治

马铃薯早疫病主要危害叶片，也可危害茎秆和块茎。发病初期叶片上出现褐色小斑点，逐渐扩大成圆形或近圆形病斑，有明显的同心轮纹，边缘有黄色晕圈。病菌以菌丝体和分生孢子在病残体和种薯上越冬，次年产生分生孢子，借风雨传播。高温高湿利于发病。

防治方法：1. 农业防治：选用抗病品种，实行轮作，增施钾肥，及时清除病残体；2. 药剂防治：在发病初期喷施 75% 百菌清可湿性粉剂 600 倍液或 50% 多菌灵可湿性粉剂 1000 倍液，每隔 7-10 天喷一次，连喷 2-3 次。

马铃薯环腐病识别与防治

马铃薯环腐病是一种细菌性维管束病害，主要危害块茎和植株。植株发病表现为萎蔫，叶片变黄干枯；块茎发病切开后可见维管束呈环状褐色腐烂，用手挤压有乳白色菌脓溢出。病菌主要在种薯中越冬，通过切刀传播，播种后侵染幼苗。

防治方法：1. 农业防治：选用无病种薯，实行整薯播种，切刀消毒（用 75% 酒精或 0.1% 高锰酸钾溶液浸泡）；2. 药剂防治：播种前用农用链霉素 1000 倍液浸种 30 分钟；发病初期喷施农用链霉素 1000 倍液或 3% 中生菌素可湿性粉剂 800 倍液。

马铃薯核心虫害防治

马铃薯蚜虫识别与防治

马铃薯蚜虫主要危害马铃薯嫩梢和叶片，以成虫和若虫刺吸汁液，导致叶片卷曲、植株矮小，还能传播马铃薯病毒病。马铃薯蚜虫主要是桃蚜，黄绿色或红褐色，有翅型前翅透明。一年发生 10-20 代，以卵在桃树上越冬，春季迁飞到马铃薯上危害。

防治方法：1. 农业防治：清除田间杂草，合理施肥；2. 物理防治：安装黄板诱杀有翅蚜；3. 生

物防治：保护利用瓢虫、草蛉等天敌；4. 药剂防治：当百株蚜量达到 500 头以上时喷施 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液或 2.5%溴氰菊酯乳油 2000 倍液。

马铃薯二十八星瓢虫识别与防治

马铃薯二十八星瓢虫俗称"花大姐"，以成虫和幼虫啃食马铃薯叶片，仅留叶脉和上表皮，形成网状纹路，严重时叶片干枯。成虫半球形，黄褐色，鞘翅上有 28 个黑色斑点；幼虫黄色，体背有黑色刺突。一年发生 2-3 代，以成虫在土缝、杂草中越冬。

防治方法：1. 农业防治：清除田间杂草，人工捕捉成虫和卵块；2. 药剂防治：在幼虫孵化初期至 2 龄幼虫期喷施 2.5%溴氰菊酯乳油 2000 倍液或 5%甲维盐乳油 1500 倍液，每亩喷药液 40-50 公斤。

马铃薯地下害虫识别与防治

马铃薯地下害虫主要有蛴螬、蝼蛄和金针虫，以幼虫咬食马铃薯块茎，造成孔洞，影响产量和品质，还易导致病菌侵染引起腐烂。

防治方法：1. 农业防治：实行轮作，深耕细耙，施用腐熟的有机肥；2. 物理防治：安装黑光灯诱杀成虫；3. 药剂防治：播种前每亩用 3%辛硫磷颗粒剂 2-3 公斤，拌细土撒施在播种沟内；或在生长期用 50%辛硫磷乳油 1000 倍液灌根，每株灌药液 200-300 毫升。

通用病虫害防治原则与规范

病虫害综合防治（IPM）原则

坚持"预防为主，综合防治"的植保方针，优先采用农业防治、物理防治和生物防治措施，科学合理使用化学防治，将病虫害危害控制在经济阈值以下。农业防治是基础，包括选用抗病虫品种、合理轮作、深耕细耙、合理施肥、及时清除病残体等；物理防治包括安装杀虫灯、黄板、糖醋液诱杀等；生物防治包括保护利用天敌、释放天敌昆虫、使用生物农药等；化学防治是应急措施，应严格按照农药使用规范执行。

农药安全使用规范

1. 严格按照农药标签上的使用范围、剂量、方法和安全间隔期使用农药，禁止超范围、超剂量使用；2. 禁止使用国家明令禁止的农药，优先选用高效、低毒、低残留农药；3. 合理轮换使用不同作用机制的农药，避免病虫害产生抗药性；4. 施药时应穿戴好防护用品，避免农药接触皮肤和呼吸道；5. 施药后及时清洗施药器械，剩余农药妥善处理，禁止随意倾倒；6. 严格遵守农药安全间隔期，在安全间隔期内禁止收获作物。

病虫害监测预警要点

建立病虫害监测预警体系，定期调查田间病虫害发生情况，掌握病虫害发生动态。根据病虫害发生规律和气象条件，及时发布病虫害预警信息，指导农民适时防治。重点监测迁飞性、流行性、暴发性病虫害，如稻飞虱、稻纵卷叶螟、小麦锈病、马铃薯晚疫病等，做到早发现、早防治。