

D2-K1 2021-2022

5 YP

ANATOMİ

1-) Hangisi mediastinum posteriorda bulunmaz?

Cevap: n. Phrenicus++

2-) Linea axillaris Media hattında 5. İntercostal aralıktan ateşli silahla yaralanan bir hastada

aşağıdakilerden hangisinin yaralanması beklenmez?

A) Membrana intercostalis externus++

B) M. İntercostalis internus

C) plevra visceralis

D) plevra parietalis

E) m. İntercostalis externus

3-) Spatium Parapharyngeal hangi yapı geçmez?

A) V. jugularis externa++

B) N. Accessorius

C) N. Glossopharyngeus

D) N. Vagus

E) N. Hypoglossus

4-) Aşağıdakilerden hangisi Apex pulmonis'in medialinde bulunmaz?

5-) Manubrium sterni'ye kaç çift Costa yapışır?

A)1

B)2+

C)7

D)6

6-) Vena cordis Media kalbin hangi yüzünde?

A) Facies diaphragmatica +

B) Facies sternocostalis

C) Facies anterior

D) Facies pulmonalis dextra

E) Facies pulmanalis sinistra

7-) Sağ akc.lerin apexi medialde hangi oluşum ile komşu değildir ?

A) n. Laryngeus sup+

B) tr. Brachiocephalica

C) n. Phrenicus

D) n. Vagus

E) V. Brachiocephalica dextra

8-) Margo sinisterde bulunmaz?

A) arcus aorta

B) truncus pulmonalis

C) auricula sinistra

D) ventrikul sinistra

E) v. Cava superior+

9-) Aşağıdaki hangisi kas 2 farklı larynx kıkırdağına yapışmaktadır? (anayomi)

A) m. Sternothyroideus

B) m. Thyrohyoideus

C) m. Constrictur pharyngis inferior+

D) m. Stylopharyngeus

E) m. Palatooharyngeus

10-) A. Thyroidea ima hangisinin dalıdır?

-Tr. Brachiocephalicus+

11-) Hangisi burnun dış duvarında yer almaz?

A) Vomer+

B) Os lacrimale

C) Maxilla proc. Frontalis

D) Palatin kemik lamina perpendicularis

E) Proc. Pterygoideus lamina medialis

12-) Pericardium serosum lamina visceralisini besleyen damarlar?

A) A. Musculophorica

B) A. Pericardiophorica

C) A. Coronaria dextra +

D) A. Thoracica interna

E) A. Subclavia

13-) Hangisi nasus externus ve cavitas nasinin lenf drenajını almaz?

A) Nodi submandibularis

B) Nodi submentalis+

C) Nodi parotidei

D) Nodi pharyngealis

E) Nodi cervicales profundi

14-) Truncus pulmonalis'in sağ ventrikülden çıkış yerinin projeksiyonu hangisidir?

A) Sol 3. Kıkırdak costanın sternumla birleştiği yerde+

15-) Hangisi fossa INFRATEMPORALİSTE bulunmaz?

A) M.pterygoideus lateralis

B) Plexus pterygoideus

C) Gang. Oticum

D) N. mandibularis

E) N. maxillaris+

FİZYOLOJİ

1-) Kalpte oksijen azalması kas hücrelerinden vazodilatatör maddelerin salgılanmasına neden olup

arteriollerini genişletir.

A) Doğru +

B) Yanlış

2-) Aşağıdaki solunum fonksiyon testlerinden hangisi hangisi spirometre ile ölçülemez?

A) tidal volüm

B) Ekspirasyon rezerv hacmi

C) Zorlu vital kapasite

D) İnspirasyon yedek hacmi

E) Fonksiyonel rezidüel kapasite (cevap bu)+

3-) Semilunar kapakların kapanmasıyla başlayan evre aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzometrik gevşeme +

B) Ventrikül hızlı doluş

C) Ventrikül yavaş doluş

D) Ventrikül sistolü

E) Atrium sistolü

4-) Bir kişi yüksek bir yere çıkar ve mide bulantısı ile baş ağrısı hisseder. Bir gün sonra kandisini kayak yapacak kadar iyi hisseder. Bu durumun nedeni nedir?

A) Merkezi kemoreseptör uyumu +

B) Eritrosit sayısının artması

C) Anjiyogenez

D) Pulmoner gerim reseptörlerinin uyarılması

E) Hb izoform değişiklikleri

5-) Hangisi kandaki CO₂ i solunum yoluyla dışarı atacak yönde, difüzyon zonundaki tabakaların doğru

sıralanmış şeklidir?

A) Endotel, lamina rara, lamina densa, Tip1 pnömosit

B) Tip2 pnömosit, lamina rara, ortak lamina densa, lamina rara, endotel

C) Tip1 pnömosit, lamina densa, lamina rara, endotel

D) Tip1 pnömosit, lamina rara, ortak lamina densa, lamina rara, endotel

E) Endotel, lamina rara, ortak lamina densa, lamina rara, tek katlı yassı alveol epiteli+

6-) Bir damarın zedelenmesi veya yırtılmasından sonra kan kaybının önlenmesi (hemostaz) için aşağıda

beş basamakta karışık olarak verilen işlemlerden hangisi ilk sırada yer alır?(FİZYOLOJİ)

I. Trombosit tıkaç oluşumu

II. Damar spazmı

III. Trombomodulin, trombini bağlayarak pıhtılaşmayı durdurur.

IV. Fibröz dokunun pıhtı içine doğru büyümesi ile deliğin kalıcı olarak

V. Kanın koagülasyonu ile kan pıhtısı oluşması

A) I. Trombosit tıkaç oluşumu

B) II. Damar spazmı ++

C) III. Trombomodulin, trombini bağlayarak pıhtılaşmayı durdurur.

D) IV. Fibröz dokunun pıhtı içine doğru büyümesi ile deliğin kalıcı olarak

E) V. Kanın koagülasyonu ile kan pıhtısı oluşması

7-) Aşağıdakilerden hangisi nonprogresif (kompanse) şok evresinde gerçekleşen durumlardan biri

değildir? (Fizyoloji)

A) Sempatik stimülasyon oluşur

B) Kan basıncının 50 mmHg'nın altına düşmesi ile santral sinir sisteminin iskemik cevabı oluşur.

C) Dolaşım sisteminde tersine stres gevşeme ile vazodilatasyon görülür

D) ADH salgısı azalır ++

E) Angiotensin salgısı artar.

8-) Bir ventrikülden sistolde fırlatılan kan hacmine ne denir?(Fizyoloji)

A) Strok Volüm ++

B) Sistol Sonu Hacim

C) Diastol Sonu Hacim

D) Ejeksiyon fraksiyonu

E) Afterload

9-) Aşağıdakilerden hangisinin artışı Oksijen-hemoglobin disosiyasyon eğrisini sağa kaydırmaz? (Fizyoloji)

A) CO₂

B) Isı

C) 2,3 DPG

D) pH

E) Egzersiz şiddeti+

10-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A) Atriyum fibrilasyonunda P dalgası kaybolarak, yerini atriyumun hızlı ve düzensiz eksitasyonuna uyan gelişigüzel osilasyonlara bırakır.

B) P-R aralığı normalden kısa ise, impulsların AVD'den doğarak ventrikülleri daha çabuk uyardığı düşünülür.

C) Mitral stenoz sol atriyum büyümesine neden olurken en sık sebep hipotansiyondur +

D) Sağ ventrikül hipertrofisi (hipertansiyonda olduğu gibi) V6 da çok geniş bir S dalgası ile V1 de yüksek bir R dalgası yaratır.

E) V1 derivasyonunda bifazik P dalgasının ilk kısmı büyük ise sağ atriyal büyüme vardır

11-) Renin-anjiyotensin sisteminin etki mekanizması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)renin anjiyotensinojenden anjiyotensin I'ı oluşturur

B)anjiyotensin II böbreklerden aldosteron salgısına neden olur

C)aldosteron böbreklerden suyun geri emilimini artırır

D)anjiyotensin II kısa süreli güçlü vazokonstriktör etki gösterir

E)anjiyotensin II özellikle arteriollerde vazokonstriksiyona neden olarak periferik direnç azaltılır +

12-)Transpulmoner basınçtaki her birim artışa karşı akciğerlerin genişleme derecesine ne ad verilir?

(FİZYOLOJİ)

A) Kapasitans

B) Komplians ++

C) Yüzey gerilimi

D) Subatmosferik genişleme

E) İntraplevral basınç yanıtı

13-) S1 için hangisi doğrudur?(Fizyoloji)

A) En iyi dinleme odakları aort ve pulmoner arter odaklarıdır

B) Ventrikül sistolünün başladığını gösterir. ++

C) Diyastolde atriyumdan ventriküle hızlı akan kanın ventriküle çarparak oluşturduğu sestir

D) Atriyum sistolu sırasında ventriküle gelen kanın ventrikül duvarına çarparak bu sesi oluşturmaktadır

E) Süresi 0.12 saniye olup “dup” diye tanımlanır

14-) Aşağıdakilerden hangisi normal frekansla çalışan bir kalpte EKG'nin diğer tüm bölümleri normal iken PR aralığının 0,20 sn'nin üzerine çıkması durumunda görülür? (Fizyoloji)

A) Birinci Derece (veya inkomplet) Atriyovenriküler blok ++

B) Sino atriyal blok

C) Mobitz Tip 1 (Wenkebach) Atriyovenriküler blok

D) Mobitz Tip 2 Atriyovenriküler blok

E) Üçüncü Derece (komplet) Atriyovenriküler blok

15-) Aşağıdakilerden hangisi vazokonstriktör etkili maddelerdendir? (Fizyoloji)

A) Renin ++

B) Anjiyotensin

C) Eritropoetin

D) Atrial Natriüretik Peptit

E) NO

16-) Kalmodülin molekülü kalp kasında kalsiyum bağlanmasında görevlidir.

A) Doğru

B) Yanlış+

17-) Hangisi yanlıştır?

A) Horizontal kalp sıklıkla zayıf insanlarda görülür +

B) obezlerde diyafragma yukarı yükselir,QRS sola kayar

C) kalp hastanın sağına doğru yer değiştirirse QRS de sağa kayar

D) kalpte oluşan bı enfeksiyon zedelenme akımına neden olur???

E) kalbin göğüs içinde yer değiştirdiği durumlarda ortalama QRS vektörü yer değiştirir ancak vektörün başlangıcı daima AV düğümüdür.

18-) Aşağıdakilerden hangisi kalbin kasılma gücünü arttırarak hiperejektif kalp oluşuma neden olur?

A) beta reseptör antagonisti ilaç kullanımı

B) Mi

C) Katekolaminler (epinefrin,noroepinefrin)+

D) parasempatik

E) ekstraseluler matrixte ca azalış

19-) Arteriyel kanın 100 mL sinde 5 gr dan fazla deoksijenize hemoglobin varsa siyanoz gelişir.

A) doğru+

B) yanlış

20-) Bir ventrikülden sistolde fırlatılan kan hacmine ne denir?

A) Ejeksiyon fraksiyonu

B) Sistol sonu hacim

C) Diastol sonu hacim

D) Afterload

E) Strok volüm +

21-) Hangileri AV düğümde oksijen potansiyelinin yavaş iletilmesinin sebeplerindendir?

I-Kavşak liflerinin kısalığı+

II-İnterkalar disklerde Gap Junction miktarının fazlalığı

III-İnterkalar disklerde Gap Junction miktarının azlığı+

IV-Zar dinlenim potansiyelinin diğer liflere göre çok daha az negatif değerde olması

22-)Aşağıdakilerden hangisi sprometre ile ölçülmez?

A) ekspirasyon yedek hacmi

B) tidal volüm

C) inspirasyon yedek hacmi

D) fonksiyonel rezidüel kapasite+

E) inspirasyon kapasitesi

23-) Plazma ozmolalitesine en fazla katkı sağlayan hangisidir?

A) Mg

B) K

C) Fosfat

D) Na+

E) Ca

24-) Hangisi alyuvarlar için yanlıştır?

A) İçlerinde bulundurdıkları karbonik anhidraz enzimi aracılığıyla CO₂ ve su reaksiyonlarını

hızlandırırlar

B) Eritrositlerde belirlenen ilk hücre preeritroblasttır

C) Eritrositte kemik iliği megakaryositlerden gelişir

D) Eritrosit çapı 3 mikrondur+

E) Alyuvarlar 100cm³ 34 gr hemoglobin taşır

25-) EKG’de görülen ilk pozitif dalga hangisidir?

Cevap: P+

26-) Kalp kası hücresinde SR membranındaki SERCA ile stoplazmadaki Ca hızla SR’ye gönderilir

A) DOĞRU+

B) YANLIŞ

27-) Plazma zarı Na-Ca değiş tokuş pompası ekstrasellüler matriks kaynaklı Ca’nın büyük kısmı hücre dışına

gönderir.

A) DOĞRU+

B) YANLIŞ

BİYOKİMYA

1-) Hangisi plazma proteini görevlerinden değildir?

Cevap: Oksijen taşırlar.+

2-) Hangi plazma proteininin konjenital eksikliği amfime neden olur?

A) Alfa-1-tripsin (doğru cevap)+

B) Alfa-2-makroglobulin

3-) Hastaneye sarılık ile başvuran kişide hangisi görülmesi beklenmez?

A) Serum total bilirubin düzeyi 1,5 mg/dl'nin altındadır.+

B) Hemoliz görülür.

4-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Faktör I , VI , X , XI K vitamini bağımlıdır.

B) Faktör XI ve XII kontakt proteinler olarak bilinir.

C) Erken hemostazda trombositler ve vWF Gp IIb/IIIa ile bağlanır.

D) Faktör I fibrin pıhtısını stabilize ederek proteolize karşı direncini artırır.

E) Cerrahi müdahalelerde kanama riskini belirlemek için en uygun test kanama zamanıdır.+

5-) Hangisinin eksikliği konjenital amfizeme neden olur?

A) Alfa 1 antitripsin+

B) Alfa fetoprotein

C) Beta 2 mikroglobin

D) Heptoglobin

E) Alfa 2 makroglobin

6-) Penisilin bağlayıcı protein?

A) Ribitol teikoik asit

B) Gliserol teikoik asit

C) Peptidoglikan

7-) I) Demir eksikliği

II) Eritropoietin eksikliği

III) Kemoterapi

IV) Yüksek doz radyoterapi

V) Benzol kloroform ve DDT gibi maddeler

Hangisi veya hangileri aplastik anemi gelişimine sebep olur?

A) I,III,V

B) I,II,III

C) I,II

D) III,IV,V +

E) IV,V

8-) Hangisi intrensik apoptosis sırasında mitokondriden salınan moleküllerden biri değildir?

A Kaspaz ailesi proteinazlar

B Sitokrom C

C HTRA2

D Endo G+

E Smac-Diablo

9-) Hangileri doğrudur?

1-Kas kasılması sırasında aktinin HMMS-1 kısmı ATPaz akt. sahiptir

2- Ca+2 serbestleştirici kanalı kodlayan gendeki mutasyon malign hiperterminin nedenidir+

3- Düz kaslarda kasılmayı başlatacak Ca troponine değil kalmoduline bağlanır+

4- Bazı kalp y. olgularının tedavisinde kullanılan kalp glikozları Na, K, ATPaz engelleyerek hücre içi konsantrasyonu artırır, böylece kalp kası kasılması artar.+

2, 3 ve4+

10-) Adipoz hücrelerde hangi enzim yokluğu veya yetersizliği sebebiyle endojen gliserol fosforile edilemez?

Cevap: Gliserol Kinaz+

11-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Transuda olduğu bilinen bir ponksiyon sıvıda protein değeri 3gr/dl 'in altnda +
B) İntra ve ekstrasellüler sıvı arasındaki elektrolit değerin sağlanması Na-K ATPaz pompası etkilidir

12-) Hangileri doğrudur?

I-Gama globülinler ve Von Willebrand faktörü dışındaki plazma proteinleri KC'de sentezlenir

II- vücutta demir düzeyleri yükseldiğinde ferritin sentezi olurken TfR1 (transferrin reseptörü 1) sentezi

inhibe edilir.

III- Wilson hastalığında plazma seruloplazmin düzeyi düşükken albümine bağlı plazma bakır konst.

Yüksektir.

IV- alfa 2 mikroglobulin birçok proteazın inhibitörüdür

A) 1,2,3,4+

B) 1,3,4

C) 1,2,3

D) 3,4

E) 2,3,4

MİKROBİYOLOJİ

1-) Aşağıdakilerden hangisi mikroskopik inceleme ve boyama amacıyla klinik örneklerden (hasta örneği) hazırlanan preparatlarda tesbit yöntemi olarak kullanılmaz? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A) Mutlak alkol: 8-10 dakika

B) Alevden geçirme veya 18-24 saat oda ısısında bekletme +

C) Metanol: en az 3-5 dakika

D) Aseton: 8-10 dakika

E) Alkol + aseton karışımı: 8-10 dakika

2-) Aşağıdaki bakterilerden hangisinin kapsül yapısı diğerlerinden farklıdır? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A) Streptococcus pneumoniae

B) Streptococcus mutans

C) Klebsiella pneumoniae

D) Bacillus anthracis ++

E) Haemophilus influenzae

3-) İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunda, Giardia ve Cryptosporidium gibi klora dirençli

mikroorganizmaların varlığı söz konusu ise ilk alternatif su dezenfektanı aşağıdakilerden

hangisidir?(Tıbbi Mikrobiyoloji)

A) Ozon

B) Klorin dioksit (klor dioksit) ++

C) Kloraminler

D) Ultraviyole ışınlar

E) Perasetik asit

4-) Hangisi kazanılmış bağışıklığın özelliklerinden biridir ?

A) makrofojlar görev alırlar

B) bağışıklık spesifik bir antijene karşı gelişir

C) antijenden bağımsız cevap oluşur

D) antijenle karşılaşınca derhal maksimum cevap oluşur +

E) immünolojik hafızaya neden olmaz

5-) Gram (+) hücre duvar bileşeni değildir?

Cevap: Periplazmik aralık+

6-) Eozinofili (Eozinofil sayısının artması) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Bakteriyel enfeksiyon söz konusu

B) Normal herhangi bir enfeksiyon tablosu yoktur

C) Viral bir enfeksiyon

D) Paraziter bir enfeksiyon+

E) Kanser tablosu vardır

7-) Antibiyotik duyarlılık testleri için yanlış olan ifade?

A) Dilüsyon testlerinde bakterilerin üremesini önleyen en düşük ilaç konsantrasyonuna minimum bakterisidal konst. (MBK) denir.

B) Disk difüzyon testinde diskler arasında en az 20-22 mm olmalı

8-) Hangisi doğrudur?

A) Erken hemostozda trombositler ve vWF Gplb ile bağlanır

B) Faktör I,VI,X,XI K vit. Bağımlıdır

9-) Ekzotoksinler, pirojenik ekzotoksinler, membran hasarına yol açan ekzotoksinler ve (A-B) modeli

ekzotoksinler şeklinde 3 gruba ayrılır. AB modeli ekzotoksin olmayan hangisidir?

A) S. Aureus , toksik şo sendromu toksin 1 (TSST-1)+

B) Difteri toksini

C) Pertussis toksini

D) Tetanospozmin

E) Botulinum toksini

HİSTOLOJİ

1-) Hangisinin epitelinde normal şartlarda goblet hücreleri bulunur?

A) bowman bezi

B) epiglottisin üst lingual yüzü

C) laryngeal vestibuler katlantı

D) terminal bronsiol

E) olfaktor epitel+

2-) aşağıdaki damarlardan hangisini epitel tipi diğerlerinden farklıdır ? (histoloji)

A) arteriol

B) kapiller +

C) büyük ven

D) yüksek endetolli venül

E) büyük ven

3-) Aşağıdakilerden hangisi sekonder lenfosit değildir?

A) Lenf düğümü

B) Dalak

C) Malt

4-) Hangisi olfaktor mukozanın özelliklerinden değildir

A) Örtü epiteli çok katlı silli prizmatik epitel+

B) Seröz salgı yapan bowman bezleri bulunur

C) 1-2 ayda yenilenir

5-) Timusun hangi ERH'ları ektoderm kökenlidir?

-Yalnızca Tip 6 ERH'lar+

6-) Dalakta timus bağımlı alan?

PALS+

7-) Belirgin membrana elastica internası vardır?

Muakular arterler+

8-) Lenfatik damarlar ne zaman oluşmaya başlar?

6.hafta+

9-) Kalp atımı kaçınıcı haftada başlar?

4.hafta+

10-) Prenatal dönemde çekirdekli eritrosit önce hangisinden gelişir?

A) Dalak

B) Vitellus kesesi+

C) Kemik iliği

D) Timus

E) Karaciğer

11-) Kapiller duvarında bulunan aktin, miyozin, tropomiyozin içeren kontraktıl hücre tipi nedir?

A) Endotel

B) Perisit+

12-) Küçük ve orta boy venler için hangisi yanlıştır?

A) Tunika medya küçük ve orta boy arterlerde nazaran daha incedir.

B) Tunika adventisya küçük ve orta boy arterlere nazaran daha kalındır.

C) Tunika medya düz kas hücresi içermez.

D) Çapları 1mm-1cm arasında değişir.

E) İç elastik membran çok ince olarak nadiren görülebilir.

13-) Lenf damarlarının embriyolojik dönemin kaçınıcı haftasında olur?

A 3. hafta

B 5. hafta

C 6. hafta+

14-) Olfaktor mukoza hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Seröz salgı yapan bowman bez içerir

B) Epiteldeki bazal hücreler olfaktor ve destek hücrelere dönüşebilirler

C) Çok katlı silli prizmatik epitelle örtülüdür

D) Epiteldeki bipolar nöronlar 1-2 ayda bir yenilenebilir

E) Lamina propriada olfaktor sinir lifi demetleri bulunur

15-) Hangisinin epitel tabakası farklıdır?

Cevap: Yüksek endotelli hücre+

BİYO FİZİK

1-) Solunum sisteminde hangi kuvvet yoktur ?

A) Uygulama

B) döndürme

C) eylemsizlik

D) sürtünme

E) Esneklik

2-) Aşağıdakilerden hangisi kanın reolojik özellikleri ile ilgili olarak doğru değildir?

A) Kan plazması Newtonian bir sıvıdır

B) Tam kan non Newtonian bir sıvıdır

C) Kanın yüksek kayma hızındaki düşük viskozitesi eritrosit agregasyonu tarafından belirlenir ++

D) Fibrinojen miktarı kan reolojisini etkiler

E) Eritrosit deformabilitesi kan reolojisini etkiler