

2.SINIF 3. DERS KURULU

ÜROGENİTAL VE ENDOKRİN SİSTEMLER



DERS ADI	SORU SAYISI
ANATOMİ	11
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ	17
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ	27
BİLİM KORİDORU	2
FİZYOLOJİ	26
BIYOKİMYA	17

HAZIRLAYANLAR
Alperen Kondakçı
Selim Kayhan

HİSTOLOJİ/EMBRYOLOJİ

1) Böbrek gelişiminde, üreterik tomurcuğun büyümesini ve dallanmasını düzenleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

- A) IGF
- B) PCNA
- C) EGF

D) GDNF

E) VEGF

2) Mesane mukozasını döşeyen epitel tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tek Katlı Yassı Epitel
- B) Tek Katlı Kübik Epitel

C) Transizyonel Epitel (Değişici Epitel)

- D) Çok Katlı Kübik Epitel
- E) Yalancı Çok Katlı Prizmatik Epitel

3) Testislerin zamanında skrotuma inmemesi durumuna ne ad verilir?

A) Kriptorşidizm

- B) Hipospadias
- C) Epispadias
- D) Klinefelter sendromu
- E) Turner sendromu

4) Erkek üreme sisteminde Kan-Testis bariyeri hangi bölümde bulunur?

A) Penis

B) Seminifer tübül

- C) Ductus ejakülatoryus
- D) Korpus spongiyozum
- E) Ductus deferens

5) Aşağıdakilerden hangisinden kalıcı böbrek gelişir?

A) Mezonefroz

B) Metanefroz

- C) Pronefroz
- D) Splanchnik Mezoderm
- E) Ektoderm

6) Makula densa hücreleri aşağıdakilerin hangisinde bulunur?

- A) Proksimal Tübül
- B) Toplayıcı Kanal

C) Distal Tübül

- D) Henle'nin İnce Parçası
- E) Bowman Kapsülü

7) Kan testis bariyerini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

A) Sertoli hücresi

- B) Leydig hücresi
- C) Spermatozit
- D) Spermatid
- E) Myoid hücreler

8) Semen içerisindeki spermlere enerji sağlayan früktozdan zengin sıvının sentezlendiği bez hangisidir?

- A) Prostat
- B) Ductus deferens
- C) Ductus efferens

D) Vesikula seminalis

E) Littre bezleri

9) Böbrek cisimciğinin süzücü membranında (Filtrasyon bariyeri) yer almayan aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Endotel
- B) Podosit
- C) Pedisel

D) Mezengial hücreler

E) Bazal membran

10) Ovaryumda aşağıdaki hücrelerden hangisi ya da hangileri androjen hormonları salgılar?

I. Oosit

II. Germinal epitel hücreleri

III. Granüloza hücreleri

IV. Teka interna hücreleri

V. Teka eksterna hücreleri

A) Yalnız I

B) I ve III

C) Yalnız IV

D) I ve IV

E) II, IV ve V

11) Aşağıdaki hücrelerden hangisi nöral kristadan gelişir?

A) Paratiroidlerin oksifil hücreleri

B) Paratiroidlerin esas hücreleri

C) Adenohipofizin kromofil hücreleri

D) Tiroidun folliküler hücreleri

E) Tiroidun parafoliküler hücreleri (C hücreleri)

12) Adenohipofizdeki kromofil hücrelerden hangisi en büyük salgı granüllerine sahiptir?

A) Adrenokortikotrop

B) Mamotrop (Laktotrop)

C) Somatotrop

D) Tirotrop

E) Gonadotrop

13) Aşağıdaki hücrelerden hangisi sentezledikleri hormonları salgı granüllerinde **biriktirmez**?

A) Somatotroplar

B) Adrenal korteks hücreleri (Steroid yapılı hormonlar)

C) Feokromositler

D) Parafoliküler hücreler

E) Gonadotroplar

14) Montgomery bezleri (Glandulae areolares) nerede bulunur?

A) Areola mammada

B) Serviks mukozasında

C) Plasentanın desidua bazalisinde

D) Eksternal vaginal orifis iki yanında

E) Klitoris çevresinde

15) Gonadlar aşağıdakilerin hanginden gelişir?

A) Paraksiyal mezoderm

B) İntermediyer mezoderm

C) Lateral plak mezodermi

D) Ekstraembriyonik mezoderm

E) Brankiyal arkus mezodermi

16) Adenohipofiz hücrelerinden hangisi histolojik boyamalarda oranjofil boyanır?

A) Somatotrop

B) Tirotrop

C) Gonadotrop

D) Adrenokortikotrop

E) Laktotrop

17) Aşağıdaki endokrin hücrelerden hangisi apikal-bazal kutuplaşma (polarite) gösterir?

A) Adrenal korteks hücreleri

B) Pinealositler

C) Tiroid follikül hücreleri

D) Parafoliküler hücreler

E) Paratiroid esas hücreleri

ANATOMİ

18) Erkekte erektıl yapılarından kanın büyük bölümünü drene eden, Ligamentum suspensorium penisı delip plexus venosus prostaticus'a açılan ven hangisidir?

A) v. dorsalis superficialis penis

B) v. dorsalis profunda penis

C) v. bulbi penis

D) v. helicinae

E) v. urethralis

19) Aşağıdakilerden hangisi erkek üretrasının darlıklarından biri **değildir**?

A) Ostium urethrae internum

B) Pars membranacea

C) Ostium urethrae externum

D) Fossa intrabulbaris urethrae

E) Fossa navicularis urethrae'nın arkası

20) Aşağıdaki arterlerden hangisinin mesanenin (vesica urinaria) beslenmesinde rolü yoktur?

A) a. vesicalis superior

B) a. vesicalis inferior

C) a. glutea superior

D) a. obturatoria

E) a. uterina

21) Üreterlerin mesaneye giriş yerlerinin (kateterizasyon) tespiti için kılavuz sayılan anatomik oluşum hangisidir?

A) Plica interureterica

B) Plica umbilicalis mediana

C) Cervix vesicae

D) Uvula vesicae

E) Apex vesicae

22) Ovariumun lateral yüzü ile komşuluk yapan sinir hangisidir?

A) n. obturatorius

B) a. umbilicalis

C) v. iliaca interna

D) ureter

E) a. iliaca externa

23) Perineum'u ön ve arka olarak ayıran, centrum tendinium üzerinden geçen çizgi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spina ischiadica'ları birleştiren çizgi

B) Tuber ischiadicum'ların ön uçlarını birleştiren çizgi

C) Arcus pubicus hattı

D) Linea terminalis

E) Symphysis pubica alt ucu

24) Aşağıdaki bilgilerden hangisi A. iliaca interna'nın dalları için **yanlıştır**? (**SORU İPTAL**)

A) a. uterina, embriyonik olarak erkekteki ductus deferens'in karşılığıdır.

B) a. glutea superior, a. iliaca interna'nın en büyük dalıdır.

C) a. obturatoria'nın r. pelvicus dalı, a. epigastrica inferior ile corona mortis anastomozunu yapar.

D) a. vesicalis inferior'un kadında karşılığı a. vaginalis'tir.

E) a. uterina cervix uterinin yaklaşık 2 cm lateralinde, üreter'i önden çaprazlar.

25) Aşağıdakilerden hangisi spatium perinei superficiale'de bulunur?

A) m. sphincter urethrae externus

B) gl. bulbourethralis

C) m. transversus perinei profundus

D) m. bulbospongiosus

E) Urethra'nın pars membranacea'sı

26) Gl. suprarenalis'in arka yüz komşuluğu hangisidir?

A) Diaphragma

B) Dalak

C) Karaciğer

D) Mide

E) Pankreas kuyruğu

27) Gl. thyroidea'nın facies anterolateralis komşuluğunda hangisi bulunmaz?

A) Fascia pretrachealis

B) m. sternothyroideus

C) m. sternohyoideus

D) m. stylohyoideus

E) m. omohyoideus venter superior

28) Aşağıdakilerden hangisi üreterin anatomik darlıklarından biri değildir?

A) Uretero-pelvik bileşke

B) a. iliaca communis çaprazı

C) Mesaneye giriş yeri (intramural parça)

D) Spina ischiadica hizası

E) Pelvis renalis çıkışı

TIBBİ BİYOKİMYA

29) Aşağıdaki hormonlardan hangisinin reseptörü hücre çekirdeğindedir?

A) İnsülin

B) Glukagon

C) Tiroid hormonu (T3/T4)

D) Somatostatin

E) Epinefrin

30) Kreatininden daha sensitif ve spesifik olan, GFR ölçümünde kullanılan madde hangisidir?

A) Fenolsülfofitaleyn

B) Hippuran

C) Sistatin C

D) İnsülin

E) Üre

31) Tiroid hormonlarının etkileri için hangisi yanlıştır?

A) Tiroid hormonları normal dozlarda protein sentezini yavaşlatır

B) Kalorijenik etkilidirler

C) Hipotirodide hipoglisemi görülebilir

D) Hipertiroidide kan kolesterolü düşer

E) Bazal metabolizma hızını artırır

32) Hangisi böbrek bütünlüğünü ve hasarını gösteren testlerden biri değildir?

A) Proteinüri

B) Mikroalbüminüri

C) Hematüri

D) Sitolojik idrar analizi

E) Kardiyak output

33) Tip 1 diyabetli bir hastada C-peptid düzeyinin çok düşük bulunması aşağıdakilerden hangisini düşündürür?

A) İnsülin direnci varlığını

B) Böbrekten insülin atılımının arttığını

C) Ekzojen insülin kullanımını

D) Glukagon salınımının arttığını

E) Endojen insülin sentezinin azaldığını

34) Eikozanoidlerin temel öncül molekülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Linoleik asit

B) Palmitik asit

C) Oleik asit

D) Araşidonik asit

E) Stearik asit

35) LH'nin Leydig hücrelerinde testosteron sentezini artırmasının temel hücresel mekanizması hangisidir?

- A) Aromataz aktivitesinin artması
- B) 5 alpha-redüktaz aktivasyonu
- C) Progesteron reseptörlerinin indüklenmesi

D) StAR proteini aracılığıyla kolesterolün mitokondri iç zarına taşınması

- E) SHBG sentezinin artması

36) Ağır hipoalbuminemi olan bir hastada total kalsiyum düşük ölçülmesine rağmen iyonize kalsiyumun normal bulunması aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır?

- A) PTH fazlalığı
- B) Vitamin D eksikliği
- C) Böbrekten kalsiyum kaybı

D) Total kalsiyumun protein bağlı fraksiyondan etkilenmesi

- E) FGF23 artışı

37) Paratiroid hormonu (hiperparatiroidi) etkisi altındaki bir hastada aşağıdaki laboratuvar değişikliklerinden hangisi en olasıdır?

- A) Serum Ca düşer/ serum P düşer
- B) Serum Ca yükselir / serum P yükselir

C) Serum Ca yükselir / serum P düşer

- D) Serum Ca normal / serum P düşer
- E) Serum Ca düşer / serum P yükselir

38) Overde "iki hücre-iki gonadotropin" modeli düşünüldüğünde, aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?

- A) Teka hücresi - FSH - aromataz
- B) Granüloza hücresi - LH - androjen sentezi

C) Teka hücresi - LH - androjen sentezi

- D) Granüloza hücresi - LH - progesteron sentezi
- E) Teka hücresi - FSH - östrojen sentezi

39) Feokromasitoma tanısında idrarda VMA ve metanefrin ölçülmesi, plazma katekolaminlerine göre neden daha değerlidir?

- A) Katekolaminler suda çözünmez
- B) Katekolaminler albüminle sıkı bağlanır
- C) Katekolaminler böbrekte filtre edilemez

D) Katekolaminlerin plazma yarı ömrü çok kısa, metabolitleri ise stabildir

- E) İdrar toplamak daha kolaydır

40) IGF-I düzeyi artmış bir bireyde büyüme hormonunun (GH) zamanla azalması aşağıdaki mekanizmalardan hangisi ile olur?

- A) GH reseptörlerinin yıkımı
- B) GH sentez geninin mutasyonu
- C) GH'nin böbrekten atılımının artması

D) Hipotalamusta somatostatin salgısının artması

- E) Hipofizde kalsiyum kanallarının kapanması

41) "Fight or flight" yanıtında kalp hızını artıran, bronşları gevşeten ve kan şekerini yükselten hormon hangisidir?

- A) Kortizol
- B) Aldosteron
- C) Norepinefrin
- D) Dopamin

E) Epinefrin

42) GnRH'nin pulsatil verilmesi LH ve FSH'ı artırırken, sürekli verilmesi baskılanmasına yol açar. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

- A) GnRH'nin steroid yapıda olması
- B) Hipofizde ikinci haberi kullanılmaması

C) Reseptör duyarlılığının ritmik uyarıya bağımlı olması

- D) GnRH'nin yalnızca arka hipofize etki etmesi
- E) GnRH'nin negatif feedback ile inhibe edilmemesi

43) Aşağıdaki zar fosfolipidlerinden hangisi uygun hormon uygulandığında fosfolipaz C ile hidrolize edilerek hücre içinde ikincil haberci oluşumunda görev alır?

- A) Fosfatidilkolin
- B) Fosfatidiletanolamin
- C) Difosfatidilgliserol

D) Fosfatidilinositol-4,5-bifosfat

- E) İnositol 1,4,5-trifosfat

44) Prenatal tarama testleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Üçlü testte anne kanında B-hCG, AFP ve serbest E3 düzeyleri değerlendirilir.
- B) Dörtlü test, üçlü teste ek olarak inhibin A ölçümünü içerir.

C) İkili testte ultrasonografik NT ve CRL ölçülür, anne kanında ise free beta-hCG ve Progesteron düzeyi değerlendirilir.

- D) İkili test tüm gebelerde 11-14. gebelik haftaları arasında uygulanır; bu testler trizomi 21 ve 18 riskini saptamaya yöneliktir ve nöral tüp defektinin belirlenmesinde kullanılmaz.
- E) Üçlü test 14-22. gebelik haftaları arasında uygulanır ve ultrasonografide BPD (Biparietal Çap) ölçümü yapılır.

45) Gebelik takip sürecinde yapılan gestasyonel diyabetes mellitus (GDM) taraması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Tek aşamalı stratejide 100 gram glukoz ile OGTT uygulanır.
- B) 75 gram OGTT'de açlık plazma glukozunun 70 mg/dL üzerinde olması GDM tanısı için yeterlidir.

C) İki aşamalı stratejide önce 50 gram oral glukoz tarama testi (OGTT) yapılır; 1. saat plazma glukozu 140 mg/dL ve üzerinde ise 100 gram OGTT'ye geçilir.

- D) Sadece riskli gebelere tarama testi önerilir.
- E) OGTT testi gebeliğin ilk 8 haftasında yapılır.

46) Ekstraselüler sıvıda bikarbonat tampon sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Bikarbonat tampon sistemi yalnızca böbreklerde etkilidir.
- B) Tampon sistemleri H⁺ iyonlarını vücuttan uzaklaştırarak pH'ı düzeltir.

C) Henderson-Hasselbalch eşitliğine göre Ph, HCO₃⁻/ PCO₂ oranına bağlıdır.

- D) pH değişimlerine en hızlı yanıtı böbrekler verir.
- E) Protein tampon sistemi ekstraselüler sıvıda bikarbonattan daha güçlüdür.

47) Aşağıdaki durumlardan hangisinde metabolik asidoz meydana gelir?

- A) Artmış alveoler ventilasyona bağlı pCO₂ düşüşü ve pH artışı.
- B) pCO₂ artışına bağlı pH düşüşü.

C) HCO₃⁻ azalmasına bağlı pH düşüşü.

- D) HCO₃⁻ artışına bağlı pH artışı.
- E) Potasyum kaybına bağlı pH artışı.

48) Erkeklerde Sertoli hücrelerinden salgılanarak ön hipofizde FSH salınımını baskılayan hormon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Progesteron
- B) Testosteron
- C) LH
- D) Dihidrotestosteron

E) İnhibin

49) Blastositin rahim içine implantasyonu sonrasında beslenmesi hangi yapıdan sağlanır?

- A) Plasenta
- B) Desidua (endometrium) salgılarından**
- C) Glomerülozis hücreleri
- D) Korpus luteum
- E) Umbilikal kord

50) Gebelikte görülen yüksek östradiol düzeylerinin öncüsü olan dehidroepiandrosteron (DHEA) hangi dokuda üretilir?

- A) Plasenta
- B) Anne overi
- C) Anne adrenal korteksi

D) Fetal adrenal korteks

- E) Fetal karaciğer

51) Menopozun temel fizyopatolojik mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ön hipofizden salgılanan FSH ve LH düzeylerinin azalması.

B) Gonadotropinlerle uyarılabilecek over folikül rezervinin tükenmesi.

- C) Korpus luteumdan progesteron salgısının tamamen ortadan kalkması.

- D) Endometriumun atrofisi.

- E) Hipotalamusun gonadotropinlere duyarsızlaşması.

52) Aşağıdakilerden hangisi vazopressine (ADH) duyarlı üre kanalıdır? **(SORU İPTAL)**

- A) UT-A1

B) UT-A3

- C) UT-B

- D) Aquaporin-2

- E) UT-A2

53) Miksiyon (işeme) refleksi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Hipogastrik sempatik liflerin aktivasyonu detrusor kasında kasılmaya yol açar.

- B) Parasempatik lifler iç sfinkteri kasar ve idrarın tutulmasını sağlar.

C) Miksiyon refleksi gerilme reseptörlerinin uyarılmasıyla başlar ve parasempatik etki ile sürdürülür.

- D) Pudental sinir aktivasyonu dış sfinkterin kasılmasına neden olur.

- E) Sempatik sinir sistemi idrarın boşaltılmasında ana role sahiptir.

54) Na-K-2Cl pompası aşağıdaki böbrek tübülü kısımlarının hangisinde bulunur?

- A) Proksimal tübül

- B) Distal tübül

C) Henle kulbu çıkan kalın kolu

- D) Henle kulbu inen ince kolu

- E) Toplayıcı kanallar

55) Leydig hücrelerinden testosteron salgısını aşağıdakilerden hangisi stimüle eder?

- A) İnhibin

- B) TRH

- C) ACTH

D) LH

- E) Prolaktin

56) Aşağıdakilerden hangisi böbrek strüvit taşları ile ilgili doğru ifadedir?

- A) Dehidratasyon ve asidik idrar ana risk faktörüdür.

- B) Hipositratüri bu taş oluşumu için temel risk faktörüdür.

C) Üreaz üreten mikroorganizmalarla enfeksiyon sonucu meydana gelir.

- D) Koyu çay ve ıspanak tüketimiyle ilişkilidir.

- E) Ürik asit metabolizması bozukluğuna bağlıdır.

57) Hangisi veya hangileri glomerüler filtrasyon hızını (GFH) azaltır?

- I. Bowman kapsülü hidrostatik basınçta artış

- II. Nitrik oksit

- III. Aspirin

- IV. Prostaglandin E2

- V. Glomerüler kapiller membran kalınlığında artış

A) I, III ve V

- B) II ve IV

- C) Yalnız I

- D) II, III ve IV

- E) Hepsi

58) Normal çalışan bir böbrekte, antidiürez (ADH'nın yüksek olduğu durum) sırasında tübülün suya karşı en düşük geçirgenliğe sahip olan bölümü hangisidir?

A) Henle'nin inen ince kolu

B) Henle'nin çıkan kalın kolu

C) Proksimal tübül

D) Kortikal toplayıcı kanal

E) Medüller toplayıcı kanal

59) Aşağıdakilerden hangisi pankreas beta hücrelerinden insülin ile birlikte salınan bir hormondur?

A) Glukagon

B) Leptin

C) Ghrelin

D) Somatostatin

E) Amilin

60) Aşağıdakilerden hangisi postrenal böbrek yetmezliği sebebidir?

A) Böbrek Taşı

B) İshal

C) Kalp Yetmezliği

D) Hipotansiyon

E) Hemoraji

61) Aşağıdakilerden hangisi böbrek lezyonlarında hipertansiyon gelişim sebeplerinden biri değildir?

A) Renovasküler direnç artışı

B) Tübüllerde aşırı Na⁺ emilimi

C) Kapiller filtrasyonun bozulması

D) D vitamini sentezinin bozulması

E) Renin-Anjiyotensin sistemi aktivasyonu

62) İnsülin ile ilgili verilen önermelerden hangisi yanlıştır?

A) İnsülinaz enzimi yıkımını sağlar.

B) Preproinsülin olarak sentezlenir.

C) Yarı ömrü (t_{1/2}) kısadır.

D) Tirozin kinaz reseptörü aracılığı ile etki eder.

E) Başlıca hedef doku karaciğer ve beyindir.

63) Aşağıdakilerden hangisi tiroid hormon sentezinde ilk basamaktır?

A) İyodun kandan bez hücresi ve foliküllere taşınması

B) Tiroglobulin sentezi

C) Tirozin aminoasidinin foliküle salınması

D) İyodun oksidasyonu

E) İyotlu tirozillerin birleşmesi

64) Aşağıdakilerden hangisi hücre dışı ödem oluşumuna yol açan temel fizyolojik mekanizmalardan biri değildir?

A) Kapiller hidrostatik basıncın artması

B) Plazma protein konsantrasyonunun (kolloid ozmotik basınç) artması

C) Kapiller geçirgenliğinin artması

D) Lenfatik tıkanıklık

E) Sodyum ve su tutulumu

65) Kortizolün (glukokortikoid) karbonhidrat, protein ve yağ metabolizması üzerindeki etkileri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi beklenen bir etkidir?

A) Hücrelerin glukoz kullanımını artırarak kan şekerini düşürür.

B) Karaciğer dışındaki tüm hücrelerde protein sentezini artırır.

C) Karaciğerde glikoneojenezi stimüle ederek kan glikoz düzeyini yükseltir.

D) İnsüline olan duyarlılığı artırır.

E) Yağların enerji için kullanılmasını baskılayarak depolanmasını sağlar.

66) Klinik olarak " hipokalsemik tetani " gelişen bir hastada aşağıdaki bulgulardan hangisinin görülmesi beklenmez?

- A) Sinir ve kas hücrelerinde Na⁺ geçirgenliğinin artmasıyla eksitabilitenin yükselmesi
- B) Kol kaslarının spazmı sonucu oluşan karpopedal spazm

C) Kalbin QT aralığında kısalma ve nöronal aktivitelerde depresyon

D) Larinks kaslarında şiddetli spazm (laringospazm) nedeniyle solunum yolu tıkanıklığı

E) Motor sinirlerde oluşan spontan deşarjlar

67) Aldosteron hormonu ve vücuttaki elektrolit dengesi üzerindeki etkileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sodyum emilimine bağlı olarak ozmotik basınçla su tutulumu artar.

B) Kandaki potasyum K(+) ve hidrojen H(+) iyonlarının tutulumunu artırarak asidoza neden olur.

C) Ter ve tükürük bezlerinden sodyum çıkarılmasını azaltır.

D) Eksikliğinde kalp debisi azalır ve şoka benzer bir tablo gelişebilir.

E) Distal tübül ve toplayıcı kanallarda sodyum geri emilimini artırır.

68) Uzun kemiklerin epifiz plakları kapandıktan sonra (ergin yaşta) Büyüme hormonunun (GH) aşırı salgılanması durumunda el, ayak ve yüz kemiklerinde kalınlaşma ile seyreden tablo hangisidir?

- A) Jigantizm (Devlik)
- B) Cücelik

C) Akromegali

D) Akromikri

E) Panhipopituitarizm

69) Hipofiz ön lobunda (adenohipofiz) bulunan hücre grupları ve salgıladıkları hormonlar eşleştirildiğinde, vücuttaki tüm dokularda büyümeyi stimüle eden hormon hangi hücrelerden salgılanır?

- A) Tirotroplar
- B) Kortikotroplar

C) Somatotroplar

D) Laktotroplar

E) Gonadotroplar

70) Peptid ve protein yapılı hormonların sentez, depolanma ve salgılanma süreçleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Granüllü endoplazmik retikulumda (GER) sentezlenirler.

B) Sentezlenen ilk formları genellikle inaktif "prehormon"dur.

C) Aktif hormon haline geldikten sonra sekretuar veziküllerde depolanırlar.

D) Lipidde çözünürlükleri yüksek olduğu için hücre membranından difüzyonla çıkarlar.

E) Ekzositozu uyaran temel olaylardan biri sitozolik kalsiyum konsantrasyonunun artmasıdır.

71) Fötusta parsiyel oksijen basıncı (PO₂) en yüksek aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

A) Duktus arteriozus

B) Duktus venozus

C) Umbilikal arter

D) Pulmoner arter

E) Sağ ventrikül

BİLİM KORİDORU

72) Aşağıdakilerden hangisi deney hayvanları ile çalışma yapılırken uyulması gereken temel kurallardan (3R kuralı) biri değildir?

A) Replacement (Yerine koyma)

B) Reduction (Azaltma)

C) Refinement (İyileştirme)

D) Replication (Tekrarlama)

E) Randomization (Rastgeleleştirme)

73) Ender rastlanan ciddi advers olayların ve ilaç etkileşimlerinin belirlenmesi aşağıdaki klinik çalışma dönemlerinden hangisinde yapılır?

A) Faz 1

B) Faz 2

C) Faz 3

D) Faz 4

E) Pre-klinik dönem

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

74) Leptospiralar ve yaptığı enfeksiyonlar hakkında yanlış bilginin yer aldığı seçeneği işaretleyiniz.

A) Leptospira interrogans grubu insan ve hayvanda hastalık yapan tüm patojenleri içerir.

B) Beşinci kodes türü sert kenenin ısırması sonucu insanlar rastlantısal enfeksiyon meydana gelir.

C) İnsan enfeksiyonlarından en sık fareler sorumludur.

D) Patogenezde temel mekanizma endotel hasarı ve hemorajidir.

E) Weil hastalığı ağır klinik tablodur.

75) Borrelia burgdorferi enfeksiyonları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kompleks Barbour-Stoenner-Kelly (BSK) besi yerlerinde üretilir.

B) Ixodes türü kene ısırması sonucu bulaşır.

C) Giemsa ve Wright boyaları ile boyanabilir.

D) Eritema kronikum migrans (EM) tipik deri döküntüsüdür.

E) Lyme hastalığı bu bakterinin ekzotoksinleri nedeniyle oluşan bir klinik tablodur.

76) Edinsel sifilisin etkeni olan T. pallidum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hücre duvarı ile dış membran arasında aksiyal filamentler bulunur.

B) Zorunlu anaerop bir bakteridir.

C) RPR testi sifilisin tanı ve takibinde kullanılabilir.

D) Bakteriyojik boyalarla (Gram vb.) iyi boyanmazlar.

E) T. pallidum suni besiyerlerinde embriyonlu yumurta ve doku kültüründe 33 derecede 6-8 haftada üretilir.

77) Üşüme, titreme, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle başvuran 60 yaşındaki erkek hastanın öyküsünden; diyabet hastası olduğu ve birkaç hafta önce termal bir havuzu kullandığı öğreniliyor. Fizik muayenesinde bilateral akciğer bazallerinde raller saptanıyor. Hastanın idrarından yapılan idrarda antijen testi pozitif saptanıyor. Bu hasta için en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bordetella pertussis

B) Haemophilus influenzae

C) Legionella pneumophila

D) Francisella tularensis

E) Bartonella bacilliformis

78) Aşağıdakilerden hangisi Aktinomikoz için yanlıştır?

A) Endojen enfeksiyonlardır.

B) Mikroorganizma kolonileri Sülfür granüllerine neden olur.

C) Etken asite dirençli boyanır.

D) En sık servisofasial tutulum gösterir.

E) Pelvik tutulum rahim içi araç kullanan kadınlarda görülür.

79) Brucella canis ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 2 merkaptotanol testinde IgM cinsi antikorlar parçalanarak sadece IgG cinsi antikorlar saptanabilir.

B) Rivanol testinde IgG cinsi antikorlar parçalanarak sadece IgG cinsi antikorlar saptanabilir.

C) Rose Bengal testi tarama/aglütinasyon testidir.

D) Wright testi IgG cinsi antikorlar parçalanarak sadece IgM cinsi antikorlar saptanabilir.

E) İndirekt coombs testi blokan IgG antikorlarının saptanması için kullanılır.

80) Aşağıdakilerden hangisi epidemik tifüs etkenidir?
(SORU İPTAL)

A) Rickettsia typhi

B) Rickettsia conori

C) Rickettsia akari

D) Rickettsia rickettsii

E) Rickettsia japonica

81) HACEK grubu bakterilerin ortak özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Gram-pozitif olup hızlı üreyen aerob mikroorganizmalardır.

B) Normal cilt florasının baskın üyeleridir.

C) Oral ve üst solunum yolu florasında yer alan, yavaş üreyen Gram-negatif basillerdir ve infektif endokardit etkeni olabilirler.

D) Rutin kan kültürlerinde 24 saat içinde üreyerek kolaylıkla tanımlanırlar.

E) HACEK grubu bakteriler yalnızca hastane enfeksiyonu yaparlar.

82) Aşağıdaki bulaş yolu – tularemi klinik formu eşleştirmelerinden hangisi tipik olarak beklenmez?

A) Kene ısırığı – Ülseroglandüler tularemi

B) Enfekte su içilmesi – Orofaringeal tularemi

C) Aerosol inhalasyonu – Pnömonik tularemi

D) Konjonktiva teması – Oküloglandüler tularemi

E) Oral yoldan kontamine et tüketilmesi – Tifoidal tularemi

83) Aşağıdakilerden hangisi bekletilmemesi gereken hassas örneklerden biri değildir?

A) Doku biyopsi örnekleri

B) BOS (Beyin Omurilik Sıvısı) örnekleri

C) Steril vücut sıvısı örnekleri

D) Orta akım idrar örnekleri

E) Kemik iliği örnekleri

84) Direkt mikroskopik muayene için kalite değerlendirmesi (Bartlett kriterleri) yapılması kesinlikle gereken temel örnek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boğaz sürüntü örneği

B) Gaita

C) Nazofaringeal örnek

D) Kan kültürü

E) Balgam

85) Aşağıdakilerden hangisi direkt mikroskopi (EZN/ARB boyama) ile tanı / ön tanı konulabilen enfeksiyon etkenlerinden biridir?

A) Ureaplasma urealyticum

B) Rickettsia rickettsii

C) Mycoplasma pneumoniae

D) Chlamydia pneumoniae

E) Mycobacterium tuberculosis

86) Bakterilerin sitokrom c oksidaz enzimi üretilip üretilmediğini araştırmak için gerçekleştirilen konvansiyonel ön tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oksidaz

B) Üreaz

C) Katalaz

D) Nitrat Redüktaz

E) Metil red

87) Enfeksiyon sürecinde dokuda karakteristik sülfür granülleri oluşturan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Actinomyces spp.

B) Nocardia spp.

C) Streptomyces spp.

D) Mycobacterium spp.

E) Listeria spp.

88) Glikoz fermentasyonu ile oluşan asit son ürünlerin aseton ya da 2,3-butanediol'e dönüştürülmesini araştırmak için kullanılan konvansiyonel tanı testi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Voges-Proskauer

B) Methyl Red

C) Citrate

D) TSI

E) LIA

89) Anne sütü alan bebeklerin bağırsak florasında laktobasillerle birlikte baskın olarak bulunan anaerob mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bifidobacterium spp.

B) Bacteroides fragilis

C) Clostridium difficile

D) Fusobacterium spp.

E) Veillonella spp.

90) Neden olduğu protez eklem enfeksiyonları ve Gram pozitif kok olması nedeni ile anaeroplardan stafilokoku olarak bilinen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Finegoldia magna

B) Peptostreptococcus spp.

C) Veillonella spp.

D) Propionibacterium acnes

E) Bacteroides spp.

91) Aşağıdakilerden hangisi invaziv ishal yapan Escherichia coli (EIEC) için doğrudur?

A) Shigella benzeri mekanizma ile kolon mukozasına invaze olur.

B) Kolera toksinine benzer enterotoksin üretir.

C) İnce bağırsakta villus atrofisine yol açar.

D) Laktozu her zaman hızlı fermente eder.

E) Isıya dayanıklı enterotoksin üretimi esastır.

92) Aşağıdakilerden hangisi Klebsiella pneumoniae'nın patojenezinde en önemli rolü oynayan faktördür?

A) Kalın polisakkarit kapsül

B) Endotoksin (LPS)

C) Peritrik flagellalar

D) Sporlu yapı

E) Hemolizin üretimi

93) Üriner sisteme bağlanmayı kolaylaştıran fimbriyaları vardır. Üreyi parçalar. Ortamı alkali hale getirir. Taş oluşumu kronik üriner sistem enfeksiyonlarına neden olur. Yukarıda özellikleri verilen bakteri hangisidir?

A) Proteus spp.

B) E. coli

C) Salmonella spp.

D) Shigella spp.

E) Yersinia spp.

94) Hangisinin tedavisinde antibiyotik önerilmez?

A) Gastrit

B) Peptit Ülser

C) Özofageal reflü

D) Gastrit adenokarsinom

E) mide MALT lenfoması

95) Kanlı ishal şikayeti ile acile başvuran 21 yaşında erkek tıp fakültesi öğrencisinin dışkı örneğinin mikroskopik incelemesinde bol lökosit ve eritrosit saptanıyor. Örnekten yapılan Gram boyalı preparatta martı kanadı şeklinde kırık Gram negatif basiller saptanıyor. Etken ve uygun tedavi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Enteropatojenik E. coli – siprofloksasin

B) Campylobacter jejuni – eritromisin

C) Salmonella enterica – moksifloksasin

D) Shigella dysenteriae – penisilin

E) Vibrio cholerae – doksisiklin

96) Aşağıdakilerden hangisi Pseudomonas türlerinde görülen bir virülans faktörü değildir?

A) Ekzotoksin A

B) Piyosiyenin

C) Aljinat kapsül

D) Prodigiosin sentezi

E) Elastaz

97) Neisseria meningitidis hakkında yanlış olan tanımlamayı işaretleyiniz.

A) Katalaz ve oksidaz pozitif iken maltoza etki etmemesi N. gonorrhoeae'dan farklı yönüdür.

B) Nazofarenkste kolonize olabilir.

C) İnsandan insana damlacık yoluyla bulaşır.

D) Polisakkarit kapsül en önemli virülans faktörüdür.

E) Waterhouse-Friderichsen sendromu yapabilir.

98) Shigella cinsi bakterilerle ilgili olarak yanlış olan seçeneği işaretleyiniz.

A) S. sonnei dışındaki türler laktöz pozitifdir.

B) TSİ besiyerinde dip kısımda sarı ve yatık kısımda kırmızı/pembe renk oluştururlar.

C) Fekal-oral yolla bulaşır. Ancak insandan insana ve sineklerle yanılma da önemli bir özelliğidir.

D) Shiga toksin ve LPS, glomerular endotel hücrelerine sinerjistik sitotoksik etki yapar. Bunun sonucu Şigellaz komplikasyonu olarak HÜS gelişebilir.

E) Gelişmiş ülkelerde S. Sonnei, gelişmekte olan ülkelerde ise S. flexneri ve S. Dysenteriae izole edilir.

99) Vibrio cinsi bakteriler ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Vibrio parahaemolyticus: TCBS (thiosulfate citrate bile sucrose agar) besiyerinde yeşil renkli koloniler oluşturur.

B) Hareketli ve virgül şeklinde kıvrık basillerdir.

C) Vibrio cholerae: fekal-oral yolla bulaşır, kalın bağırsağın enfeksiyonuna sebep olarak sistemik bir enfeksiyon tablosuna neden olur.

D) Vibrio cholerae halofilik (üremek için tuz gerekli), %6 NaCl'ye ve alkali ortalama dayanıklıdır.

E) Vibrio vulnificus: kontamine deniz suyu ile temas sonrası yara enfeksiyonu ve bakteriyemi tablosuna neden olur.

100) Salmonella typhi ve Citrobacter freundii'de bulunan ortak/identik hücre duvarı yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) O antijeni

B) H antijeni

C) Fimbria antijeni

D) Vi antijeni

E) Lipid A