

ANATOMİ

1-)Capsula interna'nın genu kısmından hangisi geçer?

- A) tr. frontopontinus
- B) tr. corticospinalis
- C) tr. corticonuclearis
- D) radiatio optica
- E) tr. thalamocorticalis

2-) Aşağıdaki arterlerden hangileri medulla spinalis'i besler?

- I. a. Thoracica interna
- II. a. Iliolumbalis
- III. a. Subscapularis
- IV. Aa. Intercostalis anterior
- V. Aa. Intercostalis suprema
- VI. a. Centralis profunda

3-) Sulcus parietooccipitalis ile calcarinus arasında hangisi bulunur?

- A) cuneus
- B)Fornix
- C) precuneus
- D)Uncus
- E) lobulus paracentralis

4-) Aşağıdaki damarlardan hangisi ponsu beslemez?

- A) A. Labyrinthe
- B) A. Superior Cerebelli
- C) PICA
- D) AICA
- E) A. Basillaris

5-)Weber sendromu aşağıdaki arterlerden hangisinin tıkanması sonucu oluşur?

- A) a. Cerebri posterior
- B) a. Cerebri anterior
- C) A. Cerebri media
- D) PICA
- E) a. Spinalis posterior

6-) Beyin sapındaki hangi çekirdek kardiyovasküler, respiratuar, gis ile ilgili reflexlerden sorumludur?

- A) N. Solitarius
- B) N. Ambiguus
- C) N. Arcuatus
- D) N. Salivarius inferior
- E) N. Posterior (dorsalis) nervi vagi

7-) Gyrus cinguli'yi en çok besleyen arter aşağıdakilerden hangisidir?

- A) a. Cerebri ant.
- B) a. Cerebri post.
- C) a. Cerebri media
- D) a. Basillaris
- E) a. Ophthalmica

8-)Üst dudaktan gelen ağrı duyusunun lifleri hangi çekirdekte sonlanır?

- A) nuc. Spinalis nervi trigemini
- B) Nuc. Nervi facialis
- C) Gang. Trigeminalis
- D) Nuc. Ambiguus
- E) Nuc. Salivatorius superior

9-)Duyguların dışı vurumu ile ilgili limbik sistem bölümü hangisidir?

- A) Hipocampus
- B) Corpus amygdaloideum
- C) Corpus callosum
- D) Fornix
- E) Cingulum

10-) Aşağıdaki oluşumlardan hangisi labyrinth membranaceus'a ait bir yapı değildir?

- A) Ductus semicircularis anterior
- B) Utriculus
- C) Ductus cochlearis
- D) Sacculus
- E) Scala vestibuli

11-) Foramen stylomastoideumdan geçen oluşumlara baskı yapan tümör vardır. Hangi sinirde lezyon görülür?

- A) Kornea reflexinde afferent kolunun bozulması
- B) Çiğneme kaslarında felç
- C) Dil sırtının Anterior kısmında tat kaybı
- D) Hiperakuzi
- E) Mimik kaslarında zayıflık

12-) Hangisi Cavitas tympaninin paries medialisinde bulunur?

- A) N. Facialis
- B) Canalis caroticus
- C) Plexus tympanicus
- D) Membrana tympanica
- E) Tegmen tympanicum

13-) Yutma ve öğürme reflexlerini baskılamak isteyen doktor hangi siniri ??

- A) N. Mandibularis
- B) N. Nasopalatinus
- C) N. Hypoglossus
- D) N. Maxillaris
- E) N. Glossopharyngeus

14-) N. Colliculus inferior ile ilgili hangisi yanlıştır?

- A) colliculus inferior denilen kabartıntının derininde
- B) çöptü geniculatus medialeye giden efferent lifler çıkar
- C) İşitme reflex merkezi
- D) Karşı tarafın colliculus inferior ile afferent ve efferent ile bağlantılıdır
- E) Lemniscus medialisinden afferent lifler alır.

15-) Hangisi vermis cerebelli yapısı değildir?

- A) Nodulus
- B) Tuber
- C) folium
- D) tonsilla
- E) lingula

16-) Labium superior'u yarılan bir kişide hekim dikiş atmadan önce hangi sinire lokal anestezi yapılmalıdır?

- A) n. Infraorbitalis
- B) n. Buccalis
- C) n. Alveolaris inferior
- D) n. Mentalis
- E) n. Zygomaticus

17-)Hangi yolaktan çıkan lifler fibria arcuata externa anterior olarak adlandırılır?

- A)nuc. Arcuatus
- B) Nuc. Gracilis
- C) Nuc. Cuneatus accesorius
- D) Nuc. Ambigus
- E) Nuc. Olivarius inferior

18-)Corpus striatum hangi yapılardan oluşur?

- A) nuc. caudatus+putamen+globus pallidus
- B) Nuc. Caudatus+ Globus pallidus
- C) Nuc. Caudatus+ putamen
- D) putamen+ Globus pallidus
- E) Nuc. Caudatus+ thalamus

19-)Alt ekstremitede iki nokta diskriminasyonu ve vibrasyon kaybı görülürse hangi yolağın lezyonu olduğu söylenir?

- A) Fasciculus gracilis
- B) Fasciculus cuneatus
- C) lemniscus lateralis
- D) lemniscus spinalis
- E-) lemniscus trigemini

20-) Bir hastanın muayenesinde sol elinde istirahat tremoru, yavaş yürüme ve ifadesiz yüz görülmüştür. Aşağıdakilerden hangisinde bir lezyon olabilir?

- A) Bilateral substantia nigra
- B) Sol globus pallidus
- C) Sol substantia nigra
- D) Sağ globus pallidus
- E)Sağ substantia nigra

21-) Yetişkinde Üst motor felcinde aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

- A) Hipertoni
- B) Parezi
- C) Babinski pozitifliği
- D) DTR varlığı
- E) Romberg pozitifliği

22-) Fasciculus arcuatus hangi yapılar arasında bağlantı kurar?

- A) Broca ve Wernicke alanı
- B) prefrontal- hipocampus
- C) işitme merkezi- görme merkezi
- D) frontal- occipital
- E) somatik duyu merkezi- motor merkez

23-) Aşağıdakilerden hangisi crus cerebri komşuluğunda bulunmaz?

- A) Corpus geniculatum laterale
- B) Corpus geniculatum mediale
- C) tr. Opticus
- D) chiasma opticum
- E) Corpus mamillare

24-) Aşağıdakilerden hangisi dura mater'in duyununu taşımaz?

- A)n.vagus
- B) C1 spinal siniri
- C) n. Mandibularis
- D) n. Maxillaris
- E) n. Ophthalmicus

25-)Aşağıdakilerden hangisi n. Facialis'in dalı değildir?

- A) chorda tympani
- B) r. Buccalis
- C) n. Petrosus profundus
- D) n. Stapedius
- E) n. Auricularis posterior

26-)Gövdeye ait ağrı/ısı duyunu taşıyan yolak nerede çapraz yapar?

- A) Commissura alba anterior
- B) Decussatio pyramidium
- C) Decussatio lemniscum
- D) yapmaz
- E) ramus communicans griseus

27-) Crus cerebri kesisinde hangi işlev kaybı görülür?

- A) motor
- B) şuurlu proprioepsiyon
- C) koku
- D) somatik duyu
- E) tat

28-) Bitemporal heteronymous hemianopsia hastasında lezyon nerededir?

- A) n. Opticus
- B) radiata optica
- C) tractus opticus
- D) chiasma opticum
- E) Corpus geniculatum laterale

29-)Laterale bakamayan hastada hangi sinirin lezyonu görülür?

- A-) n. Oculomotorius
- B-) n. Opticus
- C) n. Facialis
- D) n. Trochlearis
- E) n. Abducens

30-) Aşağıdakilerden hangisi hipotalamusa ait bir yapı değildir?

- A) lamina terminalis
- B) corpus geniculatum mediale
- C) Tuber cinereum
- D) chiasma opticum
- E) Corpus mamillare

31)

- I-) conus medullaris
- II-) lig. Denticulatum
- III-) lig. Coccygeum
- IV-) cauda equina
- V-) filum terminale internum

Medulla spinalis'i saran zarlar yukarıdakilerden hangilerinin oluşumuna katılır?

32-) Parotis bezine ulaşmış sempatik lifler hangi yolu kullanır?

- A) N. Caroticus externus
- B) Carotis externus
- C) Petrosus majör
- D) N. Glossopharyngeus
- E) Petrosus minör

33-) Başa ait ağrı ısı duyuşu.....

ile taşınır

- A)Tr. Spinothalamicus lateralis
- B)Tr. Trigeminothalamicus
- C)Tr. Cuneocerebellaris
- D)Tr. Spinothalamicus anterior
- E)Ieminiscus lateralis

34-) Cerebellumda bulunan fissura horizontalis hangi yapıların arasındadır?

- A) Folium ve tuber+

FİZYOLOJİ

1-)Aşağıdakilerden hangisi Paccini reseptörü ile ilgili yanlışfadedir?

- A) Iggo kubbe reseptörü içinde yerleşik bulunur.
- B) Derinin altında, vücudun fasyal dokularında bulunur.
- C) Yavaşadaptasyon gösterirler.
- D) Kapsüllü sonlanmalardır.
- E) El ayası ve ayak tabanı, dudaklar, dil ucu, dışgenital organlar ve meme uçlarında

bulunurlar.

2-)Sinir liflerinin sadece tek bir duyu modalitesini ileten özgüllüğüne ne ad verilir?

- A) Duyu modalitesi
- B) İş-aretlenmiş yol ilkesi
- C) Uygun uyarı
- D) Reseptörlerin spesifikliği
- E) Reseptör potansiyeli

3-)Kohleanın tabanı civarındaki sert kısa lifler yüksek frekanslarda en yüksek düzeyde titreşim gösterirken kohleanın tepesi civarındaki uzun, ince lifler daha düşük frekansta en iyi titreşime sahiptir.

- A) Doğru
- B) Yanlış

4-) Fleksör ve çapraz ekstansör reflekslerin oluşabilmesi için ilgili kas gruplarının antagonistlerinin medulla spinalisteki ara nöron devreleri ile gevşemesini sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Derin tendon refleksi
- B) Fleksör refleksi
- C) Pozitif destekleme reaksiyonu
- D) Geri çekme refleksi
- E) Resiprok inhibisyon

5-)Aşağıdakilerden hangisi terminal plakta arttığı zaman asetilkolin salınımı inhibe olur?

- A) Sodyum
- B) Potasyum
- C) Magnezyum
- D) Kalsiyum
- E) Klor

6-) İstemli hareket süresince kasın gevşemeden kasılı kalmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Grup Ia lifleri
- B) Grup II lifleri
- C) Zincir çekirdek lifleri
- D) Gama motor nöronlar
- E) Grup Ib lifleri

7-) "Bir reseptöre sabit güçte bir uyarı uygulandığında, bunun duysal sinirinde oluşan aksiyon potansiyellerinin frekansı zamanla azalır." Yukarıda belirtilen fizyolojik durum, hangi mekanizmaya aittir?

- A) Fasilitasyon
- B) Konverjans
- C) Diverjans
- D) Adaptasyon
- E) Jenaratör potansiyel

8-) Bir maymundaki amigdalanın çift taraflı çıkarılması (kluver-bucy sendromu) neticesinde aşağıdaki (septom) ifadelerden hangisi görülmez?

- A) Joral eğiliminde artma
- B) Başfırtı korku
- C) Süperseksüelite
- D) Hiperfaji
- E) Başfırtı merak

9-) Sempatik sinir sisteminde salgılanan nörotransmitter madde nöradrenalindir.

- A) Doğru
- B) Yanlış

10-) Hipotalamusta ventromedial çekirdek lezyonunda hangisi oluşur?

- A) Zayıflık
- B) Gece-gündüz siklusunda bozulma
- C) Şişmanlık
- D) Vücut ısısında bozulma

E) Su içme davranışında artma

11-) Ter bezlerini inerve eden postganglionik sempatik nöronlar nörotransmitter olarak nöradrenalin salgılar.

- A) Doğru
- B) Yanlış

12-) En hızlı sinir lifi hangisidir?

- A) A-Alfa
- B) A-Beta
- C) A-Delta
- D) B lifleri
- E) C lifleri

13-) Adrenal bozukluklarla ilgili 10'ların kuralı olarak adlandırılan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) ACTH üreten hipofiz türevleri
- B) Conn sendromu
- C) Adrenal adenoma ve adrenal karsinom
- D) Feokromositoma
- E) Bilateral mikronodüler hiperplazi

14-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Glial glutamat alımının bozuklukları retina dejenerasyonuna katkıda bulunur.
- B) Foveada yerleşen koniler, retinada daha periferde bulunan çok daha şişman konilerin aksine, özellikle ince ve uzun gövdelere sahiptirler.
- C) Periferik retinanın zayıf ışığa karşı çok daha fazla duyarlılığı vardır.
- D) Dorsal lateral genikülata çekirdeğin magnasellüler katmanı P tipi retina ganglionlardan girdilerini alır.
- E) İnsan retinasında 3 ana tip glial hücre bulunmaktadır.

15-) Aşağıdakilerden hangisi nöbetlerin serebral kan akışındaki farklılıkları karşılaştıran işlevsel bir beyin görüntüleme yöntemi değildir?

- A) Manyetik rezonans görün. (MRI)
- B) Beyin tomografisi (BT)
- C) Tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi (SPECT)
- D) Pozitron emisyonlu tomografi (PET)
- E) Elektroensefalografi (EEG)

16-) Epilepside uyarıcı (+) nörotransmitter madde glutamattır.

- A) Doğru
- B) Yanlış

17-) Mikrogliosis, retinal dejenerasyonla ilgilidir.

- A) Doğru
- B) Yanlış

18-) Küçük bir embolinin beyin bir bölgesine kan akışını engellediği serebrovasküler kaza tipine ne denir? (Fizyoloji)

- A) anevrizma
- B) amaurosis
- C) geçici hemorajik atak
- D) hemorajik inme
- E) iskemik inme

19-) Denge ile ilgili lifler serebellumda hangi loba gelir?

- A) Flokkulonodüler lob +

20-) Uzun süreli bellek oluşum mekanizmalarından aşağıdakilerden hangisi görülmez?

- A) Presinaptik yollarda inhibisyon +

21-) Nöbetlerin bölgesel kan akışını karşılaştıran beyin görüntüleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) EEG
- B) EMG

22-) Lentin saydamlığını kaybetmesine ne denir?

A) katarakt+

MİKROBİYOLOJİ

1-) Legionella pneumophila ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Fagolizozom füzüyonunu inhibe ederek hücre içinde yaşamını sürdürür.

B) Kültürde

üreyebilmesi için besiyerlerine L-cystein ve demir eklenmesi gereklidir.

C) Bulaşmada en önemli kaynaklar; duşbaşıkları, kaplıca havuzu, göl, akarsu gibi doğal su kaynaklarıdır.

D) Pontiac ateşte, pnömoni, SSS, karaciğer ve böbrekleri tutan sistemik enfeksiyon tablosu görülür.

E) Serolojik tanıda idrarda antijen testi kullanılır.

2-) Brucella için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fakültatif hücre içi patojenlerdir

B) B. canis en sık sığırlarda enfeksiyon etkenidir.

C) Enfekte ettikleri hayvanlarda düşüklere neden olur.

D) Rose Bengal testi (lam aglütinasyon testi) tarama testi olarak kullanılır.

E) 2 merkaptotanol testinde IgM antikorları parçalanarak Ig G antikorları saptanır

3-) Yersinia'lar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yersinia enterocolitica peritrik kirpikleri nedeniyle 22°C'de hareketli, 37°C'de hareketsizdir.

B) Yersinia enterocolitica, insanlarda hafif kendi kendini sınırlayan enterokolit, terminal ileit veya mezenterik lenfadenite yol açabilir.

C) Yersinia türleri siderofilik (demir seven) bakteriler olduğundan, kalıtsal hemokromatozlu insanlar Yersinia enfeksiyonuna karşı daha hassastır

D) Y.pseudotuberculosis veba hastalığı etkenidir.

E) Yersinia pestis Giemsa ve Wright boyası ile bipolar boyanma gösterir.

4-) İnsan ve hayvanlarda tetanus etkeni mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Clostridium tetani

B) Clostridium botulinum

C) Clostridium difficile

D) Clostridium perfringens

E) Clostridium septicum

5-) Edinsel Sifiliz'in tanısında kullanılmasının yanı sıra, hastalığın tedavisinin takibi amacıyla da kullanılan serolojik test aşağıdakilerden hangisidir?

A) VDRL veya RPR (Rapid Plasma Reagin)

B) FTA-ABS (Fluoresanli Treponema Antikor-Absorbisyon deneyi)

C) TPHA (Treponema Pallidum Hemaglütinasyon)

D) TPI (Treponema Pallidum Immobilizasyon deneyi)

E) FTA (Fluoresanli Treponema Antikor Deneyi)

6-) Erkeklerde artrit, üretrit, konjunktivit ve mukokütanöz semptomlarla karakterize Reiter

sendromunun en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) *Rickettsia rickettsii*
- B) *Mycoplasma pneumoniae*
- C) *Streptococcus pneumoniae*
- D) *Chlamydia pneumoniae*
- E) *Chlamydia trachomatis*

7-)Gazlı gangren etkeni mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) *Clostridium botulinum*
- B) *Clostridium tetani*
- C) *Clostridium septicum*
- D) *Clostridium perfringens*
- E) *Clostridium difficile*

8-)Rahim içi araç kullanan kadınlarda pelvik enfeksiyonlara neden olan gram pozitif, sporsuz, kültürde sülfür granülleri oluşturan bakteri hangisidir?

- A) *Actinomyces israelii*
- B) *Nocardia asteroides*
- C) *Bacillus anthracis*
- D) *Corynebacterium urealyticum*
- E) *Staphylococcus aureus*

9-)En önemli virülans faktörü biyofilm yapmak olan, ciltte kommensal yaşayan, çoğunlukla omuz protez eklemi implantı ilişkili enfeksiyonlar gibi enfeksiyonlara neden olan fırsatçı bir patojen aşağıdakilerden hangisidir?

- A) *P. Acnes*
- B) *E. alactolyticum*
- C) *A. propionica*
- D) *P. anaerobius*
- E) *P. Magnus*

10-)Mycobacterium tuberculosis hücre duvarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

- A) Lipoarabinomannan
- B) Peptidoglikan
- C) Arabinogalaktan
- D) Teikoik asit
- E) Mikolik asit

11-)Boğmacada C-AMP düzeyini artırarak respiratuar sekresyonların oluşumuna ve paroksizmal öksürük dönemindeki mukus üretiminin artışına neden olan toksin?

- A) Pertusis toksini
- B) Dermonekrotik toksin
- C) Trakeal toksin
- D) Lipopolisakkarit
- E) Pertaktin

12-)Borrelia burgdorferi ve enfeksiyonları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A)kompleks barbour stoenner kelly(BSK) sıvı besiyerinde 33C de üretilebilir
- B)Ixodes türü sert kenelerin ısırması ile bulaşır
- C)insanlar rastlantısal konaktır
- D)hastalığın ikinci evresinde “eritema migrans” denilen tipik deri döküntüsü görülür
- E)lyme hastalığının etkenidir. Bu hastalık akterinin invazyonuna ilaveten neden olduğu aşırı duyarlılık ve immünolojik mekanizmalarla oluşan bir hastalıktır

13-)Diphteria toksin saptamasında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

- A) Elek
- B) Shick
- C) PCR
- D) İmmunokrojik
- E) ELİZA

14-) Anaerob enfeksiyonlarda en sık izole edilen bakteri?

- A) Fusobakterium
- B) Clostridium
- C) Preptostreptococcus
- D) Treponerna
- E) Bacteroideus

15-)Anerop bakterilerde kullanılmayan antibiyotik?

- A)Sefalosporin
- B)Beta laktamaz inhibitörleri
- C) Beta laktam

...

16-) P. Aeruginosa toksinleri ve neden oldukları hasarlarla ilgili hangisi yanlıştır?

- A) Polisakkarit kapsül: hücre demir metabolizmasının bozulması
- B) Ekzotoksin A, EF-2 inhibisyonu: doku hasarı

HİSTOLOJİ

1-) Hümör aközü aşağıdaki yapılardan hangisi sentezler?

- A) lens epiteli
- B) Trabeküler ağ
- C) Pars siliaris retina
- D) Pars iridis retina
- E) Pars optica retina

2-) Epidermis tabakaların hangisinde membranla kaplı lipit bulunur?

- A) Stratum basale
- B) Stratum spinozum
- C) Stratum granülozum
- D) Stratum lusidum

E) Stratum korneum

3-) Aşağıdakilerden hangisi MSS organlarının yapısı ile ilgili yanlış bir bilgidir? (Ö.B.)

- A) MSS organlarının yapısını ak madde ve boz madde olmak üzere iki katman oluşturur.
- B) Beyin çok iyi korunduğundan boz madde organların dış yüzeyinde bulunur.
- C) Medulla spinaliste gri madde dışkısında yer alır.
- D) Beyin kökünde ise boz madde belirli yerlerde topluluklar halinde bulunur.
- E) Beyincikte gri madde dışarıda bulunur.

4-) Aşağıdakilerden hangisi insan korneasında bulunmaz? (E.Ş.)

- A) Bowman membranı
- B) Keratinosit
- C) Kollagen fibril lamelleri
- D) Hekzagonal yerleşimli Tip VIII kollagen
- E) Keratinsiz çok katlı yassı epitel

5-) Medulla spinalisteki Radiküler nöronlar ile ilgili hangisi yanlıştır?(Ö.B.)

- A) HÜCRE GÖVDELERİ ÖN VE YAN BOYNUZLARADA BULUNUR
- B) ÖN BOYNUZDAKILAR İSKELET KASINA GİDER
- C) YAN BOYNUZDAKILAR İSKELET KASINA GİDER
- D) EFFERENT NÖRONLARDIR
- E) YAN BOYNUZDAKILAR KALP KASI, DÜZ KAS VE BEZLERE GİDER.

6-) Nörolasyon embriyolojik dönemin hangi aşamasında görülür? (Ö.B.)

- A) 3. hafta
- B) 4. haftanın başı
- C) 9. hafta
- D) 19. hafta
- E) 1. Hafta

7-) Beyin boşlukları ve kanalis sentralisin iç yüzünü örten hücreler aşağıdakilerden hangisidir?

- A) mikroglialar
- B) astrositler
- C) ependim hücreleri
- D) fibroblastlar
- E) purkinje hücreleri

8-) Reissner membranı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (E.Ş.) A) Yüzey ektodermi ve mezodermden köken alan tabakaları vardır.

- B) Vücudun kan damarı içeren tek epitel örtüsüyle döşelidir.
- C) Skala timpani ile duktus kohlearis arasında yer alır.
- D) Diğer adı bazillar membrandır.
- E) Otokonia denen kulak taşlarını içerir.

9-) Aşağıdaki meninkslerden hangisinin yapısı trabeküler bir ağyapısı gösterir?(Ö.B.)

- A) Durameter
- B) Araknoid
- C) Piameter
- D) Periost
- E) Hiçbiri

10-) Beyin konjenital anomalilerinden hangisinde beynin tamamen veya kısmen yokluğu görülür?(Ö.B.)

- A) CRANIUM BİFİDUM
- B) ANENSEFALİ
- C) Exensefali
- D) Microsefali
- E) Hidrosefalus

11-) Aşağıdakilerden hangisi Langerhans hücrelerine özgü belirtilerden değildir?

- A) Vimentin
- B) CD 1
- C) Langerin
- D) Faktör VIII a
- E) Sitokretin

12-) Optik retinanın pigment epiteli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

13-) Kan beyin bariyeri hangi yapılar arasında bulunur?

14-) Otoakustik emisyonu sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) dış tüy hücreler

BIYOKİMYA

1-) Aşağıdaki önermelerin hangisi doğrudur?

- A) Rodopsin, zarı kateden yedi beta sarmalla karakteristik serpentin yapısına sahip bir integral proteindir.
- B) Işık absorblayan (soğuran) pigment 11-cis-retinal, rodopsinin protein bileşeni olan opsinin lys kalıntısına schiff bazı aracılığıyla bağlıdır
- C) Aktif rodopsin transdüsün (T) üzerindeki GTP'nin GDP ile yer değiştirmesini katalizler.
- D) Koku duyusu oluşurken aktif Golf GTP'den cGMP sentezleyen siliyer zar adenilil siklazını aktifleştirir.
- E) Tat duyusu nöronlarında, tetramerik reseptörler IP3 üzerinden gustadusin'e eşlenmiştir.

2-) Duyu biyokimyası ile ilgili aşağıda verilen önermelerden hangisi doğrudur (Tıbbi Biyokimya)?

- A) Tat duyusu nöronlarında, tetramerik reseptörler IP3 üzerinden gustadusin'e

eşlenmiştir.

B) Koku duyusu oluşurken aktif Golf GTP'den cGMP sentezleyen siliyer zar adenilil siklazını aktifleştirir.

C) Tat tomurcukları ileti mekanizmasında ikincil habercileri kullanmaz.

D) Koku duyusunun sonlanması bir cAMP fosfodiesteraz, [cAMP]'ni uyarı öncesi düzeyine getirerek, Golf bağlı GTP'sini GDP'ye hidrolizlemesi sonucu gerçekleşir.

E) Koku nöronları fosfolipaza eşlenen reseptörlere sahip ise, bu hücrelerde sinyalin algılanması, siliyer zardaki IP3 - kapılı Ca+2 kanallarını açan IP3'ün üretimini tetikler.