

1)Anamnezinde sol bacak ve ayağında hipertansif uyusukluk ve güçsüzlükten yakınan 50 yaşındaki bir kadında şikayetinin sebebi hangi arterin oklüzyonu olabilir?

- A) A.cerebri ant.+ B)
- A. Chroidea ant.
- C) A.carotis interna D)
- A.cerebri media
- E) A.cerebri post.

2)Postgangliyonik simpatik kolinerjik lifler adlı anatomik yapıyı/yapıları inerve eder. Boşluğa hangisi gelmelidir?

- A)m.detrusor vesicae
- B)ductus deferens
- C)gl. Lacrimalis
- D)ter bezleri+
- E)trigonum vesicae

3) Sağ gözün nazal görme alanı aşağıdaki yapılardan hangisine yansıtılmaktadır?

- A)sol corpus geniculatum lateraleye+
- B)sol tarafta sulcus calcarinusun üstü ve altına
- C)sol tractus opticus
- D)sağ göz temporal retina alanına
- E)sol radiatio opticaya

4) Aşağıdakilerden hangisi vermiş cerebelli yapısı değildir?

- A)lingula
- B)folium
- C)tuber
- D)tonsilla+
- E)nodulus

5)Arteria cerebri posterior hakkında hangisi doğrudur?,

- A)iç kulağı besleyen bir arter dalı genellikle vardır
- B)nervus facialis besler
- C) a. Basilarisin terminal dalıdır+
- D)nuclei cerebellaris besler
- E)nüc. Ambiguus besler

6)Thalamusa ait nuc. Ventralis posterolateralis adlı çekirdek ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?

- A)Taktıl diskriminasyon için önemlidir.
- B)Bazı liflerini üst ekstremiteden nüc. Cuneatus aracılığı ile alır.
- C)Bazı liflerini baş bölgesinden tr. Trigeminothalamicus aracılığı ile alır.+
- D)Bazı liflerini alt ekstremiteden nüc. Gracilis aracılığı ile alır.
- E)Buradan lifler parietal lobun gyrus postcentralisine gider

7)Otonomik ganglyonu gang. Oticum olan yapı hangisidir?

- A)gl. Submandibularis
- B)gl. Lacrimalis
- C)gl. Nasaes
- D)gl. Parotidea+
- E)gl. Sublingualis

8)Seçeneklerdeki bulgulardan hangisi öncelikle cerebellum kaynaklı bir lezyonu düşündürür?

- A)dişli çark rijiditesi
- B)hemiballismus
- C)kore
- D)intention tremor+
- E)atetoz

9)Aşağıdaki yapılardan hangisi hypothalamusa ait değildir?

- A)nüc supraopticus
- B)corpus mamillare
- C)infundibulum
- D)tuber cinereum
- E)corpus pineale+

10)Tr. Corticospinalis lateralisin lifleri ile ilgili hangisi doğrudur?

- A)capsula internanın crus posteriusunda bulunur+
- B)ağırlıklı olarak ekstremitelerin proksimal kaslarındaki istemli hareketlerden sorumludur.
- C)cortex cerebellinin dördüncü katmanındaki granüler hücrelerden çıkan aksonlar olarak başlar.
- D)üst ekstremitelerin hareketlerini kontrol eden lifler, serebral hemisferin medial tarafında gyrus paracentralisten başlar.
- E)Alt ekstremitelerin hareketlerini kontrol eden lifle, basis pedunculinin en lateral bölümünde yer alır.

11)Diencephalon hakkında seçeneklerde yazılmış ifadelerden hangisi doğrudur?

- A)Ön tarafta chiasma opticuma denk uzanır.
- B)Lateralde capsula interna ile sınırlanır+
- C)Thalamus, 3.ventrikülün iç yan duvarında yer alır.
- D)Epithalamus, substantia nigra ve nuc. Ruberin kranial uçları tarafından oluşturulur.
- E)Arkada, adhesio interthalamicaya kadar uzanır.

12)Bir otomobil kazasında boynu yaralanan biri muayene sırasında, başını yaralı taraf boynundan uzaklaştırmada zorluk yaşadığı görülmüştür. Ayrıca omuz düşüklüğü de gözlenen hastada hangi kranial sinir hasarlanmıştır?

- A)VII
- B)IX
- C)X

- D)XI+
- E)XII

13)Pia mater hangi vertebra seviyesinde sonlanır?

- A)L3-4
- B)S2-4
- C)L1-2+
- D)L4-5 E)S2-3

14)Nörotransmitter olarak nörepinefrin(NE) hangisinden salınır?

- A)pregangliyonik simpatik lifler
- B)pregangliyonik parasimpatik lifler
- C)postgangliyonik parasimpatik lifler
- D)postgangliyonik simpatik lifler+
- E)omuruliğe giden pregangliyonik lifler

15) I.a. intercostalis suprema

- II.a.intercostalis superficialis
- III.a. subcostalis
- IV.aa. lumbales
- V.aa. intercostales anteriores

Medulla spinalisi besleyen arterler aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) I-II-III
- B) I-III-IV+

16)Aşağıdaki oluşumlardan hangisi cavitas tympaninin paries medialisinde yer alır?

- A)N.facialis
- B)Plexus tympanicus+
- C)Canalis caroticus
- D)Tegmen tympani
- E)Membrana tympanica

17)Gözler kapalı iken ele yerleştirilen bir nesneyi tanıma yeteneği adlı oluşumun bütünlüğüne bağlıdır. Boşluğa hangisinin gelmesi uygundur?

- A)funiculus posterior+
- B)tractus spinocerebellaris posterior
- C)tractus spinoolivaris
- D)tractus spinospinalis
- E)tractus spinotalamicus

18)Aşağıdaki hangi çekirdekten çıkan liflere fibria arcuata externa anterior adı verilir?

- A)nüc. Arcuatus+
- B)nüc. Gracilis
- C)nüc. Ambiguus
- D)nüc cuneatus accessorius
- E)nüc olivarius inferior

19)Baş boyun bölgesine ait hafif dokunma duyusunun ikinci nöronları hangi çekirdektedir?,

- A)nüc. Principialis nervi trigemini+
- B)nüc. Tractus solitarius
- C)nüc. Spinalis nervi trigemini
- D)nüc olivarius inferior

E)nüc arcuatus

20)Seçeneklerdeki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A)Vv. Superiores cerebri,sinüs sagittalis inferiora dökülür.
- B) v. magna cerebri,sinüs sagittalis superiora dökülür.
- C) vv. superiores cerebelli, sadece sinüs rectusa dökülür.
- D) vv. Spinales,plexus venosus vertebralis externusa dökülür.
- E)sinüs sagittalis inferior,sinüs rectusa dökülür.+

21)Sfiliz hikayesi olan bir hastada alt ekstremitede pozisyon duygusu ve vibrasyon duygusu kaybı bulunmaktadır.Ayrıca hastada sinir parestezi bulunmaktadır. Özellikle alt ekstremitelerde derin tendon duygusu refleksi azalmış,yürüme zorluğu ve ataksi mevcuttur.Lezyon nerededir? A)comissura anterior

- B)funiculus anterior
- C)columna intermedia medialis
- D)funiculus lateralis
- E)funiculus posterior+

22)Hippocampusun efferent bağlantıları hakkında aşağıdaki ifadelerden yanlış olmayanı işaretleyiniz.

- A)korteksindeki purkinje hücrelerinden başlar
- B)fornix içerisinde geçer.+
- C)hiçbir lifi corpus mamillareye gitmez.
- D)fornix içerisindeki lifler foramen interventriculararenin arkasından geçer.
- E)bazı lifleri nüclei posteriores thalamide sonlanır.

23)Nuclei colliculus inferioris ile ilgili hangisi yanlıştır?

- A)Colliculus inferior adlı kabarıntının altındadır.
- B)İşitme refleks merkezidir.

C)Lemniscus medialis afferent lifler alır.+

D)Corpus geniculatum mediale efferent lifler çıkarır.

E)Karşı taraf colliculus inferior ile afferent ve efferent lifler ile bağlantılıdır.

24) Simpatik çıkış....

Üst satırdaki cümleyi hangi seçenekte yazan ifade en doğru olarak tamamlanır?

A)....medulla spinalisin cornu posteriorunda yer alan sinir hücrelerinden başlar.

B)....medulla spinalisi spinal sinirlerin radix posterioru içinde terk eden pregangliyonik sinir liflerine sahiptir.

C)....medulla spinalisin T1-L2 segmentleri arasında sınırlanmıştır.+

D)....supraspinal seviyelerden medulla spinaliste columna posterior içerisinde aşağıya inen lifler alır.

E)....spinal sinirlerin gang. Spinalelerinde sinaps yapan çok sayıda pregangliyonik sinir lifleri vardır.

25)Dış kulak yolu ve zardaki işlemlerde bayılmanın ve bradikardinin nedeni hangi kranial sinirle ilişkilidir

A)n. vestibulocochlearis

B)n. glossopharyngeus

C)n.opticus

D) n. facialis

E)n. vagus+

26)Horner sendromu hakkında seçeneklerde yazılmış ifadelerden hangisi yanlış değildir?

A)pupilla dilate durumdadır.

B)üst göz kapağı retractedir

C)hastanın yüz derisi arteriollerinde vazodilatasyon vardır.+

D)yüzde aşırı terleme vardır.

E)exophthalmus mevcuttur.

27)Arteria carotis internanın sinüs cavernosus içindeki bölümü hangi kranial sinirle sıkı komşuluk yapar?

A)III

B)IV

C)V

D)VI+

E)VII

28) Aşağıdaki cümledeki boşluğu en doğru olarak tamamlayan ifadenin yazıldığı seçeneği işaretleyiniz.

Tentorium cerebelli.....

A)....nin serbest kenarı önde processus clinoideus posteriora tutunur.

B).....dura mater encephalini meningeal tabakasından oluşur.+

C).....cerebellumu cerebrumun temporal loblarından ayırır.

D).....nin occipital kemiğe tutunan kenarının içinde sinüs sigmoideus uzanır.

E).....nin ön kenarında,sinüs occipitalis vardır.

29) 12. Cranial sinir hakkında seçeneklerde yazılmış ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz.

A)Bu sinirin lezyonunda dil dışarı çıkartıldığında dil ucu lezyon tarafına kayar.+

B) Bu sinir dilin 1/3 posterior bölümünden tat alır.

C)Bu sinir sulcus retroolivariisten çıkar.

D)Bu sinire C3 ve C4 servikal sinirlerden çıkmış lifler katılır.

E)Bu sinirin santal nucleusu sadece ipsilateral cerebral korteksten afferent lifler alır.

30)Fossa rhombi deada yer alan colliculus facialis hangi kranial sinirler oluşturur?

A)V,VII

- B)VI, IV
C)V,IX
D)VI,VII+ E)X,XII

31)Cerebellumda bulunan fissura horizontalis hangi yapılar arasındadır?

- A)culmen-folium
B)lobulus quadrangularis-lobulus simplex
C)lobulus semilunaris superior –lobulus simplex
D)tuber-nodulus
E)tuber-folium+

32)Belli bir bölgeye giden aksonlar periferik sinir sisteminde ne olarak adlandırılır?

- A)tractus
B)nervus+
C)ganglion
D)lemniscus
E)fasciculus

33)Cuneus ile gyrus lingualisi hangi oluk ayırır?

- A)sulcus calcarinus+
B)sulcus collateralis
C)sulcus intraparietalis
D)sulcus parietooccipitalis
E)sulcus rhinalis

34)Gyri temporales hakkındaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A)Primer işitme alanı sulcus lateralisin alt duvarına yerleşiktir.+
B)Primer işitme alanına gelen esas projeksiyon lifleri ipsilateral corpus geniculatum lateraleye gider.
C)Wernickenin duyusal konuşma alanı dominant hemisferde gyrus temporalis inferiroadır.
D)İşitme alanının tek taraflı lezyonu her iki kulakta tam sağırılık yapar
E)Sekonder işitme alanı Broadman 41 sahasındadır.

35) Sağ elini kullanan yetişkin bir kişide sol tarafın capsula internası kanarsa aşağıdakilerden hangisinin görülmesi en olasıdır?

- A) Sol homonium heminaopsi
B) Sağ asterognozi
C) Sol hemipleji
D) Konuşmanın bozulması(afazi)+
E) Sol tarafta pozitif babinski cevabı

36)

37) 3 yaşında boynunda şişlik,

kızarıklık ile gelen hastanın servikal lenf bezinden alınan numunesinde aside dirençli basil görüldü. Besiyerinde 15. günde karanlıkta sarı-turuncu pigment oluşturan koloniler üredi. bu hastadaki en olası etken hakkında hangileri doğrudur?

- I. Etken fotokromojen grupta yer almaktadır
II. En olası etken Mycobacterium Scrofulaceum'dur.
III. Sağlıklı çocukların boğaz, solunum yollarında kolonize olabilir.

- A) yalnız I
B) yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I,II,III+

38) Granulomatosis infantiseptica'ya neden olan ve diğer etkenlere göre beyin dokusunda daha çok invazyon yapma eğiliminde olan bakteri hangisidir?

- A) *Listeria monocytogenes*+
- B) *Streptococcus pneumonia*
- C) *Neisseria meningitidis*
- D) Grup B Streptokoklar
- E) *Erysipelothrix rhusiopathiae*

39)Çoğunlukla omuz protez eklemi implant ilişkili enfeksiyonlara neden olan fırsatçı bir patojen aşağıdakilerden hangisidir?

- A) *P. Acnes*+
- B) *E. alactolyticum*
- C) *A. propionica*
- D) *P. anaerobius*
- E) *P. Magnus*

40)Mycobacterium tuberculosis ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

- A) Kord faktörü bulunmayan suşlar, fagositoya daha duyarlıdır.
- B) Gama interferon salınım test bakterinin ESAT6 proteinine karşı üretilen IFN-γ düzeyini ölçer
- C) Hastanın aktif tüberküloz enfeksiyonu olup olmadığı Tüberkulin Deri Testi (ppd) ile tespit edilir
- D) Bakteri hücre duvarında bulunan mikolik asit, aside rezistan boyanmadan sorumludur. +
- E) Tüberkülozda hücrel immün yanıtın gelişmesine neden olan bakterinin sahip olduğu polipeptid tabakadır.

41)Akciğerde kaviter pnömonisi ve beyin absesi olan immünsupresif hastadan alınan balgam örneğinde zayıf asidorezistan boyama gösteren gram pozitif basiller saptanmıştır. Olası etken ile ilgili verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?

I. Etken üst solunum yolu, gastrointestinal sistemde kolonize bulunmas nedeni ile endojen enfeksiyonlara neden olur. II. Zorunlu aerob bakterilerdir. III. Olası etken *Nocardia asteroides* tir.

- A) yalnız I
- B) yalnız II
- C) I,II
- D) II,III +
- E) I,III

42)Edinsel Sifiliz' in tanısında tarama testi olarak kullanılan ve tedavinin takibi amacıyla da kullanılan serolojik test aşağıdakilerden hangisidir?

- A)VDRL/RPR (Rapid Plasma Reagin)+
- B) FTA-ABS (Fluoresanli Treponema Antikor-Absorbisyon deneyi)
- C) TPHA (Treponema Pallidum Hemagglütinasyon)
- D) TPI (Treponema Pallidum immobilizasyon deneyi)
- E) FTA (Fluoresanli Treponema Antikor Deneyi)

43)Borrelia burgdorferi ve enfeksiyonlar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A)

Kompleks Barbour Stoenner Kelly (BS) sıvı besiyerinde, 33°C'de üretilir.

- B) İnsan vücut bitlerinin ısırması ile bulaşır.
- C) İnsanlar rastlantısal konaktır.
- D) Hastalığın birinci evresinde "Eritema migrans" denilen tipik deri döküntüsü görülür.+
- E) Lyme hastalığının etkenidir. Bu hastalık bakterinin invazyonuna ilaveten neden olduğu aşırı duyarlılık ve immunolojik mekanizmalarla oluşan bir hastalıktır.

44) 24 Yaşında kadın hasta, hafif subfebril ate ile başvuruyor. öyküsünde öksürüğünün balgamsız olduğu, eklem ağrılarının ve baş ağrısı olduğu öğreniliyor. Hastanın serumunda insan eritrositlerini +4 derecede aglutine eden antikorlar saptanıyor. En olası etken ve bu etkenin önemli bir özelliği hangi şıkta doğru eşleştirilmiştir?

- A) Streptococcus Pneumonia- Kapsül varlığı
- B) Streptococcus Pneumonia- Optokin duyarlılığı
- C) Mycoplasma Pneumonia- antibiyotiklere dirençli hücre duvarı varlığı
- D) Mycoplasma Pneumonia-Hücre membranında Sterol varlığı+
- E) Mycoplasma Pneumonia - Zorunlu hücre içi bakteri olması

45)Sulu, kanlı ishal ve ateş ile seyreden gastroenteritti hastanın gaita örneğinden yapılan kültürde Yersinia enterocolitica izole edilmistir. Asagidakilerden hangisi bu mikroorganizmanın özelliklerinden değildir?

- A) 22°C'de hareketli, vücut ısısında hareketsiz
- B) soğuk ortamda üreme özelliği
- C) Bipolar boyanma
- D) siderofilik bakterilerdir
- E) Zorunlu hücre içi bakterilerdir+

46) Gazli gangren etkeni mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Clostridium botulinum
- B) Clostridium tetani
- C) Clostridium septicum
- D) Clostridium perfringens+
- E) Clostridium difficile

47)B. cepacia complex enfeksiyonlarının gelişmesinde sıklıkla karşılaşılan predispozan faktörlerden olmayan hangisidir?

- A) Solunum yolu ile uygulanan ilaçların veya antiseptiklerin kontaminasyonu
- B) Genis spektrumlu antibiyotik tedavisi
- C) Pirinç tarlalarında çalışan çiftçiler
- D) Mekanik ventilasyon
- E) Kistik fibrozis+

48)Anaeroplara tedavisinde kullanılmayan antibiyotikler aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Aminoglikozitler+
- B) Beta- laktamlar
- C) Sefalosporinler
- D) Kinolonlar

E) Betalaktamaz inhibitörleri

49)Genç erişkinlerin %100'ünün dış eti yanıklarında bulunan enfeksiyon etkeni mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Clostridium botulinum
- B) Provotella melaninogenica
- C) Treponema denticola+
- D) Treponema perfringens
- E) Clostridium septicum

50)Legionella pneumophila ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

- A) Fagolizozom füzyonunu inhibe ederek hücre içinde yaşamını sürdürür.
- B) Kültürde üreyebilmesi için besiyerlerine L-cystein ve demir eklenmesi gereklidir.
- C) Bulaşmada en önemli kaynaklar; duş başlıkları, kaplıca havuzu, göl, akarsu gibi doğal su kaynaklarıdır.
- D) Pontiac ateşte, pnömoni, SSS, karaciğer ve böbrekleri tutan sistemik enfeksiyon tablosu görülür.+
- E) Serolojik tanıda idrarda antijen testi kullanılır.

51) Corynebacterium diphtheria ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

- A) Kültür için kanlı agar, Löffler serumu, potasyum tellüritli besiyeri, Tinsdale besiyeri, kolistin-nalidiksik asit besiyeri kullanılabilir.
- B) Toksin etkisini protein sentezindeki elongasyon faktörünü (EF2) inhibe ederek gösterir.
- C) Toksinin bağlandığı reseptör heparin bağlayan epidermal büyüme faktörüdür.
- D) Bakterinin toksin salgılayabilmesi için beta-fajı ile enfekte olması gereklidir.
- E) Kültürde üreyen bakterilerin toksijenik olup olmadığı Schick Testi ile araştırılır.

52)P. aeruginosa ile ilgili genel özelliklerden yanlış olanı işaretleyiniz. A)Sitokrom oksidaz aktivitesi yoktur.

B)Katalaz pozitifdir.

C) Karbonhidratları fermente etmez.

D) Biofilm oluşumunda önemli olan bir polisakkarit (Alginat) salgılar.

E) Kültürlerde piyosianin gibi pigmentler gözlemlenebilir.

53) Rickettsia ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? I.

Zorunlu intraselüler bakterilerdir.

II. Kendi ATP'sini sentezleme yeteneğine sahip değildir III.

Rickettsia enfeksiyonlarının tedavisinde FTA-ABS kullanılır.

IV. Damar endotel hücrelerini enfekte ederek vaskülit neden olur.

A) I ve II

B) I, III ve IV

C) I, II ve IV

D) I ve IV

E) II ve IV

54) Doğada toz, toprak, gübre dahil her yerde bulunan, sıklıkla boyun ve ense kaslarında şiddetli kasılmalara neden olduğu bilinen hastalık etkeni mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Clostridium tetani

B) Clostridium botulinum

C) Clostridium difficile

D) Clostridium perfringens

E) Clostridium septicum

55) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Brucella Melitensis en sık görülen en virulan türdür.

B) Brucella türleri eritritol den zengin dokulara yerleşme eğilimindedir.

C) Brucella Canis Wright testinde antijen olarak kullanılır.

D) Brucella türleri kapsülsüz, hareketsiz, gram negatif kokobasilidir.

E) Brusellozis'de tarama testi olarak Rose Bengal, kesin tanı olarak Wright Tüp Aglütinasyon kullanılır.

56) Beyin boşlukları ve kanalis sentralisin iç yüzünü örten hücreler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mikrogliallar

B) Astarositler

C) Ependim hücreleri

D) Fibroblastlar

E) Purkinje hücreleri

57) Beyin konjenital anomalilerinden hangisinde beyin tamamen veya kısmen yokluğu görülür?

A) Cranium bifidum

B) Anensefali

C) Exensefali

D) Mikrosefali

E) Hidrosefalus

58) Epidermal tabakalardan hangisinde intrasitoplazmik membranla kaplı lipidler bulunur?

A) Str. bazale

B) Str. spinosum

C) Str. Granüloz

D) Str. lüsium

E) Str. Korneum

59) Aşağıdakilerden hangisi otoakustik emisyon sağlar?

- A) Bazilar membran
- B) Tektoryal membran
- C) ic t y h creti
- D) Dış t y h creti+
- E) Stria vask laris

60) Hum r ak z aŗaēıdakilerden hangisi tarafından sentezlenir?

- A) Pars siliaris retina+
- B) Pars iridis retina
- C) Pars optika retina
- D) Lens epiteli
- E) Trabek ler aē

63)Medulla spinalisteki Radik ler n ronlar ile ilgili hangisi yanlıŗtır?

- A) H cre g vdeleri  n ve yan boynuzlarda bulunur
- B)  n boynuzdakiler iskelet kasına gider
- C) Yan boynuzdakiler iskelet kasına gider
- D) Efferent n ronlardır
- E) Yan boynuzdakiler kalp kası,d z kas ve bezlere gider

64)Optik retinanin pigment epiteli ile ilgili olarak asagidakilerden hangisi yanlıŗtır? A)

Melaninden zengin olduēu i in ıŗıēı absorbe eder, arkaya ge işini engeller.

- B) Tek sıra halindeki h creleri, fotoresept rlere komŗu olan bazal membran  zerine oturur.+
- C) A vitamini esterleŗmesinde rol alır.
- D) Dejenere olmuŗ basil disk membranlarını fagosit eder.
- E) Embriyolojik olarak  n beyin vezik l n n n roektoderminden koken alır

65)Aŗaēıdaki meninkslerden hangisinin yapısı trabek ler bir aē yapısı g sterir?

- A) Durameter

- B) Araknoid+
- C) Piameter
- D) Periost
- E) Hi  biri

66) Aŗaēıdakilerden hangisinde perilenf bulunur?

- A) Duktus Renuiens
- B) Skala media
- C) Utrikul
- D) Sakk l
- E) Helikotrema+

67) Aŗaēıdakilerden hangisi normal koŗullarda insan korneasında bulunmaz?

- A) Bowman membranı
- B) Keratosit
- C) Stromal lamellalar
- D) Kan damarı +
- E) Endotel

68)Aŗaēıdakilerden hangisi Langerhans h cresine  zg  bir belirte  deēildir?

- A) Sitokeratin CK20+
- B) Langerin
- C) Bierbeck gran l 
- D) Vimentin
- E) CDI

69) Reissner membranı hakkında aŗaēıdakilerden hangisi doērudur?

- A) Y zey ektodermi ve mezodermden k ken alan tabakaları vardır.+

- B) Vücutun kan damar içeren tek epitel örtüsüyle döşelidir.
- C) Skala timpani ile duktus kohlearis arasında yer alır.
- D) Diğer adı bazillar membrandır.
- E) Otokonia denen kulak taşlarını içerir.

70)Nörülasyon embriyolojik dönemin hangi aşamasında görülmeye başlar?

- A) 3.hafta
- B) 4.HAFTANIN BASI+
- C) 9.HAFTA
- D) 19. HAFTA
- E) 1. HAFTA

71)Aşağıdakilerden hangisi MS organlarının yapısı ile ilgili yanlış bir bilgidir?

- A) MSS organlarının yapısını ak madde ve boz madde olmak üzere iki katman oluşturur.
- B) Beyin çok iyi korunduğundan boz madde organların dış yüzeyinde bulunur.
- C) Medulla spinaliste gri madde dış kısımda yer alır.+
- D) Beyin kökünde ise boz madde belirli yerlerde topluluklar halinde bulunur.
- E) Beyincikte gri madde dış alanda bulunur.

72- Aşağıdaki genel duyulardan hangisi yüzeysel duyu değildir?

- A)Temas
- B)Ağrı
- C)Vibrasyon+
- D)Isı
- E)İki nokta diskriminasyonu

73)Dominant hemisferdeki Wernicke kortikal bölgesindeki bir lezyon hangi semptomu neden olur?

- A)Bozulmuş dil becerileri+
- B)Bozulmuş motor becerileri
- C)Yeni anılar oluşturmama
- D)Gelecekteki anıları planlayamama
- E)Azaltılmış serebellar aktivite

74)Aşağıdakilerden hangisi glokom,iskemi,diyet ve kalıtsal fotoreseptör dejenerasyonu dahil olmak üzere birçok retina hastalığında nöron kaybının ana nedenidir?

- A)GABA toksititesi
- B)Glutamat toksititesi
- C)Sistein toksititesi
- D)Glisin toksititesi
- E)Alfa ketoglutarat toksititesi

75) Talamusun medial genikülat çekirdeği işitsel duyuusal bilgiyi inferior kollikulustan alır ve bunu temporal lobdaki birincil işitsel kortekse yansıtır.

Doğru+

76)Bir tek nöronu uyarmak için çok sayıda uyarının o nöronda toplanmasına ne denir?

- A)Konverjans+
- B)Diverjans
- C)Jeneratör potansiyel
- D)Fasilitasyon
- E)Jeneratör potansiyel

77)Iggo kubbe reseptörü içinde bulunan ve epiderminin bazal tabakalarında yer alan reseptör hangisidir?

- A)Meissner
- B)Merkel
- C)Kıl dibi reseptörü
- D)Thermoreseptör

E)Nositseptör

78)Yavaş dalga uykusunda kalp hızı ..., REM uykusunda ... dir.

A)düzenli,değişken

B)değişken,düzenli

C)artar,azalır

D)değişmez,değişmez

E)değişken,değişken

79)Aşağıdakilerden hangisi Klüver Bucy sendromunun geliştiği bir canlıda gözlenmez?

A)Nesnelerde uygunsuz çiftleşme

B)İştahsızlık

C)Sakinlik

D)Hafıza kaybı

E)Görsel agnazi

80)İşite duyusunu taşıırken kohleanın tabanına yakın sert kısa lifler düşük frekanslarda en yüksek düzeyde titreşim gösterirken kohleanın tepesi civarındaki uzun ince lifler daha yüksek frekansta en yüksek düzeyde titreşim gösterir.

Yanlış+

81)Otonom sinir sisteminin parasempatik alt bölümü, çok genel anlamda, sistemin “dinlenme ve sindirme” kısmıdır.

Doğru+

82)Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)İnsanlarda umaminin tadı, amino asitlerden GABA’nın tadıdır.

B)T2R3 şekerleri tanır.

C)T2R reseptör ailesi acı tat algılamasına aracılık eder.+

D)Ekşi tad, glikoller, aldehitler, alkoller ve diğer organik kimyasallar dahil olmak üzere çeşitli reseptör türlerinin aktivitesinden kaynaklıdır E)Tat tomurcukları sadece dilde bulunur.

83)Aşağıdakilerden hangisi terminal plakta arttığı zaman astilkolin salınımı inhibe olur?

A)Sodyum

B)Magnezyum+

C)Potasyum

D)Kalsiyum

E)Klor

84)Kaudat çekirdek ve putamenden globus pallisuda ve substantia nigraya uzanan sinir liflerinin aksonları tarafından salgılanan nörotransmitter hangisidir?

A)Norepinefrin

B)Serotonin

C)Dopamin

D)Asetilkolin

E)GABA+

85)Aşağıdakilerden hangisi “ileri bilgi işleme” için en küçük işlevsel birimi temsil eden bir retina nöronları sütunun çekirdeğini oluşturur?

A)Amakrin hücre

B)Bipolar hücre

C)Ganglion hücresi

D)Yatay hücre

E)Müller hücresi+

86)Bir reseptörde uyarının cinsi ne olursa olsun reseptör yanıtı elektrikseldir.

Yanlış+

87)Fotoreseptör hücreler, vücuttaki tüm hücreler arasında en yüksek oksidatif metabolizma oranına sahip hücrelerdir.

Doğru+

88)Çoğu nöron etraflarındaki hücrelerarası sıvının Ph değişimlerine çok duyarlıdır.

*Normal şartlarda alkaloz nöron uyarılabilirliğini artırır.

Doğru+

89)Aşağıdakilerden hangisi Kan-Beyin bariyerine katılan nöroglia hücrelerdendir?

A)Ependim

B)Schwann

C)Oligodentrosit

D)Astrosit+

E)Mikroglia

90)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) X hücrelerinin sinyalleri ayrı retina konumlarını temsil eder ve görsel görüntülerin ince ayrıntılarını iletir.

B) X hücrelerinin küçük alanları vardır çünkü dentritleri retinada geniş bir alana yayılmıştır.

C)X hücreleri, optik sinir liflerinde sinyalleri yavaş bir hızda iletir+

D)Her X hücresi en az bir koniden girdi alır

E)X hücresi iletimi muhtemelen renkli görüşten sorumludur

91)Ağrı sinyalleri üst merkeze iki yolla taşınır, bu yollardan keskin/hızlı deskriminatif olmayan yol ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)Miyelinsiz C lifleri görevlidir

B)Salınan nörotransmitter P maddesidir.

C)Birinci sıra lifler medulla spinaliste arka köklerdeki Lamina 2 ve 3'te sonlanır

D)Yavaş ağrıyı taşırlar

E)Diğer ağrı yolağına göre bu yol çok daha yeni olup, spino-retikülo-talasamik,...+

92)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Talamusun lateral genikülat çekirdeği, oksipital lobun görsel korteksine gitmek için retinadan görsel duyuusal bilgiyi alır.

B)Talamusun ventral posteromedial çekirdeği yüzle ilgili trigeminal sinirden duyuusal bilgiyi alır.

C)Talamusun retiküler çekirdeği talamusun ventral kısmındadır.

D)Talamus tad almad dışında, her duyuusal sistemin bilgisini alan, işleyen ve ilişkili kortikal alana gönderen bir talamik çekirdeğe sahiptir.+

E)Genel olarak talamus, beyin ve vücut arasındaki bilgileri filtreleyen bir aktarma istasyonu görevi görür.

93)İşitme Sisteminde Tüy hücresi depolarizasyonu sırasında yalnız eksitator nörotransmitter olarak salınan temel nörotransmitter hangisidir?

A)Asetilkolin

B)Glutamat+

C)Nöroadrenalin

D)GABA E)NO

94)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Fokal nöbetler aynı anda her iki serebral hemisferden kaynaklanıyor gibi görünmektedir.

B)Fokal nöbet, limbik sistemi veya beynin yeterince büyük bölgesini içeriyorsa bilincin bozulması muhtemeldir.

C)Jeneralize başlangıçlı nöbetler genellikle genetik bir yatkınlığa sahiptir+

D)Juvenil miyoklonik epilepsi kalıcıdır.

E)Lennox-Gastaut sendromu jeneralize tonik-eksenal, atonik ve atipik absans karakterleri ile nötralizedir.

95)Bir kas ipçiği reseptöründe dinamik yanıtta hangi tip kas lifi sorumludur?

A)Ekstrafüzal kas lifi

B)Statik nükleer torba lifi

C)Nükleer zincir lifi

D)Dinamik nükleer torba lifi

E)Düz kas lifi

96)Aşağıdakilerden hangisi sağ horizontal semisirküler kanaldaki tüy hücrelerini maksimum uyarır?

A)Tüy hücrelerinin hiperpolarizasyonu

B)Stereosilasyonun bükülerek kinosilyumdan uzaklaşması

C)Bir asansörle hızla yükselme

D)Başın sağa doğru rotasyonu+

E)Arabayla ön arka yönde hızlanma

97)Serebellumun lateral semiflerlerinin(serebrocerebellum) fonksiyonel rolünü en iyi ifade eder?

A)Aksiller kasların yanı sıra omuz ve kalçanın hareketlerini kontrol ve koordine etmek

B)Distal ekstremitelerdeki kasların kontrol hareketleri

C)Hareketleri planlamak için serebral korteks ile işlev görür+

D)Motor nöronları omuriliğe olan bağlantıları yoluyla uyarırlar

E)Medulladaki vestibular merkezlerle irtibatlıdır

98)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Tip1 glial benzeri destekleyici hücreler Na⁺ kanallarını eksprese ederler ve sodyumun(tuz tadının) algılanmasında katkıda bulunurlar

B)Tip2 tat alma reseptör hücreleri mikrovillileri tomurcuğun apikal yüzeyinde keratanize olmayan “gözenek” bölgesine ulaştırırlar

C)Tip3 presinaptik reseptör hücreleri doğrudan acı tat ile uyarılırlar+

D)Tip3 presinaptik reseptör hücreleri uyarıldığında serotonin, nöroepinefrin ve GABA salgılanır

E)Tip 4 bazal ön-madde hücreleri tat tomurcuğu hücre yenilenmesi için sorumlu değildir

99)Kalıcı hafıza oluşumunda rolü yoktur?

A)Sinaptik fasilitasyon

B)Sinaps sayısında artma

C)Tekrar

D)Kodlama

E)Kavrama+

100)Dorsal lateral genikülat çekirdek sistemindeki magnosellüler katmanlar renk bilgisini iletir.

Yanlış+

HAZIRLAYANLAR:

HASAN BASRİ TAHTALI

ZEHRA BOSTAN

RUKEN YILDIZ

