

2.SINIF 5. DERS KURULU

HALK SAĞLIĞI VE ENFEKSİYON ETKENLERİ

DERS ADI	SORU SAYISI
HALK SAĞLIĞI	31
BİYOKİMYA	36
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ	33

HAZIRLAYANLAR
Alperen Kondakçı
Alper Cerrah
Bilal Yılmaz
Egemen Erkekoğlu

BİYOKİMYA

1) Aşağıdaki lipoproteinlerden hangisi ters kolesterol taşınması sırasında doğrudan hücre içine alınmadan kolesterol transferi yapar?

A) HDL-K

2) Aşağıdaki durumlardan hangisinde hem trigliserit hem kolesterol birlikte artar?

A) Tip III hiperlipidemi

3) Abetalipoproteinemide aşağıdaki bulgulardan hangisi beklenmez?

A) LDL artışı

4) Bir hastaya heparin uygulandıktan sonra plazma trigliserit düzeylerinde hızlı düşüş gözleniyor. Bu durum aşağıdaki enzimlerden hangisinin aktivasyonu ile açıklanır?

A) Lipoprotein lipaz

5) Kronik inflamasyonda makrofaj aktivasyonunu artıran sitokin hangisidir?

A) IFN-gama

6) Aşağıdaki sitokin-fonksiyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) IL-4 -> Makrofaj aktivasyonu

7) Aşağıdaki sitokinlerden hangisi antiinflamatuvar etki gösterir?

A) IL-10

8) Sitokinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Etkileri yalnızca tek bir hücre tipi ile sınırlıdır

9) Demir eksikliği anemisinde aşağıdaki değişikliklerden hangisi erken dönemde görülür?

A) Ferritin depolarının azalması

10) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) Selenyum -> Glutatyon peroksidaz bileşeni

11) Bir elementin esansiyel kabul edilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Eksikliğinde oluşan bozukluğun o element verilince düzelmesi

12) Aşağıdaki faktörlerden hangisi demir absorpsiyonunu artırırken aynı zamanda klinikte tedaviye eşlik eden bir strateji olarak kullanılır?

A) Askorbik asit

13) Aşağıdaki moleküllerden hangisi reaktif oksijen türü (ROS) olmasına rağmen serbest radikal değildir?

A) Hidrojen peroksit

14) Serbest radikallerin hücre membranında en fazla hasar oluşturmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoklu doymamış yağ asitlerinin varlığı

15) Haber-Weiss reaksiyonu için aşağıdakilerden hangisinin birlikte bulunması gerekir?

A) $O_2^{\bullet-}$ ve H_2O_2

16) Aşağıdaki olaylardan hangisi büyüme faktörlerinin hücre proliferasyonunu başlatma sürecinde en erken basamaktır?

A) Büyüme faktörünün reseptöre bağlanması

17) Mutasyona uğramış ras onkogeninin sürekli aktif kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) GTPaz aktivitesinin azalması

18) Oksidatif stresin değerlendirilmesinde kullanılan aşağıdaki belirteçlerden hangisi lipid peroksidasyonunu yansıtır?

A) Malondialdehit (MDA)

19) Tip I glikojen depo hastalığında hangi enzim eksiktir?

A) Glukoz-6-fosfataz

20) Aşağıdaki özelliklerden hangisi erb-B2 (HER2) onkogeninin kanser oluşturuu etkisini açıklar?

A) Tirozin kinaz aktivitesinin sürekli aktif olması

21) Beslenme biyokimyasında besin ögeleri sınıflandırması yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi yapı substratları sınıflandırması içerisinde yer almaktadır?

A) Purin bazları

22) Medüller tiroid CA için mükemmel bir tümör belirteci olarak gösterilen molekül hangisidir?

A) Kalsitonin

23) Aynı hastadan eş zamanlı olarak farklı şekillerde AKş ölçümü yapılacak olsaydı, en yüksek değer hangisinde çıkardı?

A) Arterial kan serumunda

24) Aşağıdakilerden hangisi tümör belirteçleri test sonuçları değerlendirilirken göz önüne alınması gereken iatrojenik faktörler arasında yer almaz?

A) Test analizinde kullanılan metot

25) Aşağıdakilerden hangisi tümör belirteçleri için alınan numunelerde, test sonuçlarını etkilemesi muhtemel invitro faktörler arasında yer almaz?

A) Prostat infarktları

26) Az sayıda organa spesifik tümör belirteçlerinden biri olan ve serum düzeyi sirkadyen değişim göstermeyen hangisidir?

A) PSA

27) Beslenme biyokimyası açısından değerlendirilince, temel besin ögelerimizden en fazla kcal/g içeren gıda hangisi olabilir?

A) Trigliseritler

28) Sağlıklı beslenme kavramları arasında yer alan RDA için yanlış ifade hangisi olabilir?

A) Yaş, RDA için etken olarak kabul edilemez

29) Hangisi, gestasyonel diyabetin ortaya çıkma riskini artıran etkenler arasında yer almaz?

A) Önceki gebelikte makrozomi olmaması

30) Aşağıdakilerden hangisi tamamen ketojenik bir amino asittir?

A) Lizin

31) Karbonhidrat metabolizması bozuklukları sınıflandırması arasında yer almayan ifade hangi seçenekte yer almaktadır?

A) Ekskresyon bozuklukları

32) İdrarda FiGlu (formiminoglutamik asit) artışı, temel olarak vücutta folik asit (vitamin B9) eksikliğini gösteren spesifik bir metabolik bulgudur. amino asidinin metabolizması sırasında tetrahidrofolat (THF) eksikliği nedeniyle FiGlu parçalanamaz ve idrarla atılır.

Yukarıdaki boşluğa hangi amino asidin gelmesi gereklidir?

A) Histidin

HALK SAĞLIĞI

33) Atipik fenilketonüri (PKU), klasik PKU'dan farklı olarak, vücutta fenilalanin amino asidini dönüştüren Fenilalanin Hidroksilaz (PAH) enziminin kendisinden değil, bu enzimin çalışması için gerekli bir kofaktör olan metabolizmasındaki eksiklikten kaynaklanan nadir bir genetik metabolizma hastalığıdır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Tetrahidrobiopterin (BH4)

34) Albinizm ve arasındaki ilişki, vücudun renk pigmenti olan melanin üretimi sürecindeki temel bir biyokimyasal aksaklığa dayanır. Albinizm, amino asidinin melanin pigmentine dönüştürülememesi sonucu ortaya çıkan genetik bir durumdur.

Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken amino asit hangisidir?

A) Tirozin

35) Vücuda alınmış benzoik asit ve fenilasetik asit türevi ksenobiyotikler glisinle konjuge edilerek suda çözünür hale dönüşmekte ve olarak idrarla atılmaktadır.

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Hipurik asit

36) Sitokrom P450 (CYP450) enzim ailesi, vücuda dışarıdan giren ilaçlar, toksinler ve çevresel kimyasallar gibi ksenobiyotiklerin karaciğerde metabolize edilip vücuttan atılmasını sağlayan temel Faz I oksidasyon enzimleridir. Bu fazda genellikle yoluyla ksenobiyotikler suda daha çözünür hale getirilirler.

Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?

A) Hidroksilasyon

37) Bir ilde son üç yılda genç erişkinlerde intihar hızı belirgin biçimde artmıştır. Üniversite hastanesi psikiyatri kliniği şefi, il sağlık müdürlüğüne şu planı sunar:

"İlimize 20 yeni psikiyatrist alınmalı, depresyon hastaları için hızlı erişimli poliklinikler kurulmalı ve tüm aile hekimlerine, başvuran hastalarda depresyon tanısını koyma eğitimi verilmelidir. Böylece başvuran kişilerde erken tanı koyup tedavi başlatarak intihar oranlarını düşürebiliriz."

Toplumda intihar oranlarını düşürmek için yapılan plandaki en temel hata ve gereken yaklaşım aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Plan yalnızca başvuranlara yöneliktir, sektörler arası ve topluma ulaşan önleyici müdahaleler eklenmelidir.

38) Türkiye de ve Dünya'da hastalık yükü çalışmalarına bakıldığında IHME'nin hesaplamalarında kas iskelet sistemi hastalıklarının ilk 10 ölüm sebebi arasında yer almadığı, ancak hastalık yükü hesaplamalarında üst sıralarda yer aldığı görülmektedir. Bunun temel sebebi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Düşük mortaliteye ve uzun süreli yetiyimi ve yüksek prevalans birleşimi nedeniyle DALY hesabında YLD bileşeni baskındır.

39) Sakarya'nın bir ilçesinde son 6 ayda 0-5 yaş grubunda akut gastroenterit başvuruları belirgin biçimde artmış, üç çocuk dehidratasyon nedeniyle hastaneye yatırılmıştır. İlçe sağlık müdürü yapılan değerlendirme toplantısında şu kararı açıklar:

"Devlet hastanesinin pediatri servisine ek 10 yatak kuruyoruz, acil servise ikinci bir çocuk hekimi atıyoruz ve aile hekimlerine ishalleri çocuklarda oral rehidratasyon ve erken sevk konusunda hizmet içi eğitim veriyoruz. Bu önlemlerle vaka yönetimini güçlendirip mortaliteyi sıfırlayacağız."

Bu kararın temel eksikliği ve öncelikli olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vakaların kaynağı araştırılmadan tedaviye odaklanılmıştır; içme suyu ve kanalizasyon altyapısı denetlenip saha incelemesi yapılmamıştır.

40) TC Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu, ülkede artan kanser yükünü tartışmaktadır. Onkoloji derneği başkanı kurula şu öneriyi sunar:

"Önümüzdeki 5 yılda kanser ölümlerini azaltmanın en rasyonel yolu, üçüncü basamakta yeni onkoloji merkezleri açmak, immünoterapi ve hedefe yönelik tedavi ilaçlarını geri ödeme kapsamına almak ve onkoloji uzmanı olmayan alan uzmanı atamasıdır. Kaynakları doğrudan yeni almış hastaların sağkalımını uzatacak girişimlere yönlendirmeliyiz."

Bu öneriyle ilgili temel sorun ve kurulun benimsemesi gereken öncelikli yaklaşım aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Tedavi merkezli yaklaşım yetersizdir; tütün kontrolü, HPV aşılama ve tarama programları önceliklendirilmelidir.

41) TÜİK'in bir son çalışmasında ülkedeki diyabet yükünün azaltılmasına yönelik plan görüşmelerinde şu görüş savunulur:

"Tip 2 diyabet temelde insülin direnciyle karakterize bir biyolojik bir bozukluktur. Ülkemizde diyabet yükünü azaltmanın en etkili yolu, 35 yaş üstü yüksek riskli bireylere düzenli HbA1c taraması yapmak, tanı alanlara tedavi başlayıp yaşam tarzı danışmanlığı vermektir. Toplum düzeyindeki müdahaleler, hasta olanlara yönelik girişimler kadar maliyet-etkin değildir."

Bu milletvekilinin yaklaşımındaki temel hata ve en uygun düzeltici karşı argüman aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Hastalık yükü bireysel biyoloji ve klinik bakıma indirgenmiştir; sosyal belirleyiciler ve gıda endüstrisine yönelik düzenleyici politikalar göz ardı edilmiştir.

42) Bir hasta bulantı-kusma, karın ağrısı şikayeti ile üniversite hastanesine başvurarak poliklinikte muayene olmuş, zatürre tanısıyla reçetesi alınmış ve evinde 5 gün istirahat etmiştir. Durum ilerleyince bulunduğu ilçedeki devlet hastanesinin acil servisine başvurmuş, orada da poliklinik reçetesine bir ilaç eklenmiş ve evine dönmüştür. Birkaç günde durum geçmeyince hasta tekrar üniversite hastanesine gitmiş, yatış verilmiş ve 4 gün serviste yatmıştır.

Hastanın almış olduğu tedavi edici hizmetin basamaklandırılması sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) birinci – birinci - üçüncü

43) Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, beş yıllık yeni bir "Ulusal Obezite Kontrol Programı" geliştirmektedir. Yürütme kurulu, programa ilişkin aşağıdaki alt faaliyet kalemlerini belirlemiştir:

Türkiye'deki obezite prevalansının yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik gruplara göre haritalandırılması ve yol haritası belirlenmesi

Üç pilot ilde uygulamanın başlatılması ve veri toplanması

Belediyeler, Milli Eğitim Bakanlığı ve gıda endüstrisi paydaşlarıyla işbirliği protokollerinin imzalanması

Beş yıl sonunda ulaşılabilecek somut hedeflerin ve performans göstergelerinin (KPI) tanımlanması

Pilot illerden gelen verilerle planlanan-uygulanan arasındaki sapmaların ve kök nedenlerin analizi

Bulgular ışığında programın revize edilerek ülke geneline yaygınlaştırılması

Bu faaliyetlerin PUKÖ döngüsüne uygun yönetim sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 - 4 - 3 - 2 - 5 - 6

44) Ahmet Bey 15 yaşında başladığı sigarayı 20 yıl kullandıktan sonra 35 yaşında akciğer kanseri tanısı alıyor. Kanser tedavi süreci 10 yıl sürüyor ve 45 yaşında vefat ediyor. 45 yaşında erkekler için hesaplanan beklenen yaşam süresine göre beklenen ölüm yaşı 80'dir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre AC kanseri için hesaplanacak YLD (years lost with disability) için kullanılacak katsayı 0.4'tür.

Bu durumda Ahmet Bey için hesaplanan engelliliğe uyarlanmış yaşam yılı, yani hastalık yükü (DALY) kaçtır?

A) 39

45) Dr. Ahmet Bey, görev yaptığı ilde yeni gelişen bir salgın planlama toplantısına davet edilmiştir. Yapılan toplantıda sürü bağışıklığının sağlanması için toplumun ne kadarının aşılması gerektiği tartışılmaktadır. Bu nüfus 100 bindir. Enfekte bir kişi bu bulaşıcılık döneminde ortalama 2 kişiye hastalığı bulaştırmaktadır. Yapılacak aşının ise bağışıklık oluşturma oranı %80'dir, yani her yapılan 10 aşıdan 8'i bağışıklık oluşturmaktadır. Bu durumda kaç bin kişiye aşı sipariş edilmesi gerekir?

A) 62.500

46) Aile hekimi Dr. Zeynep Hanım, bir salı sabahı poliklinikte aşağıdaki beş hastayı sırasıyla muayene etmiştir. Her hastanın bu durumu güncelleştirilecek ve uygun aşılar planlanacaktır.

1. Hasta: 6 aylık bebek, vücut sıcaklığı 38.7°C, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları mevcut. Aile, takvim gereği bugün **KPA(PCV)** dozunun yapılmasını istemektedir.

2. Hasta: 28 yaşında, 8 haftalık gebe kadın. Kayınvalidesinde aktif kızamık olduğunu öğrenmiş ve temas profilaksisi için **KKK(MMR)** aşısı talep etmektedir.

3. Hasta: 35 yaşında erkek, böbrek nakli sonrası 6. ayında, immünosupresif tedavi almakta. Koruma amacıyla Rotavirüs aşısı önerilmiştir.

4. Hasta: 11 yaşında kız çocuğu, 3 ay önce kök hücre nakli olmuş. Anne, "okulda kızamık vakaları var" diyerek **KKK (MMR)** aşısının yapılmasını istemektedir.

5. Hasta: 45 yaşında kadın, yolda düşmüş, yaralanmış, gelecek 1 ayda gebelik planlıyor. **ASM'**de tetanoz aşısı yaptırmak istemektedir.

Dr. Zeynep Hanım'ın bu hastalara yaklaşımı değerlendirildiğinde, aşı uygulamasının kontrendike olmadığı hastalar hangisidir?

A) 5. Hasta – ASM'de tetanoz uygulayabilir.

47) Bir Güneydoğu Anadolu ilçesinde son üç ayda kadınlarda kıl kurdu (Enterobius vermicularis) vakaları belirgin biçimde artmıştır. İlçe sağlık yönetimi bir kriz toplantısı düzenlemiş ve ekipler aşağıdaki dört müdahale paketini önermiştir:

1-Yeni vakaları tedavi etmek için ilçe hastanesinde özel bir parazitoloji birimi açılması, sistemik tedavi protokollerinin standartize edilmesi.

2-Risk taşıyan mahallelerde evde vaka taraması yapılarak henüz semptom farkına varmamış bireylerin erken tespit edilmesi.

3-Yağmur sularının birikebilecek bozuk kanalizasyon ağının yenilenmesi, çöp birikim alanlarının kaldırılması, ahır ve iç içe yerleşimlerin imar planıyla ayrıştırılması.

4-Parazitin üreme alanlarına insektisit uygulanması ve halka cibinlik ile koruyucu giysi dağıtılması.

Hastalık önleme basamakları sınıflandırmasına göre bu müdahaleler sırasıyla hangi basamaklara karşılık gelmektedir?

A) 1: Üçüncül – 2: İkincil – 3: Primordial – 4: Birincil

48) Sağlık Bakanlığı, gelecekteki olası bir influenza virüsü pandemisi için Ulusal Pandemi Hazırlık Stratejisi geliştirmektedir. Çeşitli uzmanlardan oluşan beş kişilik bir alt komisyon, stratejinin ana yaklaşımı için aşağıdakilerden öneriler sunar:

Üye 1: "Önceliğimiz üçüncü basamaktaki yoğun bakım kapasitesini iki katına katlamak, ECMO cihaz sayısını artırmak ve kritik bakım uzmanı yetiştirmek olmalıdır. Hastaları kurtardığımız ölçüde pandemiye yönetiriz."

Üye 2: "Esas yatırım, antiviral ilaç stoku ve geniş spektrumlu monoklonal antikor üretim altyapısına yapılmalıdır. Etkili bir farmakolojik cephane pandemiye durdurur."

Üye 3: "Şehir hastanelerinin sayısını artırmalı, her bölgeye bir mega hastane planlamalıyız. Fiziksel kapasite stratejinin omurgası olmalıdır."

Üye 4: "Sınır sağlık denetimi, süveyans ve filyasyon kapasitesi, temel sanitasyon altyapısı, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve aşı üretim altyapısı önceliklendirilmelidir."

Üye 5: "Ulusal politika yerine her ilin kendi pandemi planını yapması daha verimlidir, merkezi planlamadan kaçınılmalıdır."

Salgınla mücadele açısından en uygun stratejik yaklaşımı öneren üye hangisidir?

A) Üye 4

49) Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki en büyük tıp kütüphanesidir?

A) NLM

50) Bir tartışmada Dr. Mehmet Bey, kendi yaptığı vaka kontrol sistematik derlemesi çalışmasına atıfla bir takım bilimsel iddialarda bulunmaktadır. Henüz mesleğe yeni başlayan ama dikkatli bir araştırmacı olan Dr. Ayşe Hanım ise bir konuda yapılmış vaka serilerine dayanarak bu iddiaları değerlendirmektedir. Dr. Miraç bey ise tartışmaya literatürde bulduğu bir kohort çalışması ile katılmaktadır. Tartışmada hepsinin hocalığını yapmış, alanın duayeni Osman hocamız da uzman görüşüyle tartışmaya katkı sunmaktadır.

Oxford Kanıt Hiyerarşisine göre doktorlarımızın dayanakları bilimsel kanıt düzeyi en yüksekten en düşük düzeye kadar hangi seçenekte doğru sıralanmıştır.

C) Dr. Miraç Bey - Dr. Mehmet Bey - Dr. Ayşe Hanım - Dr. Osman Bey

51) 15 yaş ve altındaki nüfusun %25'ini, 65 yaş ve üstü nüfusun ise %15'ini oluşturduğu toplumda yaşlı bağımlı nüfus oranı kaçtır?

C) %25

52) Bir enfeksiyon etkeninin sekonder atak hızının çok yüksek bulunması aşağıdakilerden hangisini en güçlü biçimde düşündürür?

C) Etkenin enfektivitesinin yüksek olduğunu.

53) Aşağıdakilerden hangisi indirekt bulaş yollarından biridir?

C) Hava yoluyla bulaş.

54) Bir yurttaki kızamık salgını gelişmiştir. İlk vaka ile temas eden 80 öğrencinin 20'si ilk inkübasyon süresi içinde hastalanmıştır. Hastalığın bulaşıcılık bıraktığı bilinmektedir. Sonraki inkübasyon süresi içinde geri kalan duyarlı öğrenciler arasında 15 yeni vaka görülmüştür.

Buna göre sekonder atak hızı aşağıdakilerden hangisidir?

C)%25

55) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi hastalığın doğal seyri ve korunma düzeyleri açısından yanlıştır?

C) Klinik Dönem - İkincil Koruma

56) 45 yaşındaki diyabet hastası bir erkek hasta düzenli kontrollerine gelmemektedir. Hekim görüşmesinde hastanın son aylarda işsiz kaldığı, ilaçlarını düzenli alamadığı, yoğun stres yaşadığı ve hastalığını "zaten düzelmeyecek" şeklinde algıladığı öğrenilmiştir. HbA1c düzeyi yüksektir ve diyabet komplikasyonları gelişmeye başlamıştır.

Bu hastayı değerlendirmede aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi biyopsikososyal modele en uygundur?

C) Hastanın biyolojik bulgularıyla birlikte psikolojik durumu ve sosyal koşullarını birlikte değerlendirmek.

57) Bu hastanede diyabet yönetiminde hekimler, diyetisyenler ve psikologlar aynı hastayı ayrı ayrı değerlendirmekte ancak birbirleriyle iletişim kurmamaktadır. Her uzman kendi planını oluşturmaktadır. Bu çalışma biçimi aşağıdakilerden hangisine en uygundur?

C) Multidisipliner yaklaşım

58) Pandemi sırasında epidemiyologlar vaka artışlarını analiz etmekte, hukukçular karantina düzenlemelerini hazırlamakta, iletişim uzmanları yanlış bilgileri azaltmaya çalışmakta, ekonomistler ise kapanma kararlarının ekonomik etkisini değerlendirmektedirler. Tüm ekip günlük toplantılar yaparak ortak karar almakta ve sürekli veri paylaşmaktadır.

Bu senaryoda baskın olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

C) İnterprofesyonel

59) Bir hepatit A salgınında eğerde her inkübasyon süresi aralığında giderek yükselen yeni pikler oluştuğu görülmektedir. Son haftalarda aynı aile içindeki bireylerde yeni vakalar artmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini en güçlü biçimde düşündürür?

C) Kişiden kişiye bulaş ve ikincil vakalar

60) Zoonotik hastalıklar ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

C) Zoonotik hastalıklar, meslek hastalığı olarak karşımıza çıkmazlar.

61) Çevre sağlığı ile ilgili olarak aşağıdaki önermelerden hangileri yanlıştır?

C) Dünyadaki su varlığının yaklaşık %10'u tatlı sulardan oluşmaktadır.

62) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) Viral hemorajik ateş ile seyreden tek hastalıktır.

63) Görülme sıklığı çevre şartlarından en çok etkilenen durum/hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

C) İshalli hastalıklar

64) 2022 yılı verilerine göre, ülkemizde yetişkinlerde sigara kullanım prevalansı yaklaşık olarak ne kadardır?

C) %25

65) Aşağıdakilerden hangisi, Sağlık Bakanlığı bünyesinde il bazında faaliyet gösteren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) tarafından yürütülen faaliyetlerden biri değildir?

C) Kemik kanseri taraması

66) Aşağıdakilerden hangisi ticari faaliyetlerin sağlık üzerindeki etkilerinden biri değildir.

C) Hastaların etnik, cinsiyet, dil veya sosyoekonomik durumları nedeniyle uğradıkları ayrımcılığın, sağlık hizmetlerine ulaşımını olumsuz etkilemesi.

67) Aşağıdakilerden hangisi Tarama Programlarının temel ilkelerinden biri değildir?

C) Taraması yapılacak hastalık mutlaka nadir görülen bir hastalık olmalı.

MİKROBİYOLOJİ

68) "Selefon Bant Yöntemi" ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.

C) Ascaris lumbricoides ve Taenia saginata yumurtalarının saptanması amacıyla kullanılamaz.

69) Bazı protozoonların erkek ve dişi hücrelerinin birleşmesiyle oluşan sert çeperli yapı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Ookist

70) Parazitolojik tanı testleri ve yöntemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) Parazitolojik tanı testlerinden hayvan inokülasyon yöntemi, "Altın Standart" yöntemidir.

71) Parazitolojik tanı yöntemlerinden olan kültür yöntemi, aşağıdaki etkenlerden hangisinde rutin tanıda kullanılmaz?

C) Trichinella spiralis

72) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik vektörlük tanımına en uygun ifadedir?

C) Etken vektör içinde gelişip veya çoğalması ve konaklara bulaştırması.

73) Aşağıdaki artropodların hangisi Leishmaniasis hastalığının başlıca vektörüdür?

C) Phlebotomus tatarcıkları

74) Otoenfeksiyon yapan nematotlar hangi şıkta doğru verilmiştir?

C) Strongyloides stercoralis-Enterobius vermicularis.

75) 32 yaşında erkek hasta, her iki kasık bölgesinde yaklaşık 3 aydır devam eden, şiddetli kaşıntılı, kenarları belirgin, hafif pullu ve ortası iyileşme eğilimi gösteren eritematöz plaklar şikayetiyle polikliniğe başvuruyor. Lezyon kenarından alınan kazıntı örneğinin Sabouraud Dextrose Agar (SDA) besiyerindeki kültüründe haki-yeşil/sarımsı renkte, kadifemsi koloniler oluşturuyor. Yapılan mikroskopik incelemede mikrokonidyum saptanmıyor. Düz ve ince duvarlı raket şeklinde makrokonidyumlar görülüyor. Hastadaki lezyonlardan sorumlu dermatofit aşağıdakilerden hangisidir?

C) Epidermophyton floccosum.

76) HIV pozitif , CD 4 sayısı 40 /mm " olan 50 yaşındaki erkek hasta , 2 haftadır giderek artan baş ağrısı, bulantı ve zaman zaman görme bulanıklığı şikayetleri ile başvuruyor. Ateşi hafif yüksek, ense sertliği minimaldir. BOS incelemesinde hücre sayısı düşüktür. BOS örneğinden yapılan çini mürekkebi ile yapılan mikroskopik değerlendirmede kapsüllü maya hücreleri görülüyor. Bu hastada tanıda kullanılabilecek serolojik test aşağıdakilerden hangisidir ?

A) BOS'ta Cryptococcus antijeni

77) Aşağıdaki yüzeysel mikoz etkenlerinden hangisi, sağlıklı bireylerin normal deri florasında kommensal olarak bulunabilen, lipofilik karakterde bir maya mantarıdır ?

A) Malassezia furfur

78) Yoğun bakımda yatan, geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı olan bir hastanın kan kültüründen yapılan mikroskopik incelemede maya hücreleri görülüyor. SDA besiyerinde görülen koloniden yapılan germ tüp testinde germ tüp oluşumu gözleniyor. Bu bulgu en çok hangi etkeni düşündürür ?

A) Candida Albicans

79) Ateş,kuru öksürük ve halsizlik şikayetleri olan bir hastadan alınan bronkoalveoler lavaj (BAL) örneğinin histopatolojik incelemesinde, makrofajlar içinde yerleşmiş, küçük, tomurcuklanan maya hücreleri izlenmektedir. Aynı hastadan alınan örneğin kültüründe, 25°C 'de Üretilen kolonilerden hazırlanan mikroskopik incelemede , İnce septalı hifler üzerinde , uçlarında diken (tüberküllü) makrokonidyumlar gözlenmektedir. Bu bulgular en olası hangi etkeni düşündürür ?

A)Histoplasma Capsulatum

80) Bahçeyle uğraşan 45 yasındaki bir erkek hasta , eline diken batmasından birkaç hafta sonra gelişen, başlangıçta papül şeklinde olan ve zamanla ülserleşen bir lezyon nedeniyle başvuruyor. Yapılan fizik muayenesinde lezyonun proksimaline doğru, lenfatikler boyunca ilerleyen nodüler oluşumlar dikkat çekiyor. Alınan örneğin kültüründe, 25°C 'de septalı hif ve çiçek demeti şeklinde kümeleşen konidyumlar görülürken 37 °C 'de maya formuna dönüşüm saptanıyor. Bu hastalığa neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sporothrix Schenckii

81) Aşağıdaki nematod -bulaş yolu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?

A) Trichinella spiralis → yumurtanın oral alınması

82) Aşağıda verilen trematod hedef organ eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?

A) Dicrocoellum dendriticum -bağırsak

83) 35 yaşında erkek hasta, son haftalarda iç çamaşırında hareket eden beyaz parçacıklar fark ettiğini söylüyor. Hasta anamnezinde sık sık az pişmiş sığır eti yediğini belirtiyor

Dışkı incelemesinde çok sayıda yuvarlak, kalın kabuklu, radyal çizgilenme gösteren yumurtalar saptanıyor. Ayrıca dışkıda bulunan proglottid segmentinin uterusunda yapılan incelemede 20 'den fazla lateral uterin dal içeriyor. Bu hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Taenia saginata

84) Aşağıdaki sestodlardan hangisinin yumurtası diğerlerinden farklı olarak operkulum içerir ve yaşam döngüsünün devamı için suya ihtiyaç duyar ?

A) Diphyllbothrium latum

85) Onkogenik potansiyeli olan parazitler hangi şıkta doğru eşleştirilmiştir ?

A) Schistosoma haematobium -Clonorchis sinensis

86) Aşağıdaki mantar etkenlerinden hangisi, keratinaz enziminin olmaması ya da çok zayıf etki nedeni ile enfeksiyonun stratum corneum yüzeyinde sınırlı olması ve konakta klinik inflamatuvar yanıt oluşturmada seyretmesi ile karakterizedir ?

A) Hortaea werneckii

87) 22 yaşında erkek hasta, birkaç haftadır süren idrar yaparken yanma ve idrarda kan görme (hematüri) şikayetleri ile başvuruyor. Hastanın yapılan idrar mikroskopisinde resimdeki trematod yumurtalar görülüyor. Hastanın semptomlarına neden olan parazit ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A) Yumurtalar operküllüdür.

88) Larva migrans sendromuna neden olan etkenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?

A) Ancylostoma brasiliensis-caninum filariform larvanın deriden girmesi ile bulaşır ve deri altına yerleşir.

89)

1- İnsanı enfekte eden form : Sporozoit

2.- İnsandaki yaşam döngüsünde eritrositleri enfekte eden form: Merozoit

3- Karaciğerde kalıp relapslara neden olan form: Hipnozoit (P .vivax /ovole)

4- Anofelin insandan aldığı form: Gametosit

5- Ekso Eritrositik döngüde ara form: Ookinet

Plasmodium yaşam döngüsünde görülen formların kaç tanesi doğru olarak tanımlanmıştır ?

A) 4

90) Sıtma tanısında en yaygın kullanılan yöntem "kalın damla ve ince yayma " preparatların Giemsa ile boyanması ve mikroskopik olarak incelenmesidir .

Bir Sıtma hastasında görülebilecek bulgu ve formlar, en doğru biçimde, hangi şıkta verilmiştir ?

I. Trofozoit

II. 1.Şizont

III.Gametosit

IV .Hipnozolit

V .Schaffner Granülleri

A) I,II,III ve V

91) Sıtma tedavisi planlanırken, plasmodium 'un hangi form için tedavi düzenlemesi gerekli değildir ?

A) Mikrogametosit

92) Sıtma hastalığı ve sıtma etkeni plasmodium ile ilgili hangisi yanlıştır ?

A) Sıtma tanısında ateş ve titremenin olduğu dönemde alınacak periferik kandan yapılacak bir adet yayma yeterlidir

93) Sıtma tedavisi ve profilaksisi ile ilgili hangisi doğrudur?

A) Primakin ve, Klorokin tedavisi uygun bir yaklaşımdır

94) Toksoplazmosis için serolojik tarama yapılan 10 haftalık gebede Toxo IgM pozitif, Toxo IgG pozitif saptanıyor.

Bu sonuçlardan sonra yapılması gereken en doğru yaklaşım hangisidir ?

A) Avidite testi istenir

95) Leishmaniasis için hangisi yanlıştır?

A) Kültürde üreme saptanması durumunda amastigot form aranır

96) Afrika seyahati sonrasında akşamları pik yapan ateş , akşamları şiddetlenen baş ağrısı, hepato-splenomegali, lenfadenopati ve Winterbottom belirtisi olan 35 yaşındaki kadın hastada en olası etken ve vektör hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

A) Trypanosoma brucei gambiense / Tse Tse (Çe Çe) sineği

97) Termal bir tesiste yaptığı tatilden 1 hafta sonra 66 yaşındaki erkek hasta baş ağrısı, ateş ve şiddetli kusma acil servise başvurulur. Ancak hasta tüm müdahalelere rağmen 2.haftada kaybediliyor.Postmortem histopatolojik incelemede Primer amibik meningoensefalit tanısı konuyor. En olası etken hangisidir ?

A) Naegleria fowleri

98) Ekstraintestinal amoebiasis 'de en sık tutulum görülebilecek iki organ hangisidir ?

·Karaciğer, Akciğer,Dalak,Safra kesesi,
Deri,Plevra,Beyin,Ürogenital sistemde ortaya çıkabilir .

· Karaciğerden sonra en sık tutulan organ : Akciğer ,
karaciğerden diyafram yolu ile veya bağırsaktan
hematojen yolla enfekte olabilir

(Hoca slaytta yazan bilgiyi soruya eklemiştir.)

A) Karaciğer / Akciğer

99) Mantar hücre yapısı düşünüldüğünde en antijenik kısım hangisidir ?

A) Hücre duvarı

100) Termal Dimorfizm kavramını en doğru açıklayan seçenek hangisidir ?

A) Bir grup patojen mantarların 35 C'de maya ve 25 °C'de küf şeklinde üreyebilmesi