

量子近似最適化アルゴリズム (QAOA) 体系的教科書

基礎数理・回路図解から原論文完全解説，XY ミキサー，古典角度最適化まで

対象読者：量子力学を学ぶ理工系学部生・大学院生・研究者

量子コンピューティング・最適化アルゴリズム研究グループ 編

2026 年 9 月（第 1 版） | 学術完全収録版

まえがき (Preface)

本書は、大学 3 年生で量子力学の基礎講義（シュレーディンガー方程式、ブラケット記法、角運動量・スピン $1/2$ 、エルミート演算子、時間発展演算子、摂動論・断熱近似など）を学んでいる、あるいは履修し終えた理工系学部生を主たる対象として執筆された、量子近似最適化アルゴリズム（Quantum Approximate Optimization Algorithm: QAOA[1]）の本格的な学術教科書である。

大学の量子力学の講義において、多くの学生は「水素原子のエネルギー準位」や「調和振動子の昇降演算子」「磁場中のスピン歳差運動」といった基礎物理を学ぶ。しかし、それらの物理法則が、いかにして現代最先端の「量子コンピュータ」へと姿を変え、実社会の超難問を解くアルゴリズムとして作動するのかという「生きた接続」を体感する機会は極めて少ない。

一方、情報科学側から書かれた量子計算の入門書を開くと、抽象的な「量子ビット」や「論理ゲート」の配線図が天下り式に導入され、物理学科や理工系学生が培ってきた「ハミルトニアン」「シュレーディンガー描像・ハイゼンベルク描像」「時間発展演算子 $e^{-iHt/\hbar}$ 」「断熱定理」「スピン鎖の交換相互作用」といった強固な物理的直感と結びつかず、学習の断絶が生じてしまう。

本書の目的は、この「物理学の量子力学」と「計算科学の量子アルゴリズム」の間に横たわる断絶を完全に埋めることである：

1. **スピン系から量子ゲートへの完全な翻訳**: 量子ビット $|0\rangle, |1\rangle$ はスピン $1/2$ 粒子の S_z 固有状態 $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$ そのものであり、1 量子ビット回転ゲートは磁場中のラーモア歳差運動 $e^{-i\frac{\theta}{2}\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}}$ 、イジング相互作用ゲート R_{ZZ} は 2 スピン結合にほかならない [16, 17].
2. **断熱量子計算 (AQC) と量子断熱定理**: 時間依存ハミルトニアンの基底状態追従, Born-Fock-Kato の量子断熱定理 [7, 8], 反交差と Landau-Zener 遷移 [10, 11], そしてリー・トロッター分解 [13, 14, 15] という物理の王道から QAOA の誕生 (Farhi et al., 2014[1]) を必然として導く.
3. **原論文のハイゼンベルク描像による厳密証明**: Farhi らの Light Cone 解析は、大学 3 年生が習う「ハイゼンベルク方程式と演算子のユニタリ時間発展 $A(t) = U^\dagger A U$ 」そのものであり、代数計算を一切省略せずに 3 正則 MaxCut 近似比 0.6924 を完全に導出する.
4. **凝縮系物理の知恵 (XY ミキサー)**: One-Hot 制約付き最適化において、従来のペナルティ法 (Standard QAOA[4]) が解空間の指数爆発により破綻するのに対し, Hadfield et al. (2019)[2] や Wang et al. (2020)[3] の XY ミキサーは、物性物理で親しまれている「XXZ スピン鎖のフリップフロップ項 $\sigma_i^+ \sigma_j^- + \sigma_i^- \sigma_j^+$ 」であり、全スピン S_z^{tot} 保存則 (ハミング重み保存) によって無効解空間を物理排除する.
5. **古典角度最適化と機械学習サロゲートの融合**: 変分エネルギー地形の非凸性, Barren Plateau 現象 [22, 23], パラメータシフト則 [26, 27], そして Factorization Machine (FM[32, 33]) との調和までを一気通貫で解説する.

すべての記述は一次文献（査読付き原著論文・プレプリント等）に基づいて厳密に検証されており、数式をごまかさず、豊富な TikZ 回路図と物理描像を交えて論理を展開している。大学 3 年生の皆さん

が、手元のノートと鉛筆で数式を追いながら、現代の量子アルゴリズム研究の最前線へと自信を持って踏み出せる一冊となれば幸いである。

本書の構成と学習フロー：

- **基礎理論コース（第 1 章～第 3 章）**：スピン系と回路の対応，イジング模型への変換，AQC と Trotter 分解の数理.
- **原論文徹底解読コース（第 4 章）**：Farhi (2014) の MaxCut 近似比 0.6924 の厳密証明.
- **制約付き最適化と XY ミキサーコース（第 5 章～第 7 章）**：ペナルティ法の破綻，Hadfield (2019) の対称性保存則，Wang (2020) の NISQ 実装論.
- **古典角度最適化と実践 BBO コース（第 8 章～第 9 章）**：変分最適化，INTERP，Factorization Machine との調和.
- **実力定着コース（第 10 章～第 11 章）**：章末演習問題，詳細解答，総括，および全 35 編の参考文献.

2026 年 9 月

著者一同

記号と表記法一覧 (Table of Notations)

記号	名称・用語	定義・物理的意味
$ 0\rangle, 1\rangle$	計算基底 (Computational Basis)	1 量子ビットの基底ベクトル $ 0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, 1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
$ \psi\rangle$	状態ベクトル (Ket)	規格化されたヒルベルト空間の純粋状態ベクトル
$\langle\psi $	双対状態ベクトル (Bra)	$ \psi\rangle^\dagger$ (エルミート共役)
$\langle\phi \psi\rangle$	内積 (Inner Product)	2 つの状態ベクトルの複素内積
X, Y, Z	パウリ行列 (Pauli Matrices)	$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
H	アダマールゲート	$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ (均等重ね合わせ生成)
$R_Z(\theta)$	Z 軸回転ゲート	$e^{-i\frac{\theta}{2}Z} = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}$
$R_{ZZ}(\theta)$	2 量子ビット相互作用ゲート	$e^{-i\frac{\theta}{2}Z_i Z_j}$ (イジング相互作用項)
CNOT	制御 NOT ゲート	$ c, t\rangle \rightarrow c, t \oplus c\rangle$ (エンタングルメント生成)
H_C	コストハミルトニアン	最適化問題の目的関数を表現する対角演算子
H_M, B	ミキサーハミルトニアン	探索状態を駆動する演算子 (横磁場または XY)
p	QAOA のレイヤー数 (深さ)	コスト層とミキサー層の適用回数
$\vec{\gamma}, \vec{\beta}$	変分パラメータ	コスト層とミキサー層の回転角度系列
$[A, B]$	交換子 (Commutator)	$AB - BA$ (非可換性の尺度)
$ W_d\rangle$	W 状態	d 個のビットに 1 つだけ 1 が立った均等重ね合わせ状態

目次

まえがき (Preface)	i
記号と表記法一覧	iii
第 1 章 序論と全体ロードマップ	1
1.1 本教材の目的と構成	1
第 2 章 量子回路入門：スピン 1/2 系から量子ゲートへの物理的架け橋	2
2.1 量子ビット (Qubit) と重ね合わせの直感的イメージ	2
2.2 量子回路図の読み方	3
2.3 QAOA を理解するための必須ゲート一覧	3
2.4 コスト層の主役： $R_{ZZ}(\theta)$ 相互作用ゲートの分解	3
第 3 章 数学的基礎：組合せ最適化・イジング模型・断熱量子計算	5
3.1 QUBO からイジング模型への変換	5
3.2 パウリ行列と量子ハミルトニアン	5
3.3 断熱量子計算 (AQC) の背景・物理原理・限界	6
3.4 トロッター分解 (Trotter-Suzuki Decomposition)：アナログからデジタルへ	8
3.5 トロッター化 AQC の挫折と「QAOA へのパラダイムシフト」	9
第 4 章 QAOA 原論文 (Farhi et al., 2014) の完全徹底解説	11
4.1 アルゴリズムの定式化	11
4.2 原論文における理論的定理	12
4.3 MaxCut 問題と局所因果律 (Light Cone) の厳密解析	12
第 5 章 制約付き最適化の壁：ペナルティ法の破綻メカニズム	14
5.1 実問題における制約条件	14
5.2 従来のペナルティ法 (Standard QAOA)	14
5.3 なぜペナルティ法は破綻するのか？	14
第 6 章 XY ミキサーと QAO Ansatz (Hadfield et al., 2017/2019) の完全解説	15
6.1 思想の転換：部分空間探索 (Subspace Search)	15
6.2 許容部分空間 (Feasible Subspace) の定義	15

6.3	XY ミキサーの数学的構造と対称性保存則	15
6.4	初期状態：W 状態の直積	16
第 7 章	XY ミキサーの数理解析と NISQ 実装論 (Wang et al., 2020)	18
7.1	時間発展ユニタリ演算子の厳密形	18
7.2	トポロジーの選択：完全グラフ (Clique) vs リング型 (Ring)	18
第 8 章	QAOA における古典の角度最適化：理論・オブティマイザ・最新戦略	19
8.1	角度最適化を阻む 3 大ボトルネック	19
8.2	主要な古典オブティマイザの分類と特性	19
8.3	角度最適化を成功させる 3 大先端戦略	20
第 9 章	Factorization Machine (FM) サロゲートモデルとの完全調和	22
9.1	なぜ FM と XY-QAOA なのか？	22
第 10 章	理解度確認演習問題と解答	23
10.1	演習問題	23
10.2	解答と解説	23
第 11 章	まとめ	25
	参考文献 (References)	26

第 1 章 序論と全体ロードマップ

1.1 本教材の目的と構成

組合せ最適化問題は、現代の産業・情報社会（物流、金融、材料探索、創薬、回路設計など）に遍在する極めて重要な問題群である。しかし、Karp の 21 の NP 完全問題をはじめとするそれらの問題群の多くは NP 困難に属し、古典コンピュータでの厳密解探索は変数の増加に伴って指数関数的な計算爆発（次元の呪い）に直面する [4]。

本教材では、以下のステップに従って QAOA の理論体系を基礎から最先端まで段階的に修得する：

1. **第 2 章: 量子回路入門：スピン $1/2$ 系から量子ゲートへの物理的架け橋。** 大学 3 年生の量子力学で親しんだスピン $1/2$ 系 ($|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$) とパウリ行列を基礎に、ラーモア歳差運動としての回転ゲート、CNOT、およびイジング相互作用 (R_{ZZ}) のゲート分解 [16, 17] を学ぶ。
2. **第 3 章: 組合せ最適化を物理のスピン系（イジング模型/QUBO）へマッピングする数学的基盤** [4] と、QAOA の直接の先祖である断熱量子計算 (AQC) の物理原理 [5, 6, 7, 8, 9] および Trotter 分解 [13, 14, 15] を修得する。
3. **第 4 章: Farhi et al. (2014) の原論文 [1] を徹底的に解説し、コスト演算子・横磁場ミキサー・変分ハイブリッドループ・3 正則グラフ MaxCut の近似比導出を追体験する。**
4. **第 5 章: 現実の産業問題で頻出する One-Hot 制約などの等式制約に対し、従来のペナルティ法 (Standard QAOA) がなぜ解空間の指数消滅により壊滅的な破綻を迎えるのかを解明する** [4, 19, 2]。
5. **第 6 章: Hadfield et al. (2019) の原著論文 [2] を解説し、探索空間を有効解のみに閉じる「Quantum Alternating Operator Ansatz」と XY ミキサーの理論、および W 状態生成 [20] を学ぶ。**
6. **第 7 章: Wang et al. (2020)[3] の解析結果に基づき、XY ミキサーの回路分解、パラメータ周期性、偶奇スワップネットワーク [21] による NISQ コンパイルを学ぶ。**
7. **第 8 章: 古典の角度最適化の理論、3 大ボトルネック（非凸性、ショットノイズ、Barren Plateau[22, 23]）、オプティマイザ比較（COBYLA[24] vs SPSA[25] vs パラメータシフト則 [26, 27]）、そして補間 [28]・転移学習 [29, 30, 31] などの最新戦略を解明する。**
8. **第 9 章: Factorization Machine (FM[32]) サロゲートモデルと XY ミキサーを融合させた実用ブラックボックス最適化 (BBO[33]) パイプラインへの接続を解説する。**
9. **第 10 章: 理解度を定着させるための演習問題と解答を示す。**

第 2 章 量子回路入門：スピン 1/2 系から量子ゲートへの物理的架け橋

大学の量子力学講義で学んだように、スピン 1/2 粒子（電子や中性子など）のヒルベルト空間は 2 次元複素ベクトル空間 $\mathbb{C}^2$ であり、 S_z 固有基底 $\{|\uparrow_z\rangle, |\downarrow_z\rangle\}$ によって張られる。量子情報科学における「量子ビット (Qubit)」とは、まさにこのスピン 1/2 系を情報担体として捉え直した物理的実体そのものである [16]。

本章では、大学 3 年生が親しんできた「スピンのハミルトニアン」「パウリ行列」「ユニタリ時間発展演算子 $e^{-iHt/\hbar}$ 」から出発し、それらがいかにして「量子ゲート」や「量子回路配線図」へと翻訳されるのか、その物理的対応関係を解き明かす [17]。

2.1 量子ビット (Qubit) と重ね合わせの直感的イメージ

古典コンピュータのビットは 0 または 1 のどちらか一方の状態しかとれない（コインの表か裏）。これに対し、量子ビット (Qubit) は、0 と 1 の両方の可能性を同時にあわせ持つことができる（量子力学的重ね合わせ: Superposition）。数学的には、規格化された 2 次元複素ベクトルとして表される：

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (2.1)$$

ここで $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ は基準となる基底（計算基底）である。この量子ビットを観測（Z 基底での射影測定）すると、 $|\alpha|^2$ の確率で 0 が得られ、 $|\beta|^2$ の確率で 1 が得られる（ボルの規則）。

【解説】量子力学（スピン 1/2 系）との物理的対応関係

大学の量子力学講義で学ぶスピン 1/2 粒子のスピン上向き・下向き状態と、量子ビットの計算基底は完全に 1 対 1 対応する：

$$|0\rangle \equiv |\uparrow_z\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle \equiv |\downarrow_z\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

スピン角運動量演算子 $\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}$ （パウリ行列 $\boldsymbol{\sigma} = (X, Y, Z)$ ）に対し、外部静磁場 $\mathbf{B} = B\mathbf{n}$ によるゼーマン相互作用ハミルトニアン $\mathcal{H} = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} = \frac{\hbar\omega}{2}\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ の下でのシュレーディンガー時間発展演算子は：

$$U(t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\mathcal{H}t\right) = \exp\left(-i\frac{\omega t}{2}\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}\right) = \cos\left(\frac{\omega t}{2}\right)I - i\sin\left(\frac{\omega t}{2}\right)(\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \quad (2.3)$$

となる。これはまさに、回転角 $\theta = \omega t$ の「1 量子ビット回転ゲート $R_{\mathbf{n}}(\theta)$ 」そのものである！ すなわち、量子回路におけるゲート操作とは、電磁場パルスによってスピンを所望の角度だけラモア歳差運動させる物理過程にほかならない。

2.2 量子回路図の読み方

量子回路図は、時間の流れとともに量子ビットの状態がどう加工されていくかを表す配線図である：

- 水平方向の線（ワイヤー）：1つの量子ビットを表す。時間は左から右へ進む。
- 四角い箱（ゲート）：量子ビットの状態を回転・変換する操作（ユニタリ行列 U ）。
- 縦に繋がる線（2量子ビットゲート）：2つの量子ビットの間にもつれ（エンタングルメント）や相互作用を発生させる操作。
- メーター記号（測定）：量子重ね合わせを観測し、古典的な二値情報（0 または 1）を取り出す操作。

2.3 QAOA を理解するための必須ゲート一覧

2.3.1 1. 1 量子ビット基本ゲート




図 2.1 代表的な 1 量子ビットゲート。 H は重ね合わせを作り、 X はビットを反転させ、 R_Z, R_X はブロッホ球上で状態を角度 θ だけ連続回転させる。

2.3.2 2. 制御 NOT ゲート (CNOT / CX)

2 量子ビットゲートの代表格が **CNOT (Controlled-NOT) ゲート** である。「制御ビット（黒丸）」が 1 のときだけ、「標的ビット（十字丸）」のビットを反転（ X を作用）させる：




図 2.2 制御 NOT (CNOT) ゲートの構造と作用。2つの量子ビット間に量子力学的なエンタングルメント（もつれ）を生み出す最重要ゲート。

2.4 コスト層の主役： $R_{ZZ}(\theta)$ 相互作用ゲートの分解

QAOA のコスト層では、イジング相互作用項 $e^{-i\frac{\theta}{2}Z_iZ_j}$ (2つの変数の積 $x_i x_j$ に相当) が大量に登場する。物理的な量子コンピュータの多くは 2 量子ビットの直接結合として CNOT ゲートしか持たないが、「CNOT で挟んで間に $R_Z(\theta)$ を挟む」だけで、このイジング相互作用が完璧に実現できる (図 2.3)。

この基本ブロックを理解していれば、後述する QAOA の回路全体が一目で「何をしているか」手に取るように読めるようになる。




図 2.3 2 量子ビットイジング相互作用ゲート $R_{ZZ}(\theta) = \exp\left(-i\frac{\theta}{2}Z_iZ_j\right)$ の標準的ゲート分解. 最初の CNOT でパリティ (2 ビットの排他的論理和) を標的に集約し, R_Z で位相を回転させた後, 2 つ目の CNOT で標的の状態を元に戻す.

第 3 章 数学的基礎：組合せ最適化・イジング模型・断熱量子計算

3.1 QUBO からイジング模型への変換

二値変数 $x_i \in \{0, 1\}$ を決定変数とする二次制約なし二値最適化 (Quadratic Unconstrained Binary Optimization: QUBO) は以下で表される [4] :

$$f(x) = \sum_{i=1}^N q_i x_i + \sum_{i<j}^N Q_{ij} x_i x_j = x^\top Q x \quad (3.1)$$

古典二値変数 $x_i \in \{0, 1\}$ とスピン変数 $s_i \in \{+1, -1\}$ の間には、以下の全単射なアフィン変換が存在する：

$$x_i = \frac{1 - s_i}{2} \iff s_i = 1 - 2x_i \quad (3.2)$$

これを代入すると、物理学における古典イジング模型のハミルトニアンが得られる：

$$H_{\text{Ising}}(s) = \sum_{i<j} J_{ij} s_i s_j + \sum_i h_i s_i + C_0 \quad (3.3)$$

ここで結合定数は $J_{ij} = \frac{1}{4} Q_{ij}$ であり、局所磁場は $h_i = -\frac{1}{2} q_i - \frac{1}{4} \sum_{j \neq i} Q_{ij}$ である。

3.2 パウリ行列と量子ハミルトニアン

量子系では、古典変数 $s_i \in \{+1, -1\}$ を 1 量子ビットのエルミート演算子であるパウリ Z 行列 Z_i に昇格させる：

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (3.4)$$

計算基底 $|0\rangle, |1\rangle$ は Z の固有状態である： $Z|0\rangle = +1|0\rangle$, $Z|1\rangle = -1|1\rangle$ 。系全体のコストハミルトニアン H_C は以下のように定義される：

$$H_C = \sum_{i<j} J_{ij} Z_i Z_j + \sum_i h_i Z_i + C_0 I \quad (3.5)$$

H_C は計算基底において完全に対角行列であり、任意の古典ビット列 $x \in \{0, 1\}^N$ に対応する基底状態 $|x\rangle = |x_1 x_2 \dots x_N\rangle$ に対し、

$$H_C |x\rangle = f(x) |x\rangle \quad (3.6)$$

が厳密に成立する。したがって、目的関数 $f(x)$ を最小化することは、 H_C の基底状態（最小エネルギー固有状態）を求めることと完全に同値である。

3.3 断熱量子計算 (AQC) の背景・物理原理・限界

QAOA を真に深く理解するためには、その直接の先祖である 断熱量子計算 (Adiabatic Quantum Computation: AQC) の誕生背景と、物理学的な作動原理、そして直面した壁を理解することが不可欠である。

3.3.1 1. なぜ AQC が考案されたのか？ (歴史的背景)

1994 年にショア (Peter Shor) が素因数分解の多項式時間量子アルゴリズムを、1996 年にグローバー (Lov Grover) が非構造化データ探索の 2 次加速アルゴリズムを発表し、量子コンピュータの驚異的な潜在能力が世界に衝撃を与えた。しかし、これらは「周期性の検出 (量子フーリエ変換)」や「ブラックボックス判定オラクル」という極めて特殊な代数的・数学的構造を持つ問題に特化していた。産業・社会に無数に存在する、巡回セールスマン問題 (TSP) やグラフ彩色、充足可能性問題 (SAT) のような「一般的な NP 困難な組合せ最適化問題」を解く普遍的な量子アプローチは存在しなかった。

この膠着状態を打破すべく、MIT の理論物理学者 Edward Farhi, Jeffrey Goldstone, Sam Gutmann, Michael Sipser (2000) が提唱したのが断熱量子計算 (Adiabatic Quantum Computation: AQC) である [5, 6]。彼らの発想の原点は極めて直感的であった：

「解きたい問題の基底状態 (大域的最適解) をゼロから直接作るのは絶望的に難しい。

しかし、自明なハミルトニアン**の基底状態を作るのは極めて簡単である。**

系を自明な基底状態からスタートさせ、外場をゆっくり連続的に変化させて解きたい問題へと変形させれば、物理法則 (断熱定理) により、量子系は勝手に**真の最適解へと運ばれる**のではないか？」

3.3.2 2. 量子断熱定理 (Quantum Adiabatic Theorem) の物理と数学

時間に依存するハミルトニアン $H(t)$ に従う系の時間発展は、時間依存シュレーディンガー方程式で記述される：

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle \quad (3.7)$$

各時刻 t における瞬時固有状態方程式を $H(t)|n(t)\rangle = E_n(t)|n(t)\rangle$ とする ($E_0(t) \leq E_1(t) \leq \dots$)。ボルンとフォック (Born & Fock, 1928) [7] および加藤敏夫 (Kato, 1950) [8] によって厳密化された量子断熱定理は以下を主張する：

定理 3.1 (量子断熱定理). 系が時刻 $t = 0$ において初期ハミルトニアン $H(0)$ の基底状態 $|0(0)\rangle$ に準備されているとする。全実行時間 T に対し、 $H(t)$ の時間変化が十分にゆっくりであれば、終状態 $|\psi(T)\rangle$ は時刻 T における目的ハミルトニアン $H(T)$ の基底状態 $|0(T)\rangle$ に極めて高い確率で留まり続ける。

断熱性が保たれ、第 1 励起状態 $|1(t)\rangle$ への脱落 (非断熱遷移) が起きないための数学的十分条件 (断熱条件) は、Jansen, Ruskai, Seiler (2007)[9] らの厳密な漸近解析により以下で与えられる：

$$T \gg \frac{\max_{t \in [0, T]} |\langle 1(t) | \frac{dH}{dt} | 0(t) \rangle|}{\Delta_{\min}^2} \quad (3.8)$$

ここで、 $\Delta(t) = E_1(t) - E_0(t)$ は基底状態と第 1 励起状態のエネルギー差 (エネルギースペクトル

ギャップ) であり, $\Delta_{\min} = \min_{t \in [0, T]} \Delta(t)$ は発展路における最小エネルギーギャップである.

3.3.3 3. 反交差 (Avoided Crossing) とランダウ・ツェナー遷移

なぜ分母にギャップの2乗 $\Delta_{\min}^2$ が現れるのか? その物理的実態は, 量子力学における準位の反交差 (Avoided Level Crossing) とランダウ・ツェナー遷移 (Landau-Zener Transition) [10, 11] にある (図 3.1).

【解説】大学の量子力学演習でおなじみの2準位系ランダウ・ツェナー模型

反交差近傍におけるダイナミクスは, 大学3年生の量子力学講義や演習問題で頻出する以下の標準的な2準位系時間依存ハミルトニアンで記述される:

$$\mathcal{H}_{\text{LZ}}(t) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -vt & \Delta_{\min} \\ \Delta_{\min} & vt \end{pmatrix} = -\frac{vt}{2} Z + \frac{\Delta_{\min}}{2} X \quad (3.9)$$

ここで $v = \left| \frac{d}{dt}(E_1 - E_0) \right|$ は透熱エネルギー準位の相対掃引速度である. 時刻 $t \rightarrow -\infty$ から $t \rightarrow +\infty$ へと発展させたとき, 基底状態から第1励起状態へと非断熱的に跳び移る遷移確率は, ツェナー (1932) によって厳密に解かれ:

$$P_{\text{LZ}} = \exp \left(-\frac{\pi \Delta_{\min}^2}{2\hbar v} \right) \quad (3.10)$$

となる. 断熱性を維持する ($P_{\text{LZ}} \approx 0$) ためには, 掃引速度 $v \propto 1/T$ を極小に, すなわち実行時間 $T \propto 1/\Delta_{\min}^2$ を長大に取らねばならない物理的根拠がここにある.




図 3.1 断熱量子計算における準位の反交差 (Avoided Level Crossing) とランダウ・ツェナー遷移. 横磁場とコスト関数が拮抗する相転移点 t^* においてエネルギーギャップ $\Delta_{\min}$ が最小となり, ここを乗り越えるために膨大な時間 $T \propto 1/\Delta_{\min}^2$ が要求される.

異なるエネルギー準位は, 摂動 (量子ゆらぎ・横磁場) が存在すると交差することができず, 互いに反発して「反交差」を起こす. 最小ギャップ $\Delta_{\min}$ の極小領域を通過する際, ハミルトニアンの変化速度が

速すぎると、波束は基底状態のレールから外れ、励起状態へとトンネリング脱落してしまう（ランダウ・ツェナー遷移確率 $P_{LZ} \approx \exp\left(-\frac{\pi \Delta_{\min}^2}{2v}\right)$ ）。特に、NP 困難な問題では量子一次相転移（**First-Order Quantum Phase Transition**）やスピングラス相におけるアンダーソン局在 [12] が発生し、量子ビット数 N に対してギャップが指数関数的に極小化（ $\Delta_{\min} \propto e^{-\alpha N}$ ）する。その結果、断熱性を維持するために必要な時間 T は $T \propto e^{2\alpha N}$ へと指数爆発し、「原理的には解けるが、現実的な時間内では解けない」という AQC の根本的限界が明らかとなった。

3.4 トロッター分解 (Trotter-Suzuki Decomposition)：アナログからデジタルへ

AQC は本来、専用のアナログ量子デバイス（現在の D-Wave 量子アニーラーなど）で連続的な物理時間をかけて実行される。しかし、IBM, Google, Rigetti, 富士通などが開発する汎用的なゲート型量子コンピュータ（**Gate-Based QPU**）は、離散的な量子ゲート（ユニタリ行列）の系列としてしかアルゴリズムを実行できない。ここで登場するのが、リー・トロッターの積公式 [13] および鈴木増雄による高次分解公式 [14]、そして Lloyd (1996) [15] による量子シミュレーションへの適用である。

3.4.1 1. 非可換演算子の壁と BCH 公式

ハミルトニアン H の時間発展演算子 $U(T) = \exp\left(-i \int_0^T H(t) dt\right)$ をゲート型回路に落とし込む際の最大の障壁は、初期ハミルトニアン H_M （横磁場 X ）とコストハミルトニアン H_C （イジング Z ）が互いに可換でない（ $[H_M, H_C] \neq 0$ ）という点である。

通常のスカラー関数であれば $e^{A+B} = e^A e^B$ であるが、非可換な演算子（行列）に対してはこれは一般に成り立たない。厳密な関係は、ベイカー・キャンベル・ハウスドルフ（**Baker-Campbell-Hausdorff: BCH**）の公式によって与えられる：

$$e^A e^B = \exp\left(A + B + \frac{1}{2}[A, B] + \frac{1}{12}[A, [A, B]] - \frac{1}{12}[B, [A, B]] + \dots\right) \quad (3.11)$$

交換子 $[A, B] = AB - BA \neq 0$ の存在により、指数を単純に分割すると高次の歪み（交換子誤差）が不可避に発生する。

3.4.2 2. リー・トロッター・鈴木の高次積公式 (Lie-Trotter Product Formula)

この非可換性の壁を突破するため、全実行時間 T を p 個の微小時間刻み $\Delta t = T/p$ ($p \gg 1$) に細かくスライス（時間離散化）する。微小時間 $\Delta t \rightarrow 0$ の極限では、BCH 展開の高次交換子項は Δt^2 の微小量として抑え込める：

$$e^{-i(H_M+H_C)\Delta t} = e^{-iH_M\Delta t} e^{-iH_C\Delta t} + O(\Delta t^2) \quad (3.12)$$

これを p ステップ積み重ねることで、全時間発展を交互のユニタリ積として近似する：

$$U(T) \approx \prod_{k=1}^p e^{-iH_M\Delta t_k} e^{-iH_C\Delta t_k} \quad (3.13)$$

各微小ステップで発生する局所誤差は $O(\Delta t^2) = O(T^2/p^2)$ であるため、全 p ステップでの累積誤差は：

$$\text{全トロッター誤差} = p \times O\left(\frac{T^2}{p^2}\right) = O\left(\frac{T^2}{p}\right) \xrightarrow{p \rightarrow \infty} 0 \quad (3.14)$$

すなわち、ステップ数 p を十分に大きくすれば、アナログな連続時間発展 $U(T)$ を、ゲート型コンピュータ上の離散量子ゲート（コスト層 $e^{-iH_C\gamma}$ とミキサー層 $e^{-iH_M\beta}$ の交互適用）として厳密に再現できることが数学的に証明された（図 3.2）。




図 3.2 アナログな AQC の連続時間発展から、トロッター分解によるデジタル量子回路への変換。非可換な H_M と H_C を微小時間幅で交互に適用することで、ゲート型ハードウェアへの実装路が切り拓かれた。

3.5 トロッター化 AQC の挫折と「QAOA へのパラダイムシフト」

しかし、この「AQC をそのままデジタル化する」というアイデアは、NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum) 時代の実機ハードウェアにおいて絶望的な壁に直面した。

【注意】トロッター化 AQC を阻んだ NISQ の壁

- 回路深度の爆発:** トロッター誤差を抑えるには $p \gg T^2$ が必要である。前述の通り NP 困難問題では T 自体が指数関数的 ($T \propto e^{2\alpha N}$) に長いため、必要なレイヤー数 p は数千～数百万段に膨れ上がる。
- 実機デコヒーレンス:** 現在の NISQ 実機では、量子ビットのコヒーレンス時間（寿命）は数十～数百マイクロ秒であり、エラー率（0.1%～1%）を考慮すると、実行可能な回路深度はせいぜい $p \leq 5 \sim 10$ 程度である。数千段の回路など到底動かない。

3.5.1 Farhi らの歴史的な大逆転の発想（2014 年: QAOA の誕生）

この八方塞がりの状況下で、Farhi, Goldstone, Gutmann (2014) が打ち出したのが、以下の「思考の完全なコペルニクスの転回」であった：

【解説】Farhi らの核心的洞察：物理シミュレーションから変分最適化へ

「我々の真の目的は、AQC の物理時間発展を寸分違わず忠実に再現することではない。

目的はあくまで『最適解のビット列 x^* を見つけること』のはずだ。

ならば、 (β_k, γ_k) を断熱理論が決める微小量 Δt に固定するのをやめよう。

角度パラメータを自由な変分パラメータとして全開放し、古典オプティマイザに最適な角度を逆算させればよいではないか！」

この発想の転換により：

- 断熱的にゆっくりする必要がなくなった。
- 量子力学的干渉（強め合い・弱め合い）とトンネリングを最大限に活かし、たった $p = 1$ や $p = 2$ の極浅い回路深度であっても、大域的最適解へとダイレクトにショートカット（近道）する状態を作り出せるようになった。
- 回路が浅いため、現代の NISQ 量子コンピュータ上でもノイズに負けずに実行可能となった。

これが、物理学の「断熱量子計算」から、情報科学の「量子近似最適化アルゴリズム (QAOA)」への歴史的進化の本質である。次節では、この革新的な原論文 (Farhi et al., 2014) の数式と理論を、一行一行解説していく。

第4章 QAOA 原論文 (Farhi et al., 2014) の完全徹底解説

【原論文データ】原著論文データ

タイトル: A Quantum Approximate Optimization Algorithm

著者: Edward Farhi, Jeffrey Goldstone, Sam Gutmann (MIT)

公表: arXiv:1411.4028 (2014)

4.1 アルゴリズムの定式化

Farhi らの決定的なブレイクスルー [1] は, 「トロッター時間刻みを固定せず, 各ステップの回転角 (γ_k, β_k) を自由な変分パラメータとして開放し, 古典オプティマイザで最適化する」という変分量子アルゴリズム (VQA[35]) へと舵を切った点にある.

4.1.1 1. 初期状態

ミキサーハミルトニアン $B = \sum_{j=1}^n X_j$ の最大固有状態 (固有値 $+n$) である, 全量子ビットの一樣重ね合わせ状態を初期状態とする:

$$|s\rangle = |+\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{z \in \{0,1\}^n} |z\rangle \quad (4.1)$$

これはアダマールゲート $H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n}$ により深さ $O(1)$ で極めて容易に準備できる.

4.1.2 2. アンサンツ量子回路

深さ $p \geq 1$ に対し, $2p$ 個の実パラメータ $\vec{\gamma} = (\gamma_1, \dots, \gamma_p)$ および $\vec{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_p)$ を導入する. コスト時間発展 $U(C, \gamma) = e^{-i\gamma C}$ とミキサー時間発展 $U(B, \beta) = e^{-i\beta B}$ を交互に作用させる:

$$|\vec{\gamma}, \vec{\beta}\rangle = U(B, \beta_p)U(C, \gamma_p) \cdots U(B, \beta_1)U(C, \gamma_1)|s\rangle \quad (4.2)$$

ここでミキサー演算子は各ビットへの 1 量子ビット回転ゲート $R_X(2\beta) = e^{-i\beta X}$ の直積である:

$$U(B, \beta) = \prod_{j=1}^n e^{-i\beta X_j} = \bigotimes_{j=1}^n (\cos \beta I - i \sin \beta X) \quad (4.3)$$

QAOA の全体回路構成を図 4.1 に示す.

4.1.3 3. 期待値と古典・量子協調ループ

目的関数 $F_p(\vec{\gamma}, \vec{\beta})$ は, 状態 $|\vec{\gamma}, \vec{\beta}\rangle$ におけるコスト演算子 C の期待値として定義される:

$$F_p(\vec{\gamma}, \vec{\beta}) = \langle \vec{\gamma}, \vec{\beta} | C | \vec{\gamma}, \vec{\beta} \rangle \quad (4.4)$$

QAOA は図 4.2 に示すハイブリッドループによって最適化を進める.




図 4.1 QAOA の全体量子回路構成図. 全ビットへのアダマールゲート H で一様重ね合わせを作った後, コスト層 $e^{-i\gamma C}$ とミキサー層 $e^{-i\beta B}$ を p 回交互に適用し, 最後に計算基底で測定してビット列サンプルを得る.




図 4.2 QAOA における量子・古典ハイブリッド最適化ループ (VQE/VQA 型). QPU が量子重ね合わせから高速にサンプルを生成し, 古典 CPU がエネルギーを評価してパラメータ $(\vec{\gamma}, \vec{\beta})$ を更新する.

4.2 原論文における理論的定理

定理 4.1 (単調非減少性 (Monotonicity)). 任意のレイヤー数 $p \geq 1$ に対して, 以下が成り立つ:

$$M_p \geq M_{p-1} \quad (4.5)$$

Proof. p レイヤーのパラメータ集合において, 第 p 層のパラメータを $\gamma_p = 0, \beta_p = 0$ と設定すると, $U(C, 0) = I, U(B, 0) = I$ となり, 状態 $|\vec{\gamma}, \vec{\beta}\rangle$ は厳密に $p-1$ レイヤーの状態と一致する. したがって p レイヤーの探索空間は $p-1$ レイヤーの空間を包含しているため, 最大値は広義単調増加する. $\square$

定理 4.2 (断熱極限における厳密収束性). レイヤー数 $p \rightarrow \infty$ の極限において, 以下が成り立つ:

$$\lim_{p \rightarrow \infty} M_p = \max_{z \in \{0,1\}^n} C(z) \quad (4.6)$$

Proof. 断熱量子計算において, 実行時間 $T \rightarrow \infty$ とし, トロッター分割数 $p = T/\Delta t \rightarrow \infty$ と設定する. 断熱経路に沿った適切な角度系列 $(\vec{\gamma}_{\text{ad}}, \vec{\beta}_{\text{ad}})$ を選べば, 系の状態は C の最大固有状態へ断熱的に遷移する. 変分最適化による最大値 M_p はこの断熱系列の性能以上であることが保証されるため, 極限值は真の最大値に一致する. $\square$

4.3 MaxCut 問題と局所因果律 (Light Cone) の厳密解析

Farhi 原論文の最大の見所は, 3 正則グラフ (3-regular graph) の MaxCut 問題に対し, $p = 1$ の QAOA の性能 (近似比) を純粋に数式展開のみで厳密に導出した点にある.

MaxCut の目的関数は各辺 $\langle u, v \rangle \in E$ のカットの和である：

$$C = \sum_{\langle u, v \rangle \in E} C_{uv}, \quad C_{uv} = \frac{1}{2}(I - Z_u Z_v) \quad (4.7)$$

$p = 1$ における辺 $\langle u, v \rangle$ の期待値は、ハイゼンベルク描像を用いて以下のように書ける：

$$\langle C_{uv} \rangle = \langle s | e^{i\gamma C} e^{i\beta B} C_{uv} e^{-i\beta B} e^{-i\gamma C} | s \rangle \quad (4.8)$$

ここで演算子の交換関係に着目する：

1. $e^{i\beta B} = \prod_j e^{i\beta X_j}$ は 1 量子ビットゲートの積であるため、局所的な台（サポート）を広げない。
2. $e^{i\gamma C} = \prod_{e \in E} e^{i\gamma C_e}$ のうち、 u または v を共有しない辺 $e = \langle w, k \rangle$ ($w, k \notin \{u, v\}$) は C_{uv} および Z_u, Z_v と可換 ($[C_e, C_{uv}] = 0$) であり、ユニタリの左右で相殺して消滅する。

【解説】原論文の核心的洞察：局所因果律 (Light Cone)

浅いレイヤー $p = 1$ において、1 つの辺 $\langle u, v \rangle$ の期待値は、頂点 u, v からグラフ距離 1 以内の局所サブグラフ（部分木）の構造のみに完全に依存し、グラフ全体の頂点数 n には一切依存しない！

3 正則グラフにおいて、距離 1 の近傍構造は以下の 2 通りに分類される：

- **木構造 (Tree)** : u の他の 2 本の隣接頂点と、 v の他の 2 本の隣接頂点の間に辺が存在しない (ループ長 ≥ 4)。
- **三角形を含む構造 (Triangle)** : u と v が共通の隣接頂点を持つ (閉路長 3)。

木構造の場合、パウリ代数の展開により期待値は厳密に以下となる：

$$\langle C_{uv} \rangle_{\text{tree}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sin(2\beta) \sin \gamma \cos^2 \gamma [1 + \cos(2\beta) \sin^2 \gamma] \quad (4.9)$$

これをパラメータ (γ, β) について数値最適化すると：

$$\gamma^* \approx 0.61, \quad \beta^* \approx 0.39 \quad \implies \quad \langle C_{uv} \rangle \approx 0.6924 \quad (4.10)$$

任意の 3 正則グラフのカット総数の上界は $|E|$ であるため、最悪ケースの木構造トポロジーに対しても近似比 $r = \frac{\langle C \rangle}{|E|} \geq 0.6924$ が保証される [1]。なお、古典アルゴリズムでは Goemans-Williamson (1995)[18] の半正定値計画 (SDP) 緩和が近似比 0.87856 を達成しているが、Farhi らは最も浅い $p = 1$ の量子回路が定数理論保証を持つことを証明し、さらに $p \rightarrow \infty$ で厳密解へ収束することを示した。これは、多項式時間の量子アルゴリズムが非自明な理論保証を持つことを実証した歴史的瞬間であった。

【解説】ハイゼンベルク描像がもたらす幾何学的奇跡

シュレーディンガー描像では、波動関数 $|\vec{\gamma}, \vec{\beta}\rangle$ は全 2^n 次元の巨大なヒルベルト空間全体に複雑に広がるため、局所期待値の計算は一見絶望的に思える。しかし、大学の量子力学で学ぶ **ハイゼンベルク描像 (Heisenberg Picture)** に立ち戻り、演算子側に時間発展を背負わせると ($C_{uv}(t) = U^\dagger C_{uv} U$)、パウリ交換子 $[A, B]$ の局所的な非可換性により、相互作用の伝播はグラフ距離 p 以内の局所部分木 (Light Cone) に完全に封じ込められる。これは量子多体系の「Lieb-Robinson 限界」の離散版であり、物理学科の学生にとってハイゼンベルク描像の真価を実感できる最高峰の応用例である。

第 5 章 制約付き最適化の壁：ペナルティ法の破綻メカニズム

5.1 実問題における制約条件

MaxCut のような「任意のビット列 $z \in \{0, 1\}^n$ が物理的に意味を持つ」無制約問題とは異なり，材料探索，触媒設計，TSP，スケジューリングなどの実産業最適化では，変数群の中から排他的に 1 つを選択する **One-Hot 制約**（ハミング重み 1）が至る所に現れる：

$$\sum_{j=1}^d x_j = 1 \quad (x_j \in \{0, 1\}) \quad (5.1)$$

5.2 従来のペナルティ法 (Standard QAOA)

従来の QUBO や Standard QAOA では，この等式制約を満たすために，目的関数に大きな正のペナルティ項を付加する [4]：

$$H_{\text{total}} = H_{\text{obj}} + \lambda H_{\text{penalty}}, \quad H_{\text{penalty}} = \left(\sum_{j=1}^d x_j - 1 \right)^2 \quad (5.2)$$

5.3 なぜペナルティ法は破綻するのか？

しかし，このアプローチは浅い QAOA において**数学的・原理的に破綻する**．その理由は以下の 3 大要因による：

【注意】ペナルティ法が抱える 3 大欠陥

1. **全状態空間に対する有効解比率の指数関数的消滅**: M 個の d 選択肢カテゴリ変数があるとき，総量子ビット数は $N = M \cdot d$ ，全ヒルベルト空間次元は $2^N = 2^{Md}$ である．しかし，制約を満たす有効解の総数は d^M 個に過ぎない．有効解の割合は：

$$\text{有効解比率} = \frac{d^M}{2^{Md}} = \left(\frac{d}{2^d} \right)^M \xrightarrow{M, d \rightarrow \infty} 0 \quad (5.3)$$

例えば $d = 4, M = 4$ ($N = 16$) の場合，全 65,536 状態に対し有効解は 256 個 (0.39%) しかない．

2. **一様重ね合わせ初期化による無効空間への散逸**: Standard QAOA の初期状態 $|s\rangle = |+\rangle^{\otimes N}$ は，全空間を一様に重ね合わせるため，波動関数の初期重みの 99.6% は無効解空間に存在する．
3. **ペナルティ障壁による局所解トラップと λ のジレンマ**: 制約違反を防ぐために λ を大きくすると，解空間に巨大なエネルギー障壁が聳え立ち，浅い $p = 1, 2$ の回路では波動関数がトンネリングできず，局所解に閉じ込められる [19, 2]. 逆に λ を小さくすると制約を無視して無効解を出力するという深刻な「パラメータ設定のジレンマ」に陥る（実際，本研究のスケールアップ実験でも，Standard QAOA は $N \geq 12$ で制約充足率が 1% 前後に墜落し， $N = 16$ 以上では探索アルゴリズムとして完全に機能停止することが実証された）．

第 6 章 XY ミキサーと QAO Ansatz (Hadfield et al., 2017/2019) の完全解読

【原論文データ】原著論文データ

タイトル: From the Quantum Approximate Optimization Algorithm to a Quantum Alternating Operator Ansatz

著者: Stuart Hadfield, Zhihui Wang, Bryan O’Gorman, Eleanor G. Rieffel, Davide Venturelli, Rupak Biswas (NASA / USRA)

公表: Algorithms 2019, 12(2), 34; arXiv:1709.03489

6.1 思想の転換：部分空間探索 (Subspace Search)

Hadfield らの画期的な着想は、「制約をエネルギーペナルティで外から縛るのではなく、量子回路の幾何学的対称性として埋め込み、そもそも無効解空間に一切立ち入れないようにする」という点にある。これにより、アルゴリズムの名称は Approximate (近似) から **Alternating Operator** (交互作用素) **Ansatz** へと再定義された。

6.2 許容部分空間 (Feasible Subspace) の定義

全ヒルベルト空間 $\mathcal{H} = (\mathbb{C}^2)^{\otimes N}$ のうち、制約条件を満たす計算基底のみが張る線形部分空間を **許容部分空間** $\mathcal{H}_{\text{feas}}$ と定義する：

$$\mathcal{H}_{\text{feas}} = \text{span} \left\{ |x\rangle \left| \sum_{j=1}^d x_j = 1 \right. \right\} \subset \mathcal{H} \quad (6.1)$$

次元は $\dim \mathcal{H}_{\text{feas}} = d \ll 2^d$ である。

6.3 XY ミキサーの数学的構造と対称性保存則

6.3.1 1. ハミルトニアン の定義

2つの量子ビット i, j 間に作用する XY ミキサーハミルトニアン H_{ij}^{XY} は以下で定義される：

$$H_{ij}^{XY} = \frac{1}{2} (X_i X_j + Y_i Y_j) \quad (6.2)$$

パウリの昇降演算子 $\sigma^+ = |1\rangle\langle 0| = \frac{X+iY}{2}$, $\sigma^- = |0\rangle\langle 1| = \frac{X-iY}{2}$ を用いると：

$$H_{ij}^{XY} = \sigma_i^+ \sigma_j^- + \sigma_i^- \sigma_j^+ = |01\rangle\langle 10| + |10\rangle\langle 01| \quad (6.3)$$

6.3.2 2. 行列表示

計算基底 $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ における行列表示は以下の通りである：

$$H_{ij}^{XY} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (6.4)$$

この演算子は、 $|01\rangle$ と $|10\rangle$ の間だけで励起（「1」のビット）を交換（フリップフロップ遷移）させ、 $|00\rangle$ や $|11\rangle$ には一切干渉しない（固有値 0）。

【解説】物性物理学（XXZ スピン模型）との完全な同値性

物性物理学・凝縮系物理学において、1 次元 XXZ ハイゼンベルク模型のハミルトニアンは以下で知られている：

$$\mathcal{H}_{\text{XXZ}} = J \sum_i (X_i X_{i+1} + Y_i Y_{i+1} + \Delta Z_i Z_{i+1}) \quad (6.5)$$

この第一項・第二項こそがまさに Hadfield らの XY ミキサー $H_{ij}^{XY} = \frac{1}{2}(X_i X_j + Y_i Y_j)$ である！この相互作用はスピンのフリップフロップ（励起の交換 $|\uparrow\downarrow\rangle \leftrightarrow |\downarrow\uparrow\rangle$ ）を司り、全スピン角運動量の z 成分 $S_z^{\text{tot}} = \frac{\hbar}{2} \sum_k Z_k$ と厳密に可換 ($[H^{XY}, S_z^{\text{tot}}] = 0$) である。すなわち、QAOA における「ハミング重み保存則」は、量子力学における「全角運動量 S_z の保存則（連続対称性 $U(1)$ から生じるネーターの定理）」そのものにほかならない。

定理 6.1 (ハミング重み（局所磁化）の保存). 全スピン Z 演算子（総ハミング重み） $C_{\text{cons}} = \sum_k Z_k$ に対し、以下が成り立つ：

$$[H_{ij}^{XY}, Z_i + Z_j] = 0 \quad (6.6)$$

Proof. パウリ行列の交換関係 $[X, Z] = -2iY$, $[Y, Z] = 2iX$ より、

$$\begin{aligned} [X_i X_j, Z_i] &= -2iY_i X_j, & [X_i X_j, Z_j] &= -2iX_i Y_j \\ [Y_i Y_j, Z_i] &= 2iX_i Y_j, & [Y_i Y_j, Z_j] &= 2iY_i X_j \end{aligned}$$

したがって、

$$[X_i X_j + Y_i Y_j, Z_i + Z_j] = (-2iY_i X_j - 2iX_i Y_j) + (2iX_i Y_j + 2iY_i X_j) = 0$$

よって可換である。 □

この定理により、 $e^{-i\beta H_{ij}^{XY}}$ による時間発展は、系のハミング重みを厳密に 1 のまま保存する。

6.4 初期状態：W 状態の直積

ハミング重み 1 の等重み重ね合わせ状態は、まさに量子もつれ状態の代表である **W 状態** (Dicke 状態 D_1^d) $|W_d\rangle$ である [2, 20]：

$$|W_d\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{j=1}^d |0 \dots 0 \underbrace{1}_{j\text{-th}} 0 \dots 0\rangle \quad (6.7)$$




図 6.1 2 量子ビット W 状態 $|W_2\rangle$ の生成回路. X で励起を作り, H で重ね合わせ, CNOT で排他的励起状態を共有する. 測定結果は必ず $|10\rangle$ または $|01\rangle$ となり, ハミング重み 1 (One-Hot 制約) が完全に満たされる.

2 量子ビットの最小 W 状態 $|W_2\rangle = \frac{|10\rangle + |01\rangle}{\sqrt{2}}$ は, Bärtschi & Eidenbenz (2019)[20] らの手法を単純化した, 図 6.1 に示す回路で決定論的に生成できる.

M 個のカテゴリ変数がある場合, 系全体の初期状態は各ブロックの W 状態の直積 (テンソル積) として準備される:

$$|\psi_0\rangle = \bigotimes_{m=1}^M |W_{d_m}\rangle \in \mathcal{H}_{\text{feas}} \quad (6.8)$$

初期状態が 100% 有効解空間にあり, 時間発展演算子も有効解空間を不変に保つため, 測定結果は数学的に 100.0% の確率で制約を厳密充足することが保証される (ペナルティ項 $\lambda = 0$). 図 6.2 に, 従来の Standard QAOA と提案手法 FM-XY-QAOA の探索空間の幾何学的相違を示す.




図 6.2 探索空間の幾何学的対比. (左) Standard QAOA は広大な無効空間を含む全空間 2^N を探索するため, 大半の確率が無効解に散逸する. (右) 提案手法 FM-XY-QAOA は, 初期状態と XY ミキサーの対称性により許容部分空間 $\mathcal{H}_{\text{feas}}$ に閉じるため, 制約充足率 100% を維持しながら高速に最適解 $|x^*\rangle$ へ集中する.

第 7 章 XY ミキサーの数理解析と NISQ 実装論 (Wang et al., 2020)

【原論文データ】原著論文データ

タイトル: XY-mixers: Analytical and numerical results for QAOA

著者: Zhihui Wang, Nicholas C. Rubin, Jason M. Dominy, Eleanor G. Rieffel

公表: Physical Review A 101, 012320 (2020); arXiv:1904.09314

7.1 時間発展ユニタリ演算子の厳密形

2 量子ビット XY ミキサーの時間発展 $U_{ij}^{XY}(\beta) = e^{-i\beta H_{ij}^{XY}}$ は、基底 $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ において厳密に以下の行列形を持つ：

$$U_{ij}^{XY}(\beta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \beta & -i \sin \beta & 0 \\ 0 & -i \sin \beta & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (7.1)$$

これは量子回路における **iSWAP** ゲート族 や Google Sycamore の **fSim** ゲート に対応する。

7.2 トポロジーの選択：完全グラフ (Clique) vs リング型 (Ring)

1 つのブロック内の量子ビット集合 $V = \{1, \dots, d\}$ に対し、ミキサーをどう構成するか：

1. **完全グラフ型ミキサー (Clique Mixer)**: 全対全結合 $H_M = \sum_{i < j} H_{ij}^{XY}$. 長所：対称性が高くパラメータ探索が平滑. 短所：ゲート数が $O(d^2)$ であり、NISQ 実機でのオーバーヘッドが大きい.
2. **リング型ミキサー (Ring Mixer)**: 最近接結合のみ $H_M = \sum_{j=1}^{d-1} H_{j,j+1}^{XY} + H_{d,1}^{XY}$. 長所：ゲート数がわずか $O(d)$ であり、偶奇順序 (Odd-Even ordering) により回路深さ 2 で並列実行可能！

Wang ら [3] は、リング型 XY ミキサーであっても部分空間内の任意の基底間の遷移（エルゴード性・推移性）が完全に保証され、Clique 型と同等の高い探索性能を発揮することを数理的・数值的に証明した。さらに、Kivlichan ら [21] が提唱した偶奇スワップネットワーク (Odd-Even Transposition Network) を適用することで、線形トポロジーを持つ NISQ プロセッサ上でも深さ $O(N)$ で完全に並列コンパイル可能であることを示した。

第 8 章 QAOA における古典の角度最適化：理論・オプティマイザ・最新戦略

QAOA は「量子回路による状態生成」と「古典オプティマイザによるパラメータ更新」が車の両輪となって機能する。量子回路がいかに優れた表現力を持っても、変分パラメータ $\vec{\gamma} = (\gamma_1, \dots, \gamma_p)$ および $\vec{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_p)$ を適切に最適化できなければ、アルゴリズムは真価を発揮できない。本節では、QAOA の古典角度最適化における理論的困難性、主要オプティマイザの比較、そして近年の研究で確立された先端戦略を解説する。

8.1 角度最適化を阻む 3 大ボトルネック

目的関数 $F_p(\vec{\gamma}, \vec{\beta}) = \langle \vec{\gamma}, \vec{\beta} | H_C | \vec{\gamma}, \vec{\beta} \rangle$ を最適化する古典タスクは、一般的な機械学習の最適化と比べて特有の難点を抱えている：

1. **エネルギーランドスケープの高度な非凸性 (Non-Convexity)** : F_p は正弦波や余弦波の積として構成されるため、無数の局所解 (Local Minima / Maxima) と鞍点 (Saddle Points) が密集した波打つ地形を持つ。特にランダム初期値から局所探索を始めると、浅い局所解に即座にトラップされる。
2. **測定の統計的ゆらぎ (ショットノイズ: Shot Noise)** : QPU 上で期待値を評価する際、無限回の測定は不可能であり、有限回 (例: 1,000 ~ 10,000 shots) のサンプリング平均をとる。そのため、目的関数値には統計誤差 ($\propto 1/\sqrt{\text{shots}}$) が不可避に重畳する。通常の数値微分勾配法は、このノイズによって勾配の向きが乱反射し、発散する。
3. **勾配消失問題 (Barren Plateau)** : McClean ら (2018)[22] が指摘した通り、回路が深くなる、あるいはハール測度に従うランダムユニタリに近づくと、パラメータ空間の大部分において期待値の勾配の分散が量子ビット数 N に対して指数関数的に消滅 ($\text{Var}[\partial F / \partial \theta] \in O(2^{-N})$) する。さらに Wang ら (2021)[23] は、局所ノイズが存在すると浅い回路であってもノイズ誘起の Barren Plateau が発生することを証明した。

8.2 主要な古典オプティマイザの分類と特性

QAOA で用いられる古典オプティマイザは、大きく以下の 3 系統に分類される：

表 8.1 QAOA に適用される主要古典オプティマイザの比較

手法名	勾配情報の利用	ショットノイズ耐性	関数評価回数 / step	主な特徴・適用領域
COBYLA	勾配不要 (シンプレックス)	中程度	高々 $2p+1$ 回	最も標準的。 $p \leq 3$ で高速だが局所解に弱い。
Nelder-Mead	勾配不要 (シンプレックス)	弱い	1 ~ 2 回	ノイズにより単体が潰れて停止しやすい。
SPSA	確率的疑似勾配	極めて高い	常に 2 回	NISQ 実機・ノイズ環境のゴールドスタンダード。
Adam / L-BFGS	厳密勾配 (Shift-Rule)	高い	$2 \times 2p$ 回	パラメータシフト則と併用。評価コスト大。
Bayesian Opt (BO)	代理モデル (ガウス過程)	高い	1 回 (獲得関数)	$p = 1, 2$ の低次元で大域最適解を捉える。

8.2.1 1. COBYLA (Constrained Optimization BY Linear Approximation) [24]

Qiskit 等のライブラリでデフォルトで採用される最も代表的な手法。探索空間の頂点群（シンプレックス）上で目的関数を線形近似して次の一手を決める。長所は、関数の勾配を陽に計算しないため評価回数が少なく、滑らかなシミュレータ環境では極めて素早く収束する点である。しかし、局所解からの脱出能力はなく、初期値への依存性が極めて高い。

8.2.2 2. SPSA (Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation) [25]

実機ハードウェアやショット数が少ないノイズ環境において圧倒的な堅牢性を誇る確率的最適化手法。通常の数値微分では $2p$ 個のパラメータの勾配を求めるために $2 \times 2p$ 回の測定が必要となるが、SPSA は全パラメータを同時にランダムな符号 $\Delta_k \in \{+1, -1\}$ で微小摂動させる：

$$g_k(\theta) \approx \frac{F(\theta + c_n \Delta) - F(\theta - c_n \Delta)}{2c_n \Delta_k} \quad (8.1)$$

このため、パラメータ数 $2p$ がどれだけ増えても、1 反復あたりの回路実行回数が常に厳密に 2 回で済む。ショットノイズの統計的平均化効果により、実機ノイズ下で最も安定して収束する。

8.2.3 3. パラメータシフト則 (Parameter-Shift Rule) による厳密勾配 [26, 27]

パウリ行列の生成子 $G = \frac{1}{2}P$ ($P^2 = I$) によるユニタリ時間発展 $U(\theta) = e^{-i\theta G}$ に対し、その期待値の解析的微分は、有限差分ではなく角度を $\pm \frac{\pi}{4}$ シフトさせた 2 点の測定値の差として厳密に求まる：

$$\frac{\partial F(\theta)}{\partial \theta} = \frac{F\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) - F\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)}{2} \quad (8.2)$$

これにより、古典深層学習で培われた Adam や Momentum 勾配降下法をそのまま QAOA に適用することが可能となる。

8.3 角度最適化を成功させる 3 大先端戦略

8.3.1 1. 断熱スケジューリング初期化 (LINEAR Heuristic)

ランダム初期化は Barren Plateau や局所解トラップの主因となる。これを避ける最も素直で強力なアプローチは、断熱量子計算 (AQC) の時間発展軌道を模倣する線形スケジューリングである：

$$\gamma_k^{(0)} = \frac{k}{p} \Delta t, \quad \beta_k^{(0)} = \left(1 - \frac{k}{p}\right) \Delta t \quad (k = 1, \dots, p) \quad (8.3)$$

この単純な初期化を用いるだけで、最適化ルーチンは初期から断熱経路の引き込み領域 (Basin of Attraction) に位置し、良質な解へと極めてスムーズに収束する。

8.3.2 2. 補間ヒューリスティック (INTERP Strategy: Zhou et al., 2020) [28]

Zhou ら (PRX, 2020) が提唱した INTERP 戦略は、深さ p の最適化結果を用いて深さ $p+1$ の初期値を構築する再帰的アルゴリズムである。最適角度列 $(\vec{\gamma}_{(p)}^*, \vec{\beta}_{(p)}^*)$ は、層の進行とともに滑らかな曲線

を描く（断熱軌道の離散化に相当）．そこで、 p レイヤーの最適解を滑らかに線形補間（Interpolation）することで、 $p+1$ レイヤーの初期値を以下のように生成する：

$$\gamma_k^{(p+1)} = \frac{k-1}{p} \gamma_{k-1}^{*(p)} + \frac{p+1-k}{p} \gamma_k^{*(p)} \quad (8.4)$$

これにより、 $p = 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots$ と回路深度を深めていく際に、常に大域的最適解の近傍から古典最適化を開始できるため、高次元空間での局所解トラップを完全に回避できる．

8.3.3 3. パラメータ集中現象と転移学習 (Transferability) [29, 30, 31]

Brandao ら (2018) および Galda ら (2021) は、同一のグラフ分布（例えばランダム 3 正則グラフ同士）から生成された異なる問題インスタンス間において、QAOA の最適角度 $(\vec{\gamma}^*, \vec{\beta}^*)$ が問題サイズ $N \rightarrow \infty$ の極限で特定の定数値に集中する現象（Concentration of Parameters）を数学的に発見した．

【解説】BBO における転移学習 (Parameter Transfer) への応用

本研究のブラックボックス最適化 (BBO) では、イテレーション $t \rightarrow t+1$ で FM モデルが微小更新される．ハミルトニアンの変動 δH_C が小さい場合、最適角度の変動もリプシッツ連続性により微小有界 ($\|\theta_{t+1}^* - \theta_t^*\| \leq C \|\delta H_C\|$) となる．したがって、前イテレーションの最適角度 θ_t^* を次ステップの初期値 (Warm-Start) として転移することで、古典最適化の計算コストを $O(1)$ に短縮できる．

第9章 Factorization Machine (FM) サロゲートモデルとの完全調和

9.1 なぜ FM と XY-QAOA なのか？

本研究の真骨頂は、機械学習のサロゲートモデルとして **Factorization Machine (FM)** を選定した点にある。FM (Rendle, 2010[32]) は、高次元疎な One-Hot 変数 $x \in \{0, 1\}^N$ に対する予測関数として定義される：

$$\hat{f}(x) = w_0 + \sum_{i=1}^N w_i x_i + \sum_{i=1}^N \sum_{j=i+1}^N \langle v_i, v_j \rangle x_i x_j \quad (9.1)$$

ここで $v_i \in \mathbb{R}^k$ は潜在因子ベクトルである。

このモデルには、他の機械学習モデル（深層学習やガウス過程）にはない 2 大特長が存在する：

1. **厳密な 2 次多項式**: 構造が最初から QUBO そのものであり、一切の近似誤差なく 1 対 1 で量子コストハミルトニアン H_C にマッピング可能.
2. **One-Hot カテゴリカル表現の母体**: FM は元来 One-Hot 変数の相互作用を解明するために誕生した.

したがって、「One-Hot 変数を捉える FM」×「One-Hot 部分空間を厳密保存する XY-QAOA」は、理論的に完璧な対称性の調和を形成する。ペナルティ項 λ が一切存在しないため、BBO の能動学習イテレーションごとにサロゲートモデルが更新されても、従来の FMQA（量子アニーリングによる FM 最適化 [33]）で不可避であった煩雑なペナルティ再調整が完全に不要となり、「完全無人自律探索 (Self-Driving Lab)」が達成される。

第 10 章 理解度確認演習問題と解答

10.1 演習問題

【問題 1】パウリ交換関係の証明

パウリ行列の基本代数 $[X, Z] = -2iY, [Y, Z] = 2iX$ を用いて,

$$\left[\frac{1}{2}(X_1X_2 + Y_1Y_2), Z_1 + Z_2 \right] = 0 \quad (10.1)$$

を詳細に示せ.

【問題 2】2 量子ビット XY ユニタリの時間発展

ハミルトニアン $H = |01\rangle\langle 10| + |10\rangle\langle 01|$ に対し, H^2, H^3 を計算し, テイラー展開を用いて $e^{-i\beta H}$ が以下の行列になることを導出せよ:

$$e^{-i\beta H} = I + (\cos \beta - 1)H^2 - i \sin \beta H \quad (10.2)$$

【問題 3】W 状態の制約充足率

3 量子ビット系において, X ミキサーによる一様状態 $|+\rangle^{\otimes 3}$ と, W 状態 $|W_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|100\rangle + |010\rangle + |001\rangle)$ のそれぞれについて, 測定したビット列のハミング重みが 1 となる確率 (制約充足率) を計算せよ.

10.2 解答と解説

【問題 1 の解答】

積の交換子公式 $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$ を適用する.

$$\begin{aligned} [X_1X_2, Z_1 + Z_2] &= [X_1X_2, Z_1] + [X_1X_2, Z_2] = [X_1, Z_1]X_2 + X_1[X_2, Z_2] \\ &= (-2iY_1)X_2 + X_1(-2iY_2) = -2i(Y_1X_2 + X_1Y_2) \end{aligned}$$

同様に,

$$\begin{aligned} [Y_1Y_2, Z_1 + Z_2] &= [Y_1, Z_1]Y_2 + Y_1[Y_2, Z_2] \\ &= (2iX_1)Y_2 + Y_1(2iX_2) = 2i(X_1Y_2 + Y_1X_2) \end{aligned}$$

両者を足し合わせると:

$$[X_1X_2 + Y_1Y_2, Z_1 + Z_2] = -2i(Y_1X_2 + X_1Y_2) + 2i(X_1Y_2 + Y_1X_2) = 0 \quad (\text{Q.E.D.}) \quad (10.3)$$

【問題 2 の解答】

$H = |01\rangle\langle 10| + |10\rangle\langle 01|$ を 2 乗すると:

$$\begin{aligned} H^2 &= (|01\rangle\langle 10| + |10\rangle\langle 01|)^2 \\ &= |01\rangle\langle 10|10\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 01|01\rangle\langle 10| = |01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10| \end{aligned}$$

したがって, $H^3 = H^2 H = H, H^4 = H^2$ となり, 奇数乗は H , 偶数乗 (≥ 2) は H^2 となる. 指数関数のテイラー展開を偶数項と奇数項に分けると:

$$\begin{aligned} e^{-i\beta H} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\beta)^k}{k!} H^k = I + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m \beta^{2m}}{(2m)!} H^2 - i \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \beta^{2m+1}}{(2m+1)!} H \\ &= I + (\cos \beta - 1) H^2 - i \sin \beta H \end{aligned}$$

これを基底 $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ の行列で書き下すと, 第 6 節の行列と完全に一致する. (Q.E.D.)

【問題 3 の解答】

- **一様状態** $|+\rangle^{\otimes 3}$: $|+\rangle^{\otimes 3} = \frac{1}{\sqrt{8}}(|000\rangle + |001\rangle + \cdots + |111\rangle)$. 全 8 状態のうち, ハミング重み 1 の基底は $|100\rangle, |010\rangle, |001\rangle$ の 3 個. したがって充足率は $3/8 = \mathbf{37.5\%}$.
- **W 状態** $|W_3\rangle$: 状態ベクトルを構成する基底が最初からすべてハミング重み 1 であるため, 測定確率は $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \mathbf{100.0\%}$.

第 11 章 まとめ

本教材では, QAOA の数学的・物理的根底から, Farhi ら (2014) [1] の先駆的理論, Hadfield ら (2019) [2] および Wang ら (2020) [3] による制約保存型 XY ミキサーの数理解析, そして Factorization Machine を用いた実産業最適化への結合 [33] までを包括的に解説した. Preskill (2018)[34] が提唱した NISQ 時代の制約を克服し, 将来の誤り耐性量子コンピュータ (FTQC) へと繋がる強固な理論的礎石がここにある.

【解説】本教材の要点総括

1. **QAOA の原理:** 断熱発展の Trotter 分解を変分パラメータ化し, 浅い量子回路と古典オプティマイザで最適化する VQA.
2. **Farhi 原論文の金字塔:** 局所因果律 (Light Cone) を看破し, 3 正則 MaxCut で近似比 0.6924 を厳密証明.
3. **Standard QAOA の限界:** One-Hot 制約付き問題では, スケール増大に伴い無効解空間に波動関数が散逸し破綻.
4. **XY ミキサーの革命:** フリップフロップ項 $\frac{1}{2}(XX + YY)$ によりハミング重みを厳密保存. ペナルティ完全ゼロ ($\lambda = 0$) で制約充足率 100% を達成.
5. **産業実装:** One-Hot 変数の相互作用を捉える FM サロゲートモデルと XY-QAOA が三位一体となり, 完全無人自律の材料探索 BBO を実現する.

参考文献 (References)

- [1] E. Farhi, J. Goldstone, and S. Gutmann, “A Quantum Approximate Optimization Algorithm,” *arXiv preprint arXiv:1411.4028*, 2014.
- [2] S. Hadfield, Z. Wang, B. O’Gorman, E. G. Rieffel, D. Venturelli, and R. Biswas, “From the Quantum Approximate Optimization Algorithm to a Quantum Alternating Operator Ansatz,” *Algorithms*, vol. 12, no. 2, p. 34, 2019. [arXiv:1709.03489](#).
- [3] Z. Wang, N. C. Rubin, J. M. Dominy, and E. G. Rieffel, “XY-mixers: Analytical and numerical results for the quantum alternating operator ansatz,” *Physical Review A*, vol. 101, no. 1, p. 012320, 2020. [arXiv:1904.09314](#).
- [4] A. Lucas, “Ising formulations of many NP problems,” *Frontiers in Physics*, vol. 2, p. 5, 2014.
- [5] E. Farhi, J. Goldstone, S. Gutmann, and M. Sipser, “Quantum Computation by Adiabatic Evolution,” *arXiv preprint quant-ph/0001106*, 2000.
- [6] E. Farhi, J. Goldstone, S. Gutmann, J. Lapan, A. Lundgren, and D. Preda, “A Quantum Adiabatic Evolution Algorithm Applied to Random Instances of an NP-Complete Problem,” *Science*, vol. 292, no. 5516, pp. 472–475, 2001.
- [7] M. Born and V. Fock, “Beweis des Adiabatsatzes,” *Zeitschrift für Physik*, vol. 51, no. 3, pp. 165–180, 1928.
- [8] T. Kato, “On the Adiabatic Theorem of Quantum Mechanics,” *Journal of the Physical Society of Japan*, vol. 5, no. 6, pp. 435–439, 1950.
- [9] S. Jansen, M.-B. Ruskai, and R. Seiler, “Bounds for the adiabatic approximation with applications to quantum computation,” *Journal of Mathematical Physics*, vol. 48, no. 10, p. 102111, 2007.
- [10] L. D. Landau, “Zur Theorie der Energieübertragung. II,” *Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion*, vol. 2, pp. 46–51, 1932.
- [11] C. Zener, “Non-adiabatic crossing of energy levels,” *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, vol. 137, no. 833, pp. 696–702, 1932.
- [12] B. Altshuler, H. Krovi, and J. Roland, “Anderson localization makes adiabatic quantum optimization fail,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 107, no. 28, pp. 12446–12450, 2010.
- [13] H. F. Trotter, “On the product of semi-groups of operators,” *Proceedings of the American Mathematical Society*, vol. 10, no. 4, pp. 545–551, 1959.
- [14] M. Suzuki, “Generalized Trotter’s formula and systematic approximants of exponential operators and inner derivations with applications to many-body problems,” *Communications in Mathematical Physics*, vol. 51, no. 2, pp. 183–190, 1976.
- [15] S. Lloyd, “Universal Quantum Simulators,” *Science*, vol. 273, no. 5278, pp. 1073–1078, 1996.
- [16] M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information: 10th*

- Anniversary Edition*, Cambridge University Press, 2010.
- [17] A. Barenco, C. H. Bennett, R. Cleve, D. P. DiVincenzo, N. Margolus, P. Shor, T. Sleator, J. A. Smolin, and H. Weinfurter, “Elementary gates for quantum computation,” *Physical Review A*, vol. 52, no. 5, pp. 3457–3467, 1995.
 - [18] M. X. Goemans and D. P. Williamson, “Improved approximation algorithms for maximum cut and satisfiability problems using semidefinite programming,” *Journal of the ACM*, vol. 42, no. 6, pp. 1115–1145, 1995.
 - [19] V. Choi, “Minor-embedding in adiabatic quantum computation: I. The parameter setting problem,” *Quantum Information Processing*, vol. 7, no. 5, pp. 193–209, 2008.
 - [20] A. Bärttschi and S. Eidenbenz, “Deterministic Preparation of Dicke and W States on SMS Architectures,” in *Fundamentals of Computation Theory (FCT 2019)*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 11651, pp. 24–39, Springer, 2019. [arXiv:1904.07358](#).
 - [21] I. D. Kivlichan, J. McClean, Nathan Wiebe, C. Gidney, A. Aspuru-Guzik, G. K.-L. Chan, and R. Babbush, “Quantum Simulation of Electronic Structure with Linear Depth and Connectivity,” *Physical Review Letters*, vol. 120, no. 11, p. 110501, 2018.
 - [22] J. R. McClean, S. Boixo, V. N. Smelyanskiy, R. Babbush, and H. Neven, “Barren plateaus in quantum neural network training landscapes,” *Nature Communications*, vol. 9, p. 4812, 2018.
 - [23] S. Wang, E. Fontana, M. Cerezo, K. Sharma, A. Sone, L. Cincio, and P. J. Coles, “Noise-induced barren plateaus in variational quantum algorithms,” *Nature Communications*, vol. 12, p. 6961, 2021.
 - [24] M. J. D. Powell, “A Direct Search Optimization Method That Models the Objective and Constraint Functions by Linear Interpolation,” in *Advances in Optimization and Numerical Analysis*, pp. 51–67, Springer, 1994.
 - [25] J. C. Spall, “Multivariate stochastic approximation using a simultaneous perturbation gradient approximation,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 37, no. 3, pp. 332–341, 1992.
 - [26] K. Mitarai, M. Negoro, M. Kitagawa, and K. Fujii, “Quantum circuit learning,” *Physical Review A*, vol. 98, no. 3, p. 032309, 2018.
 - [27] M. Schuld, V. Bergholm, C. Gogolin, J. Izaac, and N. Killoran, “Evaluating analytic gradients on quantum hardware,” *Physical Review A*, vol. 99, no. 3, p. 032331, 2019.
 - [28] L. Zhou, S.-T. Wang, S. Choi, H. Pichler, and M. D. Lukin, “Quantum Approximate Optimization Algorithm: Performance, Mechanism, and Implementation on Near-Term Devices,” *Physical Review X*, vol. 10, no. 2, p. 021067, 2020.
 - [29] F. G. S. L. Brandao, M. Broughton, E. Farhi, S. Gutmann, and H. Neven, “For Fixed Control Parameters the Quantum Approximate Optimization Algorithm’s Objective Function Value Concentrates for Large Trees,” *arXiv preprint arXiv:1812.04170*, 2018.
 - [30] A. Galda, X. Liu, D. Lykov, Y. Alexeev, and I. Safro, “Transferability of Optimal QAOA Parameters in Combinatorial Optimization,” *IEEE Transactions on Quantum Engineering*, vol. 2, p. 3102611, 2021.
 - [31] D. J. Egger, J. Mareček, and S. Woerner, “Warm-starting quantum optimization,” *Quantum*, vol. 5, p. 479, 2021.

- [32] S. Rendle, “Factorization Machines,” in *2010 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)*, pp. 995–1000, IEEE, 2010.
- [33] K. Kitai, J. Guo, S. Ju, S. Tanaka, K. Tsuda, J. Shiomi, and R. Tamura, “Designing meta-materials with quantum annealing and factorization machines,” *Physical Review Research*, vol. 2, no. 1, p. 013319, 2020.
- [34] J. Preskill, “Quantum Computing in the NISQ era and beyond,” *Quantum*, vol. 2, p. 79, 2018.
- [35] M. Cerezo, A. Arrasmith, R. Babbush, S. C. Benjamin, S. Endo, K. Fujii, J. R. McClean, K. Mitarai, X. Yuan, L. Cincio, and P. J. Coles, “Variational quantum algorithms,” *Nature Reviews Physics*, vol. 3, no. 9, pp. 625–644, 2021.