


1st - P2.



$$b = \frac{h}{2\pi}$$

[1].


$$\therefore -\frac{\hbar^2}{2m} \psi''(x) = E\psi(x) \quad \therefore \psi(x) = A \cos(\lambda x) + B \sin(\lambda x), \quad \lambda = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

$$x = -a \wedge x = a \quad \psi = 0 \text{ at } \pm a$$

$$A \cos(\lambda a) - B \sin(\lambda a) = 0 \quad \wedge \quad A \cos(\lambda a) + B \sin(\lambda a) = 0$$

$$A \text{ or } B = 0 \text{ (not allowed)}$$

\* For potential of P2



For  $x > a$  the Schrödinger eq is

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + U \psi = E \psi$$

$$\therefore \psi_1 = A e^{-\lambda(x-a)} + B e^{\lambda(x-a)} \quad \lambda = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (E - U)}$$

$x \rightarrow \infty$   $\psi \rightarrow 0$  Normalization

$$\psi_1 = A e^{-\lambda(x-a)}$$

$$\psi = A \cos(\lambda x) \text{ or } B \sin(\lambda x) \quad x = x_2$$

$$\lambda a = \frac{\pi}{2} \cdot n_0 \quad \text{or} \quad \lambda a = \frac{\pi}{2} \cdot n_1$$

「奇数」                      「偶数」

$$\psi = A \cos\left(\frac{\pi n_0}{2a} x\right), \quad B \sin\left(\frac{\pi n_1}{2a} x\right)$$

$$\therefore \int_{-a}^a \sin^2\left(\frac{\pi n_1}{2a} x\right) dx = a \quad \boxed{\text{Normalization}} \quad A = B = \sqrt{a} \quad \text{for } x_2$$

$$\therefore \psi = \sqrt{a} \cos\left(\frac{\pi n_0}{2a} x\right), \quad \sqrt{a} \sin\left(\frac{\pi n_1}{2a} x\right)$$

$$\therefore \lambda = \frac{\pi}{2} \cdot n_0 \quad \therefore \quad 2mE = \hbar^2 \cdot \frac{\pi^2 n^2}{4a^2} \quad \therefore \quad E = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{8ma^2}$$

$$\Psi(x_1, x_2) = \frac{1}{2} (\psi_1(x_1) \psi_2(x_2) + \psi_1(x_2) \psi_2(x_1)) : \text{対称形}$$

[2]

$$\begin{aligned} & \longrightarrow \frac{g(x_1) e(x_2) + g(x_2) e(x_1)}{g(x_1) \cdot g(x_2) \cdot e(x_1) g(x_2)} \\ & \longrightarrow \frac{1}{2} (g(x_1) e(x_2) - g(x_2) e(x_1)) \quad // \text{反対称形} \end{aligned}$$

①②  $F = 0 \text{ (isospin)} + \text{Fermi}$

粒子のスピンの演算子:  $\hat{S}_1 = (\hat{S}_{1x}, \hat{S}_{1y}, \hat{S}_{1z})$ ,  $\hat{S}_2 = (\hat{S}_{2x}, \hat{S}_{2y}, \hat{S}_{2z})$

$$\hat{S}_{1z}|\uparrow\rangle = \frac{\hbar}{2}|\uparrow\rangle$$

[3]

スピンの復習

$$[J_x, J_y] = i\hbar J_z$$

$$\left( \begin{aligned} \hat{J}^{(+)}|j, m\rangle &= \sqrt{(j-m)(j+m+1)}|j, m+1\rangle \\ \hat{J}^{(-)}|j, m\rangle &= \sqrt{(j+m)(j-m+1)}|j, m-1\rangle \end{aligned} \right) \text{成立する}$$

$$J^2|j, m\rangle = j(j+1)|j, m\rangle, \quad J_z|j, m\rangle = m|j, m\rangle$$

$$m \geq 0 \text{ の時 } J_z|\uparrow\rangle = m|\uparrow\rangle, \quad J^2|\uparrow\rangle = j(j+1)|\uparrow\rangle$$

$$m < 0 \text{ の時 } J_z|\downarrow\rangle = m|\downarrow\rangle, \quad J^2|\downarrow\rangle = j(j+1)|\downarrow\rangle$$

$$S = \frac{1}{2} \text{ の時}$$

$$m = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) \text{ の時}$$

$$J_z|\uparrow\rangle = \frac{\hbar}{2}|\uparrow\rangle, \quad J^2|\uparrow\rangle = \frac{3}{4}\hbar^2|\uparrow\rangle$$

$$J_z|\downarrow\rangle = -\frac{\hbar}{2}|\downarrow\rangle$$

• 角運動量の合成

$$J = J_1 + J_2 \quad \text{かつ} \quad J_1, J_2 \text{ は互換可能で、それぞれ}$$

固有値が  $j_1, j_2$  となる固有状態  $|j_1, m_1\rangle, |j_2, m_2\rangle$  があるか??

$$J^2 = J_1^2 + J_2^2 + 2J_1 \cdot J_2 \text{ である}$$

$$J_z |j, m\rangle = \sum_{m_1=-j_1}^{j_1} \sum_{m_2=-j_2}^{j_2} |m_1, m_2\rangle \langle m_1, m_2 | j, m\rangle$$

$$j_1 = 1/2, m_1 = 1/2, -1/2; j = 1/2; m_2 = \pm 1/2.$$

$$\begin{array}{c} m_2 \backslash m_1 \\ \begin{array}{cc} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 0 \\ \hline \end{array} \\ -1/2 & \begin{array}{|c|c|} \hline 0 & -1 \\ \hline \end{array} \end{array} \end{array} \begin{array}{l} \rightarrow m=0 \\ \rightarrow m \rightarrow j=1 \end{array}$$

$$j=1, m=0 \text{ の状態}$$

$$|1, 0\rangle$$

$$j=1, m=-1 \rightarrow |1, -1\rangle$$

$$|1, 1\rangle = |+, +\rangle$$

$$J_z = \hbar m$$

4つの状態がある

$$\begin{array}{ll} d: \text{fix} & N-1 \text{ increase (X)} \\ N: \text{fix} & d: \text{increase (ok)} \end{array}$$

$$\frac{XN}{(aN)^2} = \frac{X}{aN}$$

見直し

[1]

$$n^+ (+a) + n^- (-a) = X$$

$$W =$$

$$\frac{NX}{2((aN)^2 - X^2)} \cdot \frac{X}{aN} = \frac{X}{2(1 - (\frac{X}{aN})^2)}$$

[158]

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \left( \frac{\partial F}{\partial N} \cdot \frac{\partial N}{\partial x} \right) \rightarrow \left( -\frac{N}{2} \cdot \frac{1}{N-n} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} \log \frac{N-n}{2} \right.$$

$$\left. - \frac{N}{2} \cdot \frac{1}{N+n} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log \frac{N+n}{2} \right)$$

$$= \frac{N}{4} \cdot \frac{2}{N-n} + \frac{1}{2} \log \frac{N-n}{2} - \frac{1}{2} \log \frac{N+n}{2} - \frac{N}{4} \cdot \frac{2}{N+n}$$

$$= \left[ \frac{N}{2(N-n)} + \frac{1}{2} \log \frac{N-n}{N+n} - \frac{N}{2(N+n)} \right] \cdot \frac{1}{a}$$

$$\frac{nN}{2(N^2 - n^2)}$$

$$N^2 - n^2 = (N-n)(N+n)$$

$$(1 - n^+) \exp(-\beta k) + n^+ \exp(\beta k)$$

$$\exp(\beta k) - \exp(-\beta k) = 2 \sinh(\beta k)$$

$$= N \exp(-\beta k) + n^+ (2 \sinh(\beta k))$$

$$n^- = N - n^+ \rightarrow \alpha (2n^+ - N) = x$$

$$n^- = (N - n^+) \exp(-) + n^+ \exp(+)$$

$$\frac{2n^+ - N}{2} = \frac{x}{\alpha}$$

$$n^+ = \left( \frac{x}{\alpha} + N \right) \cdot \frac{1}{2}$$

$$N \exp(-) = \frac{1}{2} \left( \frac{x}{\alpha} + N \right) (\exp(+)) - \exp(-)$$

$$\langle E \rangle = \frac{\sum E_n \exp(-\beta E_n)}{Z}$$

$$- \left( \frac{1}{Z} \right) \cdot 2N \cdot N \sinh^{N-1}(\beta k) \cdot \cosh(\beta k) \cdot k$$

$$2N \sinh^N(\beta k) - N \frac{k \cosh(\beta k)}{\sinh(\beta k)} = - \frac{Nk}{\tanh(\beta k)}$$

$$\beta |k| \ll 1$$

$$\tanh(\beta k) \approx \beta k$$

$$\therefore \left( - \frac{N}{\beta} \right) = E$$

$$\langle X \rangle = \sum_n x_n P_n = \exp(-\beta E_n)$$

$$n^+ \exp(\beta k) = n^- \exp(-\beta k)$$

$$n^- = N - n^+$$

$$Z(\beta, x)$$

||

$$= \frac{1}{Z} \cdot \left( -\beta N \exp(-\beta k) + \frac{1}{2} \left( \frac{x}{\alpha} + N \right) \cdot 2 \cosh(\beta k) \cdot k \right)$$

$$\langle X \rangle = \sum x_n P_n = \frac{1}{Z} \cdot \sum x_n \exp(-\beta E_n)$$

$$E = n^+(-k) - n^-(-k) = k(n^+ - n^-) = x \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{k}$$

$$E(x)$$

$$-Nk \cdot \frac{1}{\cosh^2(\beta k)}$$

$$\langle E \rangle = \int E(x) \exp(-\beta E(x)) dx ??$$

$$\langle a n \rangle = a \cdot \langle n \rangle$$

$$\langle n \rangle = \frac{1}{N} \sum_n n \cdot \exp(-\beta E(n))$$

$$Z = \sum_n \exp(-\frac{E_n}{k_B T}) = n_+ \exp(-k\beta) + n_- \exp(k\beta)$$

$$\langle E \rangle = \sum_n E_n \exp(-\frac{E_n}{k_B T})$$

$$\begin{pmatrix} n_+ \rightarrow -k \\ n_- \rightarrow k \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$-k n_+ \exp(-k\beta)$$

$$+k n_- \exp(k\beta) = \langle E \rangle$$

(2) 2 3 4 5 7

$$k(-n_+ \exp(k\beta) - \underbrace{n_-}_{N-n_+} \exp(-k\beta)) = \langle E \rangle$$

$$k(N \exp(-k\beta) - n_+ (2 \cosh(k\beta))) = \langle E \rangle$$

$$\frac{x+N}{2} = n_+$$

$$Z = \exp(\beta k) + \exp(-\beta k)$$

$$Z = \left( \frac{1}{2} \right)^N$$

$$x = na$$

$$E = x a \sinh H_1$$

$$\frac{2^N \cdot N \cosh H_1 (\beta k) \cdot \sinh(\beta k) \cdot k}{2^N \cosh^N(\beta k)}$$

$$= \frac{\sinh(\beta k)}{\cosh(\beta k)} \cdot k$$

$$= - \boxed{\tanh(\beta k) \cdot k}$$

$$E = k(2n^+ - N) \quad x = a(2n^+ - N)$$

$$\langle x \rangle = \frac{k}{a} \langle E \rangle$$

a) 13.3.98

a. Equation of Motion

$$m\ddot{\mathbf{u}} = -e\mathbf{E}e^{-i\omega t} - e\mathbf{v} \times \mathbf{B}e^{-i\omega t} - m\mathbf{v} \times \mathbf{v}$$

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ 0 \end{bmatrix} e^{-i\omega t}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_y B \\ -u_x B \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore m \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ 0 \end{bmatrix} (-\omega^2) = e \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ 0 \end{bmatrix} - e \begin{bmatrix} u_y B \\ -u_x B \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore -\omega^2 m u_x = e E_x - e u_y B$$

$$u_x = \frac{e E_x}{\omega^2 m - e B}$$

$$-\omega^2 m u_y = e E_y + e u_x B$$

$$u_y = \frac{e E_y}{\omega^2 m + e B}$$

$$\tilde{\epsilon} E_x = \begin{bmatrix} \epsilon_{xx} & \tilde{\sigma} & 0 \\ -\tilde{\sigma} & \epsilon_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \epsilon_{xx} E_x + \tilde{\sigma} E_y \\ -\tilde{\sigma} E_x + \epsilon_{xx} E_y \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$P = \epsilon_0 (\tilde{\epsilon} E_x - E_x) = -ne u$$

$$\rightarrow \langle \exp(-i\omega t) | \tilde{\sigma} \neq 0 \rangle$$

$$\epsilon_0 \begin{bmatrix} (\epsilon_{xx}-1)E_x + \tilde{\sigma} E_y \\ -\tilde{\sigma} E_x + (\epsilon_{xx}-1)E_y \\ 0 \end{bmatrix} = -ne \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \epsilon_0 ((\epsilon_{xx}-1)E_x + \tilde{\sigma} E_y) = -ne \cdot \frac{e E_x}{\omega^2 m - e B} = A E_x$$

$$\epsilon_0 (-\tilde{\sigma} E_x + (\epsilon_{xx}-1)E_y) = -ne \frac{e E_y}{\omega^2 m + e B} = B E_y$$

$$E_x \left( \epsilon_{xx} - 1 - \frac{A}{\epsilon_0} \right) = -\tilde{\sigma} E_y \left[ E_y = \tilde{\sigma} \frac{1}{\epsilon_0} \left( \epsilon_{xx} - 1 - \frac{A}{\epsilon_0} \right) E_x \right]$$

$$-\tilde{\sigma} E_x = \left( \frac{B}{\epsilon_0} - \epsilon_{xx} + 1 \right) E_y$$

$$-\tilde{\sigma} = \left( \frac{B}{\epsilon_0} - \epsilon_{xx} + 1 \right) \cdot \frac{1}{\epsilon_0} \left( \epsilon_{xx} - 1 - \frac{A}{\epsilon_0} \right)$$

$$+\tilde{\sigma}^2 = \left( \epsilon_{xx} - 1 - \frac{B}{\epsilon_0} \right) \left( \epsilon_{xx} - 1 - \frac{A}{\epsilon_0} \right)$$

## ② 取り出し情報量の定式化

$$\left( \alpha(\alpha_{10} + \beta_{11}) + \beta(\alpha_{12} + \beta_{13}) \right) |0\rangle$$

$$\alpha \overset{12\text{bit}}{|00\rangle} + \alpha \beta |10\rangle + \beta \alpha |01\rangle + \beta \beta |11\rangle$$

↓  
×2した。

↓  
1212012 - 012012 = 11012012

$$|00\rangle\langle 00|,$$

$$+ |10\rangle\langle 10|,$$

$$+ |20\rangle\langle 01| = 0$$

$$+ |30\rangle\langle 11|$$

$$U \times U = (|00\rangle\langle 00| + |10\rangle\langle 10|$$

$$+ |01\rangle\langle 20| + |11\rangle\langle 30|)$$

→  $U = 0$  の場合ではない。

(たゞ、このようにして実行可能な状態)

( $X^n - \frac{1}{2} Z^n$ ) が  $U$  の固有値として現れる場合

他に  $2, 1, 1, 3$

( $U$  の固有値の和が  
0 ではない)

$$\left( |00\rangle\langle 00| \right. \rightarrow d=4.$$

$$+ |10\rangle\langle 10|$$

$$+ |01\rangle\langle 01|$$

$$+ |11\rangle\langle 11|)$$

$$+ \dots \text{ (不明な項) }$$

↓  
不明な項

$$-eE_x = m(\omega^2 - \omega_0^2)u_x + e u_x B$$

$$\omega_1 = \frac{+eE_x}{-m(\omega^2 - \omega_0^2) + eB}$$

$$u_y = \frac{eE_y}{-m(\omega^2 - \omega_0^2) + eB}$$

$$(\epsilon_{xx}-1)E_x + \frac{\eta e}{\epsilon_0} E_y = -\frac{\eta e}{\epsilon_0} A E_x$$

$$(\epsilon_{xx}-1 + \frac{\eta e}{\epsilon_0} \frac{1}{a}) E_x = \cancel{\frac{\eta e}{\epsilon_0} B} E_y$$

$$-\frac{\eta e}{\epsilon_0} E_x + (\epsilon_{xx}-1) E_y = -\frac{\eta e}{\epsilon_0} B E_y$$

$$(\epsilon_{xx}-1 + \frac{\eta e}{\epsilon_0} B) E_y = \frac{\eta e}{\epsilon_0} E_x \quad \therefore E_x = \frac{1}{\frac{\eta e}{\epsilon_0}} \cdot (\epsilon_{xx}-1 + \frac{\eta e}{\epsilon_0} B) E_y$$

$$(\epsilon_{xx}-1 + \frac{\eta e}{\epsilon_0} a) \cdot \frac{1}{\frac{\eta e}{\epsilon_0}} \cdot (\epsilon_{xx}-1 + \frac{\eta e}{\epsilon_0} b) = 1$$

$$(\epsilon_{xx}-1)^2 + (\epsilon_{xx}-1) \cdot \frac{\eta e}{\epsilon_0} (a+b) + \frac{\eta^2 e^2}{\epsilon_0^2} ab = 1$$

$$u \times B = -\frac{1}{c} \omega \cdot \begin{bmatrix} u_y B \\ -u_x B \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ B u_x \\ -B u_y \end{pmatrix}$$

$$-\frac{1}{c} \omega \cdot \begin{bmatrix} u_y B \\ -u_x B \end{bmatrix}$$

$$m(\omega_0^2 - \omega^2)u_x = -eE_x + i e \omega u_y B$$

$$m(\omega_0^2 - \omega^2)u_y = -eE_y - i e \omega u_x B$$

$$\begin{bmatrix} m(\omega_0^2 - \omega^2) & -i e \omega B \\ i e \omega B & m(\omega_0^2 - \omega^2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} eE_x \\ eE_y \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{m^2(\omega_0^2 - \omega^2)^2 - (e \omega B)^2} \begin{bmatrix} m(\omega_0^2 - \omega^2) & i e \omega B \\ -i e \omega B & m(\omega_0^2 - \omega^2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} eE_x \\ eE_y \end{bmatrix}$$



$$(\epsilon_{xx} - 1) E_x + i\sigma E_y = -\frac{\eta e}{\epsilon_0} \cdot \frac{1}{A} \cdot [m(\omega_0^2 - \omega^2) E_x + i e \omega B \cdot E_y]$$

$$-i\sigma E_x + (\epsilon_{xx} - 1) E_y = -\frac{\eta e}{\epsilon_0} \cdot \frac{1}{A} [i e \omega B E_x + m(\omega_0^2 - \omega^2) E_y]$$

$$\therefore \frac{1}{2} \sigma = -\frac{1}{2} e \omega B \cdot \left(-\frac{\eta e}{\epsilon_0}\right) \cdot \frac{1}{A} = \frac{e^2 \eta \omega B}{A \epsilon_0}$$

$$\epsilon_{xx} - 1 = -\frac{\eta e}{\epsilon_0} \cdot \frac{1}{A} \cdot m(\omega_0^2 - \omega^2)$$

$$\epsilon_{xx} = -\frac{\eta e}{\epsilon_0} \cdot \frac{1}{A} \cdot m(\omega_0^2 - \omega^2)$$

$$\omega_0 \gg \omega > 0, \quad \omega_0 \gg eB/m$$

$$k \times (E_0) = \mu_0 \omega$$

$$k \times (k \times E_0) = \mu_0 \omega (-\tilde{\epsilon} E_0) E_0$$

$$= -\underbrace{\mu_0 \epsilon_0 \omega^2}_{\left(\frac{\omega}{c}\right)^2} \underbrace{E_0}_{E_0}$$

$$k \times (k \times E_0) =$$

$$A \times (B \times C) = (C \cdot A) B - (B \cdot A) C$$

$$(k \cdot E_0) k = k^2 E_0$$

$$(E_2) \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ E_2 \end{bmatrix} = (k^2) \cdot \begin{pmatrix} E_1 \\ E_2 \end{pmatrix} + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \cdot \begin{bmatrix} \tilde{\epsilon} \\ \tilde{\epsilon} \end{bmatrix} = 0$$

$$E_x$$

$$(k_z^2 - (\frac{\omega}{c})^2 \epsilon_{xx}) E_y = -i\omega (\frac{\omega}{c})^2 E_x$$

$$\begin{bmatrix} k_z^2 - (\frac{\omega}{c})^2 \epsilon_{xx} & \epsilon_{xy} (\frac{\omega}{c})^2 \\ \epsilon_{xy} (\frac{\omega}{c})^2 & k_z^2 - (\frac{\omega}{c})^2 \epsilon_{xx} \end{bmatrix}$$

$$(k_z^2 - (\omega/c)^2 \epsilon_{xx})^2 - \omega^2 (\omega/c)^4 = 0$$

$$k_z^2 - (\omega/c)^2 \epsilon_{xx} = \pm \omega (\omega/c)$$

$$k_z^2 = (\frac{\omega}{c}) (\epsilon_{xx} \pm \omega)$$

$$((\frac{\omega}{c})^2 (\epsilon_{xx} \pm \omega) - (\omega/c)^2 \epsilon_{xx}) E_x = \pm \omega (\frac{\omega}{c})^2 E_y$$



$$(\pm \omega) E_x = \pm \omega E_y$$

$$\pm E_x = \pm E_y$$

$$E_x^2 + E_y^2 = E^2 \quad \therefore E_x = \frac{1}{\sqrt{2}} E$$

$$E_0 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} E \\ \pm \frac{1}{\sqrt{2}} E \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} E \begin{bmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{bmatrix}$$

$$\exp(-i\omega t) = \cos(\omega t) + i\sin(\omega t)$$



$$E_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}} E \begin{bmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{bmatrix}, \quad E_{\pm} = E \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{bmatrix} \exp(i \dots)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} E \begin{bmatrix} a+b \\ a^2-b^2 \end{bmatrix} \quad a=b$$

$$(\cancel{E_0 z}) \cancel{k^2 z} - \cancel{k^2 E_0 z} + (\frac{\omega}{c})^2 \cdot E_0 z^2 z = 0$$

$$E = E_+ + E_-$$

[4]. from [2].  $\rightarrow$  get  $\left( \begin{array}{l} g(x_1)g(x_2), \frac{1}{\sqrt{2}} (g(x_1)e(x_2) + e(x_1)g(x_2)) \\ e(x_1)e(x_2) \end{array} \right) \rightarrow \text{Boson}$

$\left( \frac{1}{\sqrt{2}} (g(x_1)e(x_2) - e(x_1)g(x_2)) \right) \rightarrow \text{Fermion.}$

$\left( \begin{array}{l} | \uparrow \uparrow \rangle \\ \frac{1}{\sqrt{2}} (| \uparrow \rangle | \downarrow \rangle + | \downarrow \rangle | \uparrow \rangle) \\ | \downarrow \downarrow \rangle \end{array} \right)$

$\left( \frac{1}{\sqrt{2}} (| \uparrow \rangle | \downarrow \rangle - | \downarrow \rangle | \uparrow \rangle) \right) \rightarrow \text{Fermion - Asymmetric}$

$$\left( \begin{array}{l} S \rightarrow A \quad 3 \times 1 \\ A \rightarrow 3 \gamma \text{ or } S. \quad 3 \times 1 \end{array} \right) = 6$$

No magnetic field  $\rightarrow$  Energy should be from

$$g \cdot \vec{S} = \frac{3^2 \pi^2}{m a^2}, \quad \frac{5^2 \pi^2}{2 m a^2}, \quad \frac{4^2 \pi^2}{m a^2},$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_{\psi_1} &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle 11 | + \langle 1\bar{1} |) \left( \int_{R_1} dx_1 \int_{R_2} dx_2 \right. \\
 &\quad \left. \frac{g(x_1)g(x_2)g(x_1)g(x_2) \cdot (x_1 - x_2)^2}{\frac{1}{\sqrt{2}} (\langle 11 | + \langle 1\bar{1} |)} \right) \\
 &\quad \text{Orbital } x_1 \cdot \text{Cancelled}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int \frac{g^2(x_2) dx_2}{1} \int x_1^2 g_1^2(x_1) dx_1 \\
 &\quad + \int g^2(x_1) dx_1 \int x_2^2 g_2^2(x_2) dx_2 \\
 &\quad = 2 \int dx_1 \underbrace{x_1}_{\text{odd}} \underbrace{g(x_1)}_{\text{even}} \underbrace{dx_1}_{\text{odd}} \cdot \int x_2 \underbrace{g(x_2)}_{\text{even}} \underbrace{dx_2}_{\text{odd}}
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow 2A_{11}$

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_{\psi_3} = 2B_{11}$$

$$\begin{aligned}
 \langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_{\psi_2} &= \frac{1}{2} \int \underbrace{(x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2)}_{\substack{\text{even} & \text{odd} & \text{odd} \\ \text{even}}} \left( \underbrace{g^2(x_1)}_{\text{even}} \underbrace{e^2(x_2)}_{\text{even}} \right. \\
 &\quad \left. + \underbrace{g(x_1)g(x_2)}_{\text{odd}} \underbrace{e(x_1)e(x_2)}_{\text{odd}} \right. \\
 &\quad \left. + \underbrace{g^2(x_2)}_{\text{even}} \underbrace{e^2(x_1)}_{\text{even}} \right) \\
 &\quad \downarrow \\
 &= \frac{1}{2}(A+B) + 2(B+A) - C^2 = A+B - 2C^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_{\psi_4} &= A+B+2C^2 \\
 &\quad \downarrow \\
 &\quad \psi_6
 \end{aligned}$$

$\rightarrow$  Consider the Parity.

[6]

$$H = H_0 + \lambda H_1$$

$$|\psi\rangle = |\psi^{(0)}\rangle + \lambda |\psi^{(1)}\rangle + \dots$$

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)}$$

$$(H|\psi\rangle = E_n|\psi\rangle)$$

$$\lambda = 0$$

$$H_0|\psi^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|\psi^{(0)}\rangle$$

$$\lambda = 1.$$

$$\sum_{n \neq m} \frac{|\langle \psi_m^{(0)} | V | \psi_n^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

$$E_1^{(1)} = \langle \underbrace{\psi_1^{(0)}}_{gg} | \underbrace{V}_{V_0 \alpha_1 \alpha_2} | \underbrace{\psi_1^{(0)}}_{gg} \rangle$$

$$E_{\psi_1} = E_{\psi_1}^{(0)} + \langle gg | V_{\alpha_1 \alpha_2} | gg \rangle = \frac{\pi^2 \hbar^2}{m a^2} + V_0 \int \alpha_1 g^2(\alpha_1) d\alpha_1 \int \alpha_2 g^2(\alpha_2) d\alpha_2$$

$$= \frac{\pi^2 \hbar^2}{m a^2}$$

$$E_{\psi_2} = E_{\psi_2}^{(0)} + \frac{1}{2} (\langle gg | + \langle eg |) (V_{\alpha_1 \alpha_2}) (|ge\rangle + |eg\rangle)$$

$$= \frac{5\pi^2 \hbar^2}{2m a^2} + V_0 \int \alpha_1 g(\alpha_1) e(\alpha_2) d\alpha_1 \int \alpha_2 g(\alpha_2) e(\alpha_1) d\alpha_2$$

$$= \frac{5\pi^2 \hbar^2}{2m a^2} + V_0 c^2$$

$$E_{\psi_3} = \frac{5^2 \pi^2}{m a^2}$$

$$E_{\psi_4} = E_{\psi_5} = E_{\psi_6} = E_{\psi_4}^{(0)} - V_0 c^2 = \frac{5^2 \pi^2}{2m a^2} - V_0 c^2$$

$$\left( -\hbar^2 \left( \left( \frac{\omega_0}{2} \right)^2 - 1 \right)^2 + (eB)^2 \right) \omega^2$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (\underbrace{\mathbb{F}_+}_{\downarrow \left(\frac{1}{2}\right)} + \mathbb{F}_-) \quad \left(\frac{1}{2}\right) \exp(\tilde{z} \tilde{\omega} \underbrace{\int_{k_+}^{k_-} \exp(i\tilde{z})}_{\tilde{z}} - i\omega t)$$

$$\mathbb{F}_{\text{cl}} = \frac{1}{2} \mathbb{F} \exp(\tilde{z} \mathcal{Q} k_+ - i\omega t) + \frac{\mathbb{F}}{2} \exp(\tilde{z} \mathcal{Q} k_- - i\omega t)$$

$$\frac{\mathbb{F}}{2} \exp(-i\omega t) (\exp(\tilde{z} \mathcal{Q} k_+) + \exp(\tilde{z} \mathcal{Q} k_-))$$

$$\hookrightarrow \exp$$

$$\mathbb{F} = \mathbb{F} \begin{pmatrix} \cos(\frac{k_+ - k_-}{2} \mathcal{Q}) \\ -\sin(\frac{k_+ - k_-}{2} \mathcal{Q}) \\ 0 \end{pmatrix}$$