

薬剤使用についての新基準

対象者	施工可否	施工中の在宅	対 応	備考
乳児(1歳未満)	可	×	施工日を含めて、 最低一週間 家を空けてもらう。	
幼児(1歳以上6歳未満)・妊婦	可	○	施工中は 薬剤の影響のない部屋(床下及び天井の進入口が無い部屋)に移動する 。施工後は、進入口のある部屋を1時間程度換気してもらう。	
アレルギー	可	△	薬剤の成分を伝え、主治医に確認してもらう。問題なければ工事する。	事前に必ず事業本部に確認・相談をすること 事前に事業本部に確認を取り、状況によっては保証無のペイト工法で対応
	不可	×	シックハウスなど建材や溶剤のアレルギーの場合は施工禁止。	
過敏症	不可	×	施工禁止	
特異体質	不可	×	施工禁止	

《注意事項》

- ・上記の居住者がいる場合は、薬剤に**ばく露**されないように細心の注意をはらう。
(施工中の床下・天井の入り口付近だけ**ばく露**の可能性がある。入口を閉めてしまえば**ばく露**することはない)
- ・天然ピレントリンMCは、薬剤の臭いが強いので、上記の居住者がいる場合は使用しない。
- ・上記の居住者がいる場合は、防カビ施工は禁止。(防カビの薬剤は白蟻消毒用の薬剤より**約100倍揮発性が高い為**)
- ・駆除消毒の場合、シロアリ消毒用の**薬剤効果(非忌避性と遅効性)**を損なわないようにする為、防カビ剤との併用は禁止。

※駆除消毒後は再発のリスク回避の為に、施工後**最低一年間**は防カビ処理の施工をしないでください。

* ばく露……薬剤にさらされること